

DK Brugsanvisning

BlephaCura® liposomsuspension til lindring af inflammation og daglig pleje af øjenlågskanterne.

Indhold

Sojalecitin, vitamin A-palmitat, vitamin E, ethanol, natriumklorid, phenoxyethanol, rensed vand.

Terapeutiske indikationer

BlephaCura® anvendes til lindring og behandling af inflammation i øjenlågskanten. Det kan også anvendes til den daglige hygiejne og pleje af øjenlågskanterne. BlephaCura® støtter og fremmer den naturlige helingsproces ved inflammation og irritation i øjenlågskanterne.

Anvendelse

Vask hænder før anvendelse. BlephaCura® bør anvendes to gange dagligt (morgen og aften). Benyt frugtfrie vatrondeller, som er egnede til pleje af øjenlåg. For at undgå smitterisiko må spidsen af flasken ikke komme i berøring med andre overflader, især ikke med vatrondellen. Dryp BlephaCura® ned på vatrondellen fra en kort afstand. Ved den daglige hygiejne og pleje af øjenlågskanterne med BlephaCura® skal alle skorper omhyggeligt fjernes.

Behandlingstips:

- Fugt en vatrondel med BlephaCura®.
- Fugt derefter øjenlågene med vatrondellen, specielt øjenlågskanterne, og massér forsigtigt både langs den øverste og den nederste øjenlågskant.
- Fjern forsigtigt indtørrede skorper og sekret. For at rense den nederste øjenlågskant, læg en finger på det nederste øjenlåg og træk forsigtigt nedad. For at rense den øverste øjenlågskant, læg en finger på det øverste øjenlåg og træk forsigtigt opad. Hvis det er nødvendigt, erstattes den brugte vatrondel med en ny.

Kassér den brugte vatrondel efter behandling af hvert øjenlåg. Brug ikke den samme vatrondel til begge øjenlåg.

Kom ikke BlephaCura® direkte ind i øjnene. Behandl hverken øjenlågenes inderside eller øjets overflade med den fugtede vatrondel.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Kontraindikationer

BlephaCura® må ikke anvendes ved overfølsomhed over for et eller flere af indholdsstofferne.

Baggrundsinformation

En inflammation af øjenlågskanten (blefaritis) er normalt en kronisk sygdom. Behandling heraf kan være forbundet med skuffende tilbagefald og genopblussen, og der kræves derfor omhyggelig daglig pleje.

Om nødvendigt kan det hjælpe at lægge et varmt kompres (37–38° C) på de lukkede øjenlåg i ca. 15 minutter før behandling med BlephaCura®.

Liposomer tilfører phospholipider og har smertestillende og antiinflammatoriske egenskaber, som hurtigere reducerer inflammationer. Liposomer understøtter sårheling og pleje af irriteret og betændt hud.

Holdbarhed og opbevaring

Opbevares tørt ved en temperatur mellem 2° og 25° C.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Anvendes inden for 4 uger efter åbning.

Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

Dato for seneste revision af indlægssedlen: 2012-11

