

Brugsanvisning STOPSN^{OT} Næsespray (DK)

Om STOPSN^{OT} Næsespray

STOPSN^{OT} Næsespray kan bruges til understøttende behandling af forkølelse og influenza-lignende sygdom forårsaget af virus.

STOPSN^{OT} Næsespray kan bruges af voksne og børn over 1 år.

STOPSN^{OT} Næsespray kan også bruges af gravide og under amning.

STOPSN^{OT} Næsespray indeholder ingen konserveringsmidler. Et sterilt filter i flasken garanterer steriliteten af oplosningen selv efter gentagen brug.

STOPSN^{OT} Næsespray har en lokal effekt og optages ikke i kroppen.

STOPSN^{OT} Næsespray er godkendt som Medicinsk Udstyr klasse IIa.

Indhold

STOPSN^{OT} Næsespray er en klar, farveløs og viskøs oplosning uden lugt.

1 ml oplosning indeholder 1,2 mg iota-carrageenan (Carragelose[®]), 0,4 mg kappa-carrageenan, natriumchlorid og renset vand. Carragelose[®] er en naturlig aktiv bestanddel udvundet af rødtang.

Egenskaber

Næsen er den mest almindelige smittevej for virus, der forårsager forkølelse og influenza-lignende sygdom. Det sker ved, at virus sætter sig fast på slimhindens. Her kan virus formere sig og spredes.

De typiske symptomer er en blokeret eller løbende næse, ondt i halsen og/eller hovedpine, hoste m.v. I de tidlige stadier af en sygdom kan man ofte ikke skelne mellem en almindelig forkølelse og influenza.

Influenza er en potentielt alvorlig sygdom og den endelige diagnose skal foretages af en læge.

STOPSN^{OT} Næsespray danner en fugtgivende beskyttelsesfilm på næseslimhinden. Denne film virker som en fysisk barriere, der kan beskytte mod ydre påvirkninger. Den vedvarende befugtning kan beskytte mod forkølelse og influenza-lignende sygdom forårsaget af respiratorisk virus.

Kontakt altid din læge ved alvorlige symptomer, hvis du har høj feber eller hvis symptomerne varer mere end en uge.

Terapeutiske indikationer

STOPSN^{OT} Næsespray kan forkorte varigheden af forkølelser og influenza-lignende sygdom.

STOPSN^{OT} Næsespray kan reducere sværhedsgraden og genopblussen af virus-relaterede symptomer på forkølelse og influenza-lignende sygdom.

Dosering og brug

Brug STOPSN^{OT} Næsespray ved de første tegn på forkølelse (F.eks. en prikkende eller løbende næse, ondt i halsen etc.). Brug sprayen mindst tre gange dagligt med et pust i hvert næsebor.

Behandlingen bør begynde så tidligt som muligt efter de første symptomer og skal fortsættes, indtil symptomerne er aftaget. Søg læge, hvis der opstår feber, eller hvis tilstanden ikke bliver forbedret efter en uge.

Fjern beskyttelseskappen og pump om nødvendigt et par gange indtil der kommer en særskilt forstørret spray. STOPSN^{OT} Næsespray er nu klar til brug.

For at undgå skader skal du indsætte sprayhovedet forsigtigt og ikke for dybt ind i næsen. Hold flasken lodret, når du sprayer og sæt beskyttelseskappen på efter brug.

Mulige bivirkninger/Interaktioner med andre produkter

Siden lanceringen er der ikke rapporteret bivirkninger, der kan betragtes som relateret til brugen af dette produkt.

I en klinisk undersøgelse med 35 deltagere oplevede én deltager tor mund, og en anden deltager rapporterede oppustede øjenlåg. Disse bivirkninger blev muligvis relateret til produktet. Undersøgelsen af interaktioner med andre produkter er ikke udført.

Særlige forholdsregler for sikker brug

Brug ikke STOPSN^{OT} Næsespray hvis du er allergisk over for nogen af indholdsstofferne i produktet.

STOPSN^{OT} Næsespray er ikke medicin. Hvis der optræder feber og/eller symptomerne er vedvarende, skal du kontakte din læge.

Af hygiejniske årsager og for at undgå overførelse af patogener, bør sprayflasken altid bruges af én og samme person.

Opbevares uden for børns rækkevidde!

Influenza er en potentielt alvorlig sygdom. STOPSN^{OT} Næsespray erstatter ikke behovet for en influenzavaccination.

Pakkestørrelse

20 ml flaske med forstørret. 1 spray = 0,14 ml oplosning

Opbevaring

STOPSN^{OT} Næsespray har en holdbarhed på 36 måneder fra fremstillingsdatoen. På grund af det særlige filtersystem forbliver oplosningen steril selv efter gentagen brug.

STOPSN^{OT} Næsespray kan anvendes i 12 måneder efter første brug. Kassér derefter flasken.

Opbevar STOPSN^{OT} Næsespray mellem 5 °C og 30 °C og beskyt flasken mod lys.

Producent/fremstillet af:

Mono chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, A-1200 Wien

Distributør:

Cura Nordic ApS, DK-3460 Birkerød

Dato for revision: august 2016

STERILE A

CE 0408

Bruksanvisning STOPSN^{OT} Nesespray (NO)

Om STOPSN^{OT} Nesespray

STOPSN^{OT} Nesespray kan brukes til støttende behandling av forkjølelse og influensalignende sykdom forårsaket av virus.

STOPSN^{OT} Nesespray kan brukes av barn over 1 år og voksne

STOPSN^{OT} Nesespray kan også brukes av gravide og ved amming

STOPSN^{OT} Nesespray inneholder ingen konserveringsmidler. Et sterilt filter i flasken garanterer sterilitet av løsningen selv etter gjentatt bruk.

STOPSN^{OT} Nesespray har en lokal effekt og tas ikke opp i kroppen.

STOPSN^{OT} Nesespray er godkjent som Medisinsk Utstyr klasse IIa.

Innehold

STOPSN^{OT} Nesespray er en klar, fargeløs, viskøs løsning uten lukt.

1 ml av løsningen inneholder 1,2 mg iota-carrageenan (Carragelose[®]), 0,4 mg kappa-carrageenan, natriumklorid, renset vann. Carragelose[®] er en naturlig, aktiv bestanddel fra rødtang.

Egenskaper

Virus som forårsaker forkjølelse, og influensalignende sykdom smitter oftest gjennom nesen. Virus setter seg fast på slimbinnen. Her formerer og sører viruset seg.

De typiske symptomene er en tett eller rennende nese, vondt i halsen og/eller hodepine, høste m.v. I de tidlige stadiene av sykdom kan man ofte ikke skille mellom alminnelig forkjølelse og influensa.

Influensa er en potensielt alvorlig sykdom og endelig diagnose må gjøres av en lege.

STOPSN^{OT} Nesespray danner en fuktgivende beskyttelsesfilm på slimbinnen i nesen. Denne filmen virker som en fysisk barriere, som kan beskytte mot ytre påvirkninger. Den vedvarende fukten kan beskytte mod forkjølelse og influensalignende sykdom forårsaket av respiratoriske virus.

Kontakt alltid din lege ved alvorlige symptomer, dersom du har høy feber eller om symptomene varer mere enn en uke.

Terapeutiske indikasjoner

STOPSN^{OT} Nesespray kan forkorte varigheten av forkjølelser og influensalignende sykdom.

STOPSN^{OT} Nesespray kan redusere alvorlighetsgraden og gjenoppblussing av virusrelaterte symptomer på forkjølelse og influensalignende sykdom.

Dosering og bruk

Bruk STOPSN^{OT} Nesespray ved det første tegn på forkjølelse (F.eks. en kløende eller rennende nese, etc.). Bruk sprayen minst 3 ganger om dagen, med ett sprøyt i hvert nesebor.

Behandlingen bør begynne så tidlig som mulig etter at symptomer oppstår og skal fortsette til symptomene er slutt. Kontakt alltid din lege ved alvorlige symptomer, dersom du har høy feber eller om symptomene varer mere end en uke.

Fjern beskyttelseskappen og pump om nødvendig et par ganger inntil det kommer en ensartet forstøvet spray. STOPSN^{OT} Nesespray er nå klar til bruk.

For å unngå skader må du sette sprayhodet forsiktig, og ikke for langt inn i nesen. Hold flasken lodret ved bruk, og sett beskyttelseskappen tilbake etter bruk.

Mulige bivirkninger/Interaksjoner med andre produkter

Det har ikke blitt rapportert produktrelaterte bivirkninger i den tiden STOPSN^{OT} har vært på markedet. I en klinisk undersøkelse med 35 deltagere opplevde én deltager tørr munn, og en annen deltager rapporterte oppustede øyelokk. Disse bivirkningene var muligvis relatert til produktet. Undersøkelser av interaksjoner med andre produkter er ikke utført.

Særlige forholdsregler for sikker bruk

Bruk ikke STOPSN^{OT} nesespray hvis du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i produktet.

STOPSN^{OT} Nesespray er ikke medisin. Hvis det oppstår begre eller/eller symptomene er vedvarende, skal du kontakte din lege.

Av hygieniske årsaker og for å unngå overførelse av patologer, bør sprayflasken alltid brukes av én og samme person.

Oppbevaring

Influensa er en potensielt alvorlig sykdom. STOPSN^{OT} Nesespray erstatter ikke behovet for en influensavaksine.

Pakkestørrelse

20 ml flaske med forstøver. 1 spray = 0,14 ml opplosning

Oppbevaring

STOPSN^{OT} Nesespray har en holdbarhet på 36 måneder fra produksjonsdato. På grund av det spesielle filtersystemet forbli opplosningen steril selv etter gjentatt bruk.

STOPSN^{OT} Nesespray kan anvendes i inntil 12 måneder etter første gangs bruk. Kast deretter flasken.

Oppbevar STOPSN^{OT} Nesespray mellom 5 °C og 30 °C og beskytt flasken mot lys.

Produsent:

Mono chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, A-1200 Wien

Distributør:

Cura Nordic ApS, DK-3460 Birkerød

Dato for revisjon: august 2016

STERILE A

CE 0408