

silicolgel®


Kolloid kiselsyre til behandling af mave-/tarmproblemer

Til behandling af

- Halsbrand
- Refluks
- Opkastning

Og symptomer på IBS

- Kvalme
- Oppustethed
- Mavesmerter
- Tarm Ubehag
- Diarré



silicolgel indeholder kiselsyre, der er en naturligt forekommende forbindelse af silicium og ilt i en kolloid (meget dispergeret) og vandig form.

Silicium er verdens næstmest udbredte element efter ilt. Det findes i naturen som siliciumdioxid og i en hydreret eller vandig form som kiselsyre.

Mave-/tarmproblemer er normalt forårsaget af irriterende og skadelige stoffer samt patogener. Når mave-/tarmkanalen forstyrres af skadelige stoffer og patogener, kan det resultere i lidelser som halsbrand, refluks og opkastning, samt kvalme, mavesmerter, tarm ubehag, diarré og oppustethed, der kan være symptomer på irritable tarmsyndrom (IBS). Som en følge heraf kan fordøjelseskanaalen ikke fungere normalt, og dette kan føre til fysisk ubehag.

Den gavnlige virkning af **silicolgel** fremkommer takket være kiselsyres store, aktive overflade, der lægger sig som en beskyttende og beroligende hinde over slimhinden i maven og tarmene. Kolloid kiselsyre har en adsorberende eller bindende egenskab der gør at det fysisk adsorberer eller binder de fleste irriterende og skadelige stoffer samt patogener. Dette gør dem uskadelige, således at de kan fjernes naturligt gennem tarmene og ud af kroppen.

Kiselsyre binder også gasser og reducerer overskydende syre. Dette kan reducere oppustethed.



BRUGSANVISNING:

- **Omryst flasken grundigt inden hver brug.**
- **silicolgel** bør indtages mindst 1 time før eller efter indtagelse af lægemidler.

Ved behandling af mave-/tarmproblemer skal du tage 1 spiseskefuld (15ml) **silicolgel** 3 gange dagligt, helst før måltider.

silicolgel bør kun anvendes til børn under 12 år efter aftale med læge.

silicolgel kan indtages ufortyndet eller fortyndet i vand. Når akutte symptomer er aftaget, kan behandlingen med **silicolgel** fortsætte i yderligere nogle få dage.

silicolgel lindrer også symptomer i mave-/tarmkanalen, der kan opstå f.eks. efter kostændring under rejser eller på ferie.

Hvis akutte symptomer ikke er aftaget efter 3 dage, bør man søge lægehjælp.

Ved diarré er det vigtigt at kompensere væsketabet. Ved kroniske lidelser fortsættes behandlingen i op til 4 uger.

silicolgel er velegnet til vegetarer og veganere. Glutenfri.

INGREDIENSER:

3,5 g siliciumdioxid pr. 100 ml kisel syregel. konserveringsmidler: sorbinsyre (E 200), natriumbenzoat (E 211).

BIVIRKNINGER:

Der er ingen kendte bivirkninger.

INTERAKTIONER:

silicolgel bør indtages mindst 1 time før eller efter indtagelse af lægemidler.

KONTRAINDIKATIONER:

Anvend ikke **silicolgel** hvis du er overfølsom over for nogen af ingredienserne.

VIGTIGT:

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Må ikke fryses. Opbevares mellem 2 og 25°C.
- Omryst flasken grundigt før hver brug.
- Læs indlægssedlen før brug.
- Brug inden sidste holdbarhedsdato.
- Brug indenfor 3 måneder efter åbning.

PRODUKTTYPE:

Gel til indvortes brug.

INDHOLD:

200 ml eller 500 ml i en flaske.

INFORMATION STATUS:

Indlægssedlen blev sidst revideret i marts 2018.

FREMSTILLET I TYSKLAND AF:

Saguna GmbH, Teltower Strasse 10, D-33719 Bielefeld

DISTRIBUERET I DANMARK AF:

ABIGO Pharma A/S, Stengårdsvej 25, 4340 Tølløse

2°C/25°C



CE
0297