

# ! i SAY: • FEEL CONFIDENT

## DANSK

### i SAY: VAGINAL INFJEKTION

i say: VAGINAL INFJEKTION er den første patient selvbehandling godkendt i EU som Medicinsk udstyr med Cranberry-Active™, til at behandle og forebygge infektioner i skeden og dertil knyttet ubehag. Små dosiskontrollerede vaginaltabletter som behandler vaginale infektioner forårsaget af både bakterier og svampe, fjerner dertil knyttede gener og kan forhindre tilbagefald af den vaginale infektion.

Vaginaltabletterne kan også anvendes til forebyggelse, for eksempel når du føler dit immunforsvar er svækket, eller når du er særlig utsat for at udvikle en vaginal infektion pga. stress, eller når du tager antibiotika.

### HVAD ANVENDES VAGINALTABLETTER TIL?

- Til at behandle og forebygge vaginale infektioner forårsaget af bakterier eller svampe.
- Til at behandle og forebygge gener såsom udflad, kløe, brændende fornemmelse og ubehagelig lugt.
- Til at genoprette og opretholde en normal pH i skeden (pH 3,8 – 4,5).

### HVAD ER SYMPTOMERNE PÅ VAGINAL INFJEKTION?

De almindelige symptomer på vaginal infektion er irritation, kløe, hævelse, ubehagelig lugt og unormalt udflad (glat, hvit, grå eller gul). Lugten kan forværres efter kontakt med sæd.

### HVORDAN VIRKER VAGINALTABLETTERNE?

- Trin 1. Vaginale infektioner opstår på grund af ændringer i den normale vaginale balance og resulterer i en overvækst af svampe og / eller bakterier samt en relativ forøgelse af vaginal pH.
- Trin 2. Når du indsætter tabletten i skeden, danner de aktive medicinske ingredienser et fysisk lag på overfladen af det vaginale væv, der fugter og smører den vaginale væg.
- Trin 3. Ingredienserne genopretter den vaginale pH til det normale niveau (pH 3,8–4,5). Dermed forsvinder infektion og ubehagelige gener.

### HVEM KAN BRUGE VAGINALTABLETTERNE?

Kvinder fra 16 år. Så vidt vides kan vaginaltabletterne anvendes under graviditet og amning, men det anbefales at kontakte lægen før brug.



### HVORDAN ANVENDES VAGINALTABLETTERNE?

- Indsæt forsigtigt én tablet, så dybt som muligt i skeden (ligesom en tampon). Vask dine hænder, før du indsætter tabletten!
- Indsæt helst tabletten, lige før du går i seng. En gang imellem oplöses vaginaltabletten ikke fuldstændigt, og kan delvist glide ud af skeden (brug evt. et trusseindlæg). Dette påvirker ikke din behandling da ingredienserne allerede har påbegyndt behandlingen.
- Symptomerne forsvinder oftest efter 4 dages brug. Du skal fortsætte med at anvende tabletterne i den anbefalede behandlingsperiode.
- Du kan også anvende tabletterne under menstruation.
- Hvis det ønskes, kan du gentage behandlingen. Hvis symptomerne ikke forsvinder, skal du søge læge.

	Dosis	Dage
Behandling	1 tablet per dag	14 dage
Forebyggelse	1 tablet hver anden dag	14 dage

### INGREDIENSER

Cranberry- Active™, Lactitol monohydrat, Hyaluronsyre, Polyethylenglycol 6000, Crospovidon, Magnesiumstearat, Citronsyre. Tabletterne indeholder ikke hormoner og er ikke testet på dyr.

### ADVARSLER

- Tabletterne er kun til vaginal brug. Må ikke indtages oralt.
- Påbegynd ikke behandlingen under menstruation.
- Anvend ikke tabletterne hvis du forsøger at blive gravid.
- Rådfør dig med din læge eller gynækolog, hvis symptomerne ikke bedres i løbet af 5 dage, hvis der er blod i urinen, hvis du har mavesmerter eller hvis du bemærker noget usædvanligt eller ubehagligt.
- Der er ingen kendte interaktioner med lægemidler, hvis vaginaltabletterne anvendes i henhold til brugsanvisningen. Hvis du er i tvivl, så kontakt din læge eller gynækolog.
- Du bør ikke bruge tabletterne, hvis du er allergisk eller overfølsom over for nogle af ingredienserne. Du kan finde listen over ingredienser i afsnittet, ingredienser.

### OPBEVARING AF VAGINALTABLETTERNE

- Opbevar altid vaginaltabletterne i den originale emballage og ved stuetemperatur (15–25 °C). Opbevares mørkt og tort.
- Brug ikke vaginaltabletterne efter den udløbsdato, der står på blistertakningen og på emballagen.
- Opbevares utilgængeligt for børn.

### HVAD INDEHOLDER PAKNINGEN?

- 14 vaginaltabletter
- Indlægsseddel

### INFORMATION OM VAGINALE INFJEKTIONER

Vidste du, at vaginale infektioner påvirker 1 ud af 3 kvinder i løbet af deres levetid og har en høj tilbagefaldsprocent. Infektionerne opstår på grund af ændringer i den vaginale flora. Vaginalfloraen kan forstyrres ved at vaske intimområdet med sæbe, hvis en tampon efterlades i skeden i for lang tid, eller blot ved nedsat immunforsvar. Vaginalfloraen kan også forstyrres af antibiotika behandling, indskættelse af spiral, graviditet eller hvis du tager p-piller. Hvis pH stiger (hvilket betyder at vaginal miljøet bliver mindre surt), får visse bakterier og svampe chancen for at vokse meget.



### TIPS FRA i SAY:

- Forstyr den naturlige flora i din vagina så lidt som muligt.
- Brug ikke almindelig sæbe. Skyl dit intim område med lunkent vand.
- Tør dig forfra og bagud efter toiletbesøg.
- Brug bomulds undertøj når det er muligt og sørge for en god ventilation (tøj, der ikke er for stramt). Vask dit undertøj med vaskepulver der ikke forårsager irritation.

## SVENSKA

### i SAY: VAGINAL INFJEKTION

i say: Vaginal Infection är den första medicintekniska egenvårdsprodukten med Cranberry-Active™ för behandling och förebyggande av infektioner och därtillhörande besvär i slidan. De små vaginaltabletterna behandlar infektioner som förorsakas av bakterier och jästsvampar, eliminera därtillhörande besvär och förhindrar att nya infektioner uppstår.

Du kan också använda tabletterna året runt i ett förebyggande syfte t.ex. då ditt immunforsvar är nedsatt, om du är stressad eller får antibiotikabehandling.

### HVAD ANVÄNDS VAGINALTABLETTERNA FÖR?

- För att behandla och förebygga infektioner i slidan som förorsakats av bakterier och jästsvampar.
- För att behandla och förebygga obehagliga symptom såsom flytningar, kläda, sveda eller lukt.
- För att återställa och upprätthålla slidans naturliga pH-värde (pH 3,8 – 4,5)

### VILKA ÄR SYMOTEN VID VAGINAL INFJEKTION?

De vanligaste symptomen vid vaginal infektion är irritation, kläda, svullnad, obehaglig lukt och onormal flytning (jämna, med vit, grå eller gul färg). Lukten kan förvärras efter kontakt med sädsvätska.

### HUR FUNGERAR VAGINALTABLETTERNA?

- Steg 1. Infektioner i slidan uppstår på grund av en rubbning av den normala balansen i slidan som leder till att mängden svampar och/eller bakterier ökar och pH-värdet i slidan stiger.
- Steg 2. Efter att vaginaltableten har placerats i slidan bildar de aktiva substanserna ett lager på slidans slemhinnor vilket fuktar och smörjer slidans väggar.
- Steg 3. De verksamma ämnena återställer slidans normala pH-värde (pH 3,8–4,5). Detta leder till att infektionen och de obehagliga symptomen försvinner.

### VEM KAN ANVÄNDA VAGINALTABLETTERNA?

Kvinnor över 16 år. Vaginaltabletterna kan användas under graviditet och amning, men det rekommenderas att du diskuterar med din läkare innan du använder dem om du är gravid eller ammar.



### HUR ANVÄNDS VAGINALTABLETTERNA?

- Tvätta händerna innan du för in vaginaltableten. För in en vaginaltablett så djupt som möjligt i slidan (som en tampong).
- Använd trosskydd och för in vaginaltableten helst strax innan du lägger dig. Från tid till annan upplöses vaginaltableten inte fullständigt och kan delvis glida ut av slidan. Detta påverkar inte behandlingen eftersom bestämdsdelarna redan har börjat verka.
- Symtomen kan försvinna efter 4 dagars behandling. Använd dock vaginaltabletterna hela den rekommenderade behandlingstiden.
- Du kan använda vaginaltabletterna även när du har mens.

	Dosering	Behandlingstid
Behandling	1 vaginaltablett per dag	14 dagar
Förebyggande	1 vaginaltablett varannan dag	14 dagar

### VAD INNEHÄLLER VAGINALTABLETTERNA?

Cranberry- Active™, Lactitol monohydrat, Hyaluronsyre, Polyethylenglycol 6000, Crospovidon, Magnesiumstearat, Citronsyr. Vaginaltabletterna innehåller inte hormoner och de har inte testats på djur.

### WARNINGAR

- Vaginaltabletterna är avsedda för att användas enbart i slidan.
- Sävälje inte tabletterna.
- Du ska inte börja behandlingen under menstruationen.
- Använd inte tabletterna om du försöker bli gravid.
- Använd inte vaginaltabletterna om du är allergisk eller överkänslig mot någon av bestämdsdelarna. En förteckning över bestämdsdelarna finns under rubriken: "Vad innehåller vaginaltabletterna?"
- Rådfråga din läkare eller gynækolog om symptomet inte lindras inom 5 dagar, eller om du märker ovänliga eller obehagliga symptom.
- Det finns inga kända interaktioner med läkemedel, om vaginaltabletterna används enligt bruksanvisningen. Om du är osäker rådfråga din läkare eller gynekolog.

### HUR SKA VAGINALTABLETTERNA FÖRVARAS?

- Förvara alltid vaginaltabletterna i originalförpackningen rumstemperatur (15–25 °C). Förvara torrt och skyddat för ljus.
- Använd inte vaginaltabletterna efter den sista användningsdagen som anges på blistret och förpackningen.
- Förvaras utan räckhåll för barn.

# ! i SAY: BE GOOD TO YOUR BODY

## VAD INNEHÄLLER FÖRPACKNINGEN?

- 14 vaginaltablettar
- Bruksanvisning

## INFORMATION OM INFJEKTIONER I SLIDAN

Visste du att en av tre kvinnor drabbas av infektioner i slidan någon gång under sitt liv och att dessa förnyar sig lätt? Infektioner i slidan uppstår p.g.a. störningar i slidans bakterieflora och förorsakas oftast av bakterier eller jästsvampar. Slidans bakterieflora kan också rallas av att intiområdet tvättas med tvål, att tampongen lämnas i slidan för länge eller på grund av nedslatt immunförsvar. Även en antibiotikakur, insättning av en spiral i livmodern, graviditet eller användning av p-piller kan orsaka störningar i slidans bakterieflora. Högre pH-värden (omgivningen blir mindre sur) medför att vissa bakterier och jästsvampar får möjlighet att föröka sig.

### i SAY: TIPS OCH RÅD

- Upprätthåll slidans normala bakterieflora efter bästa förmåga.
- Använd inte tvål. Skölj intiområdet med ljummet vatten.
- Torka baken framifrån bakåt.
- Använd trosor av bomull alltid då det är möjligt och undvik för åtsittande kläder så att intiområdet hålls luftigt. Tvätta trosorna med ett milt tvättmedel som inte irriterar.

## SUOMI

### i SAY: VAGINAL INFECTION

i say: Vaginal Infection on ensimmäinen Cranberry-Active™ -yhdistettä sisältävä itsehoitoon tarkoitettu terveydenhuollon laite, joka hoitaa ja estää emätintulehdusia sekä niihin liittyviä vaivoja. Pienikokoiset emätintabletit hoitavat sekä bakteeri- että hiivatulehdusia, poistavat niihin liittyvät vaivat ja estävät emätintulehdusten uusiutuminen.

Voit käyttää emätintabletteja myös ennaltaehkäisevästi vuoden ympäri, esimerkiksi silloin, kun immunijärjestelmäsi on heikentyntä, jos olet stressaantunut tai antibioottikurun aikana.

## MIIHIN EMÄTINTABLETTEJA KÄYTETÄÄN?

- Bakteerien tai hiivan aiheuttamien emätintulehdusten hoitoon ja ehkäisyyn.
- Hoitamaan ja ehkäsemään epämieltyvä oireita kuten valkovuoto, kutina, kirvely tai haju.
- Emättimen terveen pH-arvon (pH 3,8–4,5) palauttamiseen ja ylläpitoon.

## MITEN EMÄTINTULEHDUS OIREILEE?

Tavallisimpia emätintulehdusen oireita ovat ärsytys, kutina, turvotus, epämieltyvä haju sekä epänormaali vuoto (tasainen, väriltään valkoinen, harmaa tai keltainen). Haju saattaa pahentua siemennesteen vaikutuksesta.

## MITEN EMÄTINTABLETTIT TOIMIVAT?

- Vaihe 1. Emätintulehdusset aiheuttavat emättimen normaalina tasapainon häiriöstä, siihen liittyvästä sienten ja/tai bakteerien liikakasvusta ja emättimen pH:n noususta.
- Vaihe 2. Emätintabletin asettamisen jälkeen tabletin vaikuttavat aineet muodostavat emättimen limakalvon pinnalle seinämäksi kosteuttavan ja voitelevan kerroksen.
- Vaihe 3. Vaikuttavat aineet palauttavat emättimen pH:n normaalille tasolle (pH 3,8–4,5). Tämän seurauksena tulehdus ja epämieltyvä oireet katoavat.

## KENELLE EMÄTINTABLETIT SOPIVAT?

Yli 16-vuotiaille naisille. Emätintabletteja voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana, mutta on suositeltavaa keskustella lääkärin kanssa ennen emätintablettien käyttöä, jos olet raskaana tai imettä.

## MITEN EMÄTINTABLETTEJA KÄYTETÄÄN?

- Pese kätesi ennen tabletin asettamista. Aseta yksi emätintabletti huolellisesti niin syvälle emättimeen kuin mahdollista (kuten tamponi).
- Käytä pikkuhoususuoja ja aseta emätintabletti mieluiten ennen nukkumaanmenoja, sillä joskus emätintabletti ei löökä kunokaan ja saattaa tulla osittain ulos. Tämä ei kuitenkaan haittaa, koska ainesosat ovat jo alkaneevaan vaikuttamaan hoitavasti.
- Oireet saattavat kadota 4 päivän käytön jälkeen. Jatka tästä huolimatta emätintablettien käyttöä koko hoitojakson loppuun asti.
- Voit käyttää emätintabletteja myös kuukautisten aikana.



	Annostus	Hoidon kesto
Hoito	1 emätintabletti päivässä	14 päivää
Ennaltaehkäisy	1 emätintabletti joka toinen päivä	14 päivää

## MITÄ AINESOSIA EMÄTINTABLETIT SISÄLTÄVÄT?

Cranberry-Active™, Laktitolimonohydraatti, hyaluronihappo, polyyleeniglykoli 6000, krospovidoni, magnesiumstearaatti, sitrunnahappoa. Emätintabletit eivät sisällä hormoneja, eikä niitä ole testattu eläimillä.

## VAROITUKSET

- Emätintabletit on tarkoitettu käytettäväksi vain emättimeen.
- Älä nidle emätintabletteja.
- Älä aloita hoitoa, jos sinulla on kuukautiset.
- Älä käytä tabletteja, jos yrität tulla raskaaksi.
- Älä käytä emätintabletteja, jos olet allerginen tai yliherkkä yhdelle tai useammalle sen sisältämälle ainesosalle. Löydät listan ainesosista tästä ohjeesta kohdasta "Mitä ainesosia tabletit sisältävät?"
- Keskustele lääkäriksi tai gynekologisi kanssa, mikäli oireet eivät hellitä viiden päivän kuluessa, jos virtsassasi on verta, jos sinulla on vatsakipua tai jos huomaat epätavallisia tai

epämieltyvä oireita.

- Nykytiedon mukaan emätintabletteja voidaan käyttää samanaikaisesti lääkkeiden kanssa. Jos olet epävarma, keskustele lääkäriksi tai gynekologisi kanssa.

## MITEN EMÄTINTABLETTEJA SÄILYTETÄÄN?

- Säilytä emätintabletit aina alkuperäisessä pakkauksessaan huoneenlämmössä (15–25 °C). Säilytä kuivassa ja valolta suojaudutta.
- Älä käytä emätintabletteja läpipainopakkauksessa ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä on merkity pakkaukseen ja läpipainopakkaukseen.
- Ei lasten ulottuville.

## MITÄ PAKKAUS SISÄLTÄÄ?

- 14 emätintabletti
- Käyttöohjeet

## TIETOA EMÄTINTULEHDUSISTA

Tiesitkö, että yksi kolmesta naisesta kärsii emätintulehdusista joskus elämänsä aikana ja että nämä tulehdusset uusivat herkästi? Emätintulehdusset johtuvat emättimen bakteritasapainon häiriöstä, ja useimmiten aiheutajana on bakteeri- tai hiivatulehdus. Emättimen bakteritasapaino voi häiriintyä myös intiimialueen saippuapesusta, tamponin jättämisenestä emättimeen liian pitkäksi aikaa tai puolustuskyyvin alentumisesta. Myös antibioottien käyttö, kierukan asennus, raskaus tai ehkäispilereiden käyttö voi aiheuttaa emättimen bakteritasapainon häiriötä. Jos pH nousee (ympäristöstä tulee vähemmän hapan), tietyinlaiset bakterit saavat tilaisuuden lisääntyä.

## i SAY: VINKKEJÄ

- Pidä yllä emättimen normaalina bakteritasapaino parhaasi mukaan.
- Älä käytä saippuaa. Huuhtelee intiimialue haalealla vedellä.
- Pyyhi takapuolesi edestä taaksepäin.
- Käytä puuvillaisia alusvaatteita aina kun mahdollista ja vältä liian tiukkoja vaatteita, jotta ilma pääsee intiimialueelle. Pese alusvaatteesi ärsyttämättömällä pesuaineella.

## i say: BE GOOD TO YOUR BODY

Drs Pieterhella A.M. Bouter

Revideret: Maj 2017

Senast reviderad: Maj 2017

Seloste tarkastettu: Touokuussa 2017

# Printproof

## ATTENTION!

We need an approved proof before we can start the production.  
Please fill in this form in clear writing.

Date:	26-07-2017	Proof no.: 1
Order no.:	333985	
Product Code:	14VI.IS.NOR.I.00 IFU I-Say	
Article no. Dobber:	M06701	
Size:	210 x 297 mm	<b>DOBBER</b> <b>HEALTHCARE</b> <b>LEAFLETS</b>
Folded:	210 x 25 mm	Dobber Healthcare Leaflets BV Westerwerf 13 1911 JA Uitgeest
Print color(s)		Phone +31 (0)251 311950 E-mail: <a href="mailto:info@dobberpharma.com">info@dobberpharma.com</a> <a href="http://www.dobberpharma.com">www.dobberpharma.com</a>
Front:	Black	
Back:	Black	
Square (oversteek):	-	
Optical code:	-	
Pharma code:	-	
Font:	-	
Font size:	-	
Leading:	-	

## To be filled in by client

Approved:  YES  NO

Date:

Name and signature:  
(This form belongs to SOP 'Werkzaamheden DTP-Studio'.)



Proefsticker DHL (Mac/Server/Proefsticker DHL 15112016,10)