


Mylan		PRODUCT TYPE LEAFLET	PRODUCT ENDWARTS PEN 3 ML	LANGUAGE NO/DK	COUNTRY NO/DK
USE SALE	PACK SIZE 210 x 450 mm	FOLD 25 x 210 mm	PRODUCT CODE 11706	MIN. FONT SIZE 6,5 PT	
COLOR: 3	BLACK	PANTONE 151 C	PANTONE 485 C		



BRUKSANVISNING



Etsende

Les bruksanvisningen nøyde før bruk.
Behold bruksanvisningen. Du kan få behov for å lese den igjen.
Kun til utvortes bruk.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

1. Hva VorteFri PEN er og hva den brukes mot
2. Hva du må vite før du bruker VorteFri PEN
3. Hvordan du bruker VorteFri PEN
4. Mulige bivirkninger
5. Oppbevaring og ytterligere informasjon

VorteFri™ PEN

1. HVA VORTEFRI PEN ER OG HVA DEN BRUKES MOT

VorteFri PEN er et effektivt vortefjerningsmiddel for behandling av vorter på hender, føtter, albuer og knær, på både barn og voksne. Den unike formuleringen i VorteFri PEN hjelper kroppen med å tørke ut og støte vekk vortene. VorteFri PEN absorberes direkte inn i vorten, og opplosningen etterlater ingen merker på huden. Like etter at du har påført opplosningen kan du ta på deg strømper eller bade.

VorteFri PEN er et svensk patent og CE-merket medisinsk utstyr som er biologisk nedbrytbart. Opplosningen hindrer at det utvikles bakteriekultur, og forårsaker ikke arr eller infeksjoner hvis det brukes riktig. Innholdet i VorteFri PEN holder til ca. 30 behandlinger.

2. HVA DU MÅ VITE FØR DU BRUKER VORTEFRI PEN

2.1 BRUK IKKE VORTEFRI PEN

- Må ikke brukes på ansiktsvorter, kjønnsvorter, mollusker, fødselsmerker, liktorner, hard hud eller andre hudforandringer. Hvis du er usikker på om hudforandringen er en vorte, kontakt lege.
- Dekk ikke til vorten med et plaster ved behandling med VorteFri Pen. Bruk av plaster etter behandling kan forårsake skader på huden, se pkt. 4. MULIGE BIVIRKNINGER.
- Må ikke brukes hvis vorten som behandles blir øm, blødende eller huden blir irritert. Ta en pause i behandlingen til huden blir normal igjen.
- Bruk ikke VorteFri PEN sammen med andre vortefjerningsmidler.
- Bruk ikke VorteFri PEN dersom du er allergisk overfor noen av innholdsstoffene, se pkt. 5 OPPBEVARING OG YTTERLIGERE INFORMASJON.

2.2 ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER



VorteFri PEN er **etsende** med en irriterende og sterk lukt. Skal ikke innåndes. Kun til utvortes bruk. **Oppbevares utilgjengelig for barn.**

Bruk ikke for mye! For mye opplosning eller feil bruk kan føre til smerte og hudskader, se pkt. 4. MULIGE BIVIRKNINGER.

- Hvis du påfører for mye eller ved et uhell påfører opplosningen på huden rundt vorten, skyll huden umiddelbart med rikelig med vann for å redusere skader på huden.
- Dersom du får opplosningen i øynene, må du skylle umiddelbart og gjentatte ganger med lunkent vann i minimum 15 minutter og kontakte lege eller ringe 113.

Vær spesielt forsiktig ved behandling av områder med tynn, sensitive hud, f.eks. på små barn og på oversiden av hånden, se pkt. 3.1 DOSERING OG BRUK, og 3.2 BRUK AV VORTEFRI PEN PÅ BARN.

Pennen må ikke ødelegges (må ikke åpnes, kuttes eller lages hull i).

3. HVORDAN DU BRUKER VORTEFRI PEN

3.1 DOSERING OG BRUK

Kun en liten mengde av opplosningen er nødvendig for å være virksom. Les instruksjonene nedenfor nøyde, da opplosningen er etsende. For å unngå å få opplosningen på huden rundt vorten, vær forsiktig og hold pennen med et fast grep ved påføring. Sett hetten ordentlig på etter bruk.

Pennen overfører en svært liten mengde med fargeløs væske når spissen presses mot vorten. Pennen kan oppleves som torr. Pennen er utformet slik at kun den nødvendige mengden av opplosningen for å behandle vorten kommer ut. For å se at pennan fungerer, sett spissen av pennan mot et papir. Du vil se et fuktig avtrykk på papiret. Du vil også merke en skarp lukt av produktet når du fjerner hetten.

Illustrasjon 1



Åpnes ved at hetten vrirs til den oransje streken på pennan er på linje med det lille hakket i hetten. Når de står på linje, kan hetten tryggt tas av pennan. Lukkes ved å føre hetten med hakket mot den oransje streken, trykk til og lås ved å vri det lille hakket bort fra den oransje streken. Se illustrasjon 1.



Påføring:

- Press tuppen av pennan lett mot vorten.
- Opplosningen vil avgå farge på vorten
- Påfør kun på selve vorten (illustrasjon A)

- For store vorter, tilt pennan for å påføre med en større flate av tuppen (illustrasjon B)



- Hold tuppen mot vorten i 3 sekunder

- Må ikke påføres på frisk hud

- Behandle **jevnlig én gang** i uken til vorten er helt borte.

Illustrasjon A Illustrasjon B

Ved behandling av vorter på **tynn hud** (f.eks. på oversiden av henderne/fottene/fingrene), kan det være tilstrekkelig med påføring av VorteFri PEN kun hver tredje eller andre uke.

Ved behandling av store, gamle vorter, klasevorter eller vorter med et tykt hudlag over, kan en **hyppigere** påføring være nødvendig.

Hvis vorten ikke responderer på behandlingen ved behandling en gang i uken, kan vorten behandles to ganger per uke, eller hver andre dag, så lenge huden ikke blir irritert.

PÅFØR IKKE FOR MYE - påfør kun i opptil 3 sekunder og kun på selve vorten.

Hvis du merker en brennende følelse eller irritasjon i huden (rødhet, prikkende, sviente følelse), må du stoppe behandlingen og se 4. MULIGE BIVIRKNINGER. Ikke start behandlingen igjen før irritasjonen har gått over.

Hvis ikke vorten forsvinner, kontakt legen din for videre behandling.

Ved behandling av **mange vorter**, start med et par ukers behandling av noen få vorter. Hvis huden er upåvirket, kan du fortsette med de øvrige vortene.

Hold vorten myk mellom behandlingene ved å smøre på vanlig hudolje. Da kan restene av vorten lettere komme ut.

I begynnelsen av behandlingen kan vorten bli hvit og begynne å vokse ut før den tørker inn. Når vorten utvider seg, kan det bli ømt i den omkringliggende huden. Pass på at det ikke er noe overliggende hud på vorten, se under.

Dersom vorten kjennes øm eller det dunker i den, kan det skyldes at du har påført for mye opplosning, se pkt. 2.1 BRUK IKKE VORTEFRI PEN, eller at vorten ikke kan komme ut gjennom hudovertaten. Om hud dekket vorten, må man lage en åpning i den med f. eks. en pinsett for å slippe vorten ut. Dersom du har en gammel eller hard vorte, kan du myke den opp ved å bløtlegge det berørte området i varmt vann til huden er myk. Pirk eller risp opp hudovertaten på vorten, f. eks. med en pinsett. På tykk hud med innovervendte vorter (fotvorter), fjern forsiktig den harde huden. På neglebåndsvorter må du kanskje lage et lite hull i den ytre huden, slik at vortemidlet kan trenge inn i vorten. Bruk ikke fil på vortene uten anbefaling fra helsepersonell. Vortene kan bli ømme og det kan danne seg ny hard overflate på vortene.

Etter noen behandlinger kommer det ofte svarte prikker i vorten. Det er små blodårer som forsyner vorten med blod. Det er et tegn på at vorten er i ferd med å forsvinne, og behandlingen skal fortsette til de små svarte prikkene og vorten er helt borte. Noen ganger kan de svarte prikkene blø litt når du skraprer på vorten. Vent noen få minutter før påføring av opplosningen, til blødningen har stoppet, ellers kan det svi litt. Dersom det svir, tilfør straks kaldt vann for å lindre ubehaget.

3.2 BRUK AV VORTEFRI PEN PÅ BARN

Barn skal alltid behandles av en voksen. Følg pkt. 3.1 DOSERING OG BRUK nøyde, da opplosningen er etsende. Små barn har myk og tynn hud. Bruk veldig lite VorteFri PEN på barnevorter. Vortene er som oftest borte etter 2-3 behandlinger.

Barn under 4 år kan behandles med VorteFri PEN, men forsikre deg alltid om at det virkelig er en vorte og ikke en annen type hudforandring. Rådfør deg med din lege eller helsestasjon før du behandler. For barn under 4 år er det spesielt viktig å vurdere behandlingsstedet (barn har myk, tynn hud) og redusere doseringen. Behandle sjeldnere, f. eks. hver annen eller tredje uke.

- Press tuppen av pennan lett mot vorten én gang i 3 sekunder. Opplosningen vil avgå farge på vorten.
- Unngå kontakt med huden rundt vorten.
- Dersom barnet kan komme til å slikke på vorten, kan man vaske det behandelte området med vann, da opplosningen trenger inn i vorten med det samme.
- Dersom det svir eller stikk der ved behandlingen, skyll vorten med kaldt vann og påfør ikke mer vortemiddel. Det har allerede rukket å trenge inn i vorten.

Hvis barnet merker en brennende følelse eller irritasjon i huden (rødhet, prikkende, sviente følelse), må behandlingen stoppes og se 4. MULIGE BIVIRKNINGER. Ikke start behandlingen igjen før irritasjonen har gått over.

3.3 BEHANDLING AV PERSONER MED DIABETES

Diabetikere skal kun bruke VorteFri PEN på vorter på frisk hud (uskadet og upåvirket av diabetessykdommen) og med ekstra stor forsiktigheit. Ved komplikasjoner skal du alltid rådføre deg med din lege/sykepleier eller fotpleier.

3.4 HVOR LENGE SKAL VORTEFRI PEN BRUKES

VorteFri PEN er svært effektivt – de fleste vorter forsvinner og kommer ikke tilbake. Noen ganger kan vorter, som allerede finnes i underhuden, dukke opp når du starter behandling.

Vorter kan se forskjellig ut, og tiden det tar å fjerne dem kan derfor variere. Vanligst er 5-15 behandlinger, men det kan også ta kortere eller lengre tid. Faktorer som kan påvirke hvor lenge du må behandle før vortene forsvinner kan være din alder, hvilken type vorte det er, ditt immunforsvar, hvor vorten befinner seg, og hvor lenge du har hatt den. Nedsatt immunforsvar og medisining med f.eks. kortison kan føre til at det tar lengre tid å bli kvitt vortene. Nye vorter er vanligvis enklere å bli kvitt enn gamle vorter. Barnevorter er som oftest lettere å fjerne enn vorter på voksne. For innovervendte fotvorter og neglebåndsvorter som har vært der i flere år, kan det ta lang tid før man ser tydelig effekt av behandlingen, og det tar betydelig lengre tid før vorten blir helt borte.

3.5 NÅR SKAL JEG SLUTTE Å BEHANDLE MED VORTEFRI PEN

Avslutt behandlingen med VorteFri PEN når det ikke lenger er synlige svarte prikker, når vorten har ramlet av, skrumpet sammen eller det er en fordyppning der hvor vorten har vært. Etter en tid blir huden normal igjen. Dersom du fortsetter å behandle lenge etter at vorten er borte, blir huden lett rosa og fuktig. Slutt å bruke VorteFri PEN umiddelbart. Etter noen uker, sjekk der vorten var. Dersom det finnes rester av vorten, vil du se en liten prikk. Behandle da med VorteFri PEN et par ganger til.

3.6 VED GRAVIDITET OG AMMING

Det finnes ingen kjente risikoer ved graviditet og amming.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

VorteFri PEN inneholder en sterk syre som kan forårsake hudskader ved påføring av for mye opplosning, eller ved uriktig bruk, se pkt. 2.1. BRUK IKKE VORTEFRI PEN. Følg instruksjonene i pkt. 3.1 DOSERING OG BRUK for å unngå hudskader.

Middertidige bivirkninger kan forekomme på applikasjonsstedet, som for eksempel ømhet, stikkende, smerte, rødhet, og brennende følelse eller blodning fra blodkapillærer. Ta en pause i behandlingen til huden er tilhelt.

Påføring av for mye opplosning og feil kan føre til sterke hudreaksjoner som f.eks. blemmmer, sår, mørk pigmentering i huden, kjemiske brannsår, betennelse, dødt hudlev (nekrose) eller arr. Det skadde området bør holdes rent for å unngå infeksjon. Stopp behandlingen og ved alvorlige hudskader, kontakt lege.

VorteFri PEN har en sterk lukt som kan irritere luftveiene og øynene. Lukt ikke på innholdet i pennan. Bivirkninger kan for eksempel være irritasjon i luftveiene og/eller halsen, rennende nese, rennende øyne eller pustevansker.

Det har blitt rapportert enkelte tilfeller av allergisk reaksjon som for eksempel rødhet, utslett og kløe.

5. OPPBEVARING OG YTTERLIGERE INFORMASJON

Oppbevaring: **Oppbevares utilgjengelig for barn.** Oppbevares mellom 15-25°C, helst stående med hetten vendt ned.


Innhold: Fargelos til brunaktig opplosning (maursyre, vann, glyserol, sitronolje).

Pakning: Pennapplikator med hette og bruksanvisning. Hetten har en to-trinns åpningsfunksjon, se 3.1 DOSERING OG BRUK.

Holdbarhet: Se datomerkingen på pennan og ytteremballasjen. Holdbar i 6 måneder etter åpning.

Denne bruksanvisning ble sist oppdatert juli 2018.

Mylan		PRODUCT TYPE LEAFLET	PRODUCT ENDWARTS PEN 3 ML	LANGUAGE NO/DK	COUNTRY NO/DK
USE SALE	PACK SIZE 210 x 450 mm	FOLD 25 x 210 mm	PRODUCT CODE 11706	MIN. FONT SIZE 6,5 PT	
COLOR: 3	BLACK	PANTONE 151 C	PANTONE 485 C		



BRUGSANVISNING



Ætsende

Læs brugsanvisningen nøje før brug.
Gem brugsanvisningen, du kan få brug for at læse den igen.
Kun til udvortes brug.
Opbevares utilgængeligt for børn.

1. Hvad VorteFri PEN er, og hvad den anvendes til
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge VorteFri PEN
3. Sådan skal du bruge VorteFri PEN
4. Eventuelle bivirkninger
5. Opbevaring og yderligere oplysninger

Becur VorteFri™ PEN

1. HVAD VORTEFRI PEN ER, OG HVAD DEN ANVENDES TIL

VorteFri PEN er et effektivt middel til at fjerne vorter på hænder, fodder, alburer og knæ, hos både voksne og børn. Den unikke sammensætning i VorteFri PEN hjælper kroppen til at udtrørre og afstøde vorterne. VorteFri PEN absorberes direkte ind i vorten og efterlader ingen spor på huden. Du kan f.eks. tage strømper på, eller bade, umiddelbart efter brug.

VorteFri PEN er svensk patenteret og CE mærket medicinsk udstyr, der er biologisk nedbrydeligt. Oplosningen er selvkonserverende. Ved korrekt brug giver VorteFri PEN hverken ar eller infektioner. Indholdet i VorteFri PEN rækker til cirka 30 behandlinger.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE VORTEFRI PEN

2.1 BRUG IKKE VORTEFRI PEN

- Brug ikke VorteFri PEN på ansigtsvorter, kønsvorter, vandvorter, modermærker, ligtorne, hård hud eller andre hudforandringer. Kontakt lægen hvis der er tvivl om, hvorvidt der er tale om en vorte.
- Dæk ikke vorten med et plaster efter behandling med VorteFri PEN. Brug af plaster efter behandling kan medføre skader på huden, se punkt 4. MULIGE BIVIRKNINGER.
- Brug ikke VorteFri PEN, hvis den behandlede vorte bliver øm eller bløder, eller huden bliver irriteret eller får sår. Hold pause med behandlingen indtil huden igen er normal.
- Brug ikke VorteFri PEN i kombination med andre metoder til at fjerne vorter.
- Brug ikke VorteFri PEN hvis du er allergisk over for nogle af indholdsstofferne, se punkt 5. OPBEVARING OG YDERLIGERE OPLYSNINGER.

2.2 ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER



VorteFri PEN er **ætsende** med irriterende og stærk lugt. Må ikke indåndes. Kun til udvortes brug. **Opbevares utilgængeligt for børn.**

Brug ikke for meget! For meget oplosning eller forkert anvendelse kan medføre smærter og hudskader. Se punkt 4. EVENTUELLE BIVIRKNINGER.

- Hvis du bruger for meget, eller ved et uheld kommer til at påføre oplosningen på den omkringliggende hud, skal du øjeblikkeligt skylle huden med rigeligt vand, for at mindske skader på huden.
- Hvis det kommer i øjnene, skal du skylle med rigeligt lukkent vand i min. 15 minutter og kontakte læge eller skadestue.

Vær særlig forsiktig ved behandling af steder med tynd, sart hud, f.eks. hos børn eller på håndryggen. Se punkt 3.1 DOSERING OG ANVENDELSE og 3.2 BEHANDLING AF BØRN.

Pennen må ikke ødelægges (må ikke åbnes, skærbes i eller laves hul i).

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE VORTEFRI PEN

3.1 DOSERING OG ANVENDELSE

Der skal kun bruges ganske lidt af oplosningen, for at VorteFri PEN er virksomt. Læs vejledningen nedenfor omhyggeligt da oplosningen er **ætsende**. For at undgå at få oplosningen på huden omkring vorten, hold pennen omhyggeligt med et fast grep ved påføring. Sæt hætten korrekt på efter brug.

Pennen afgiver en lille mængde farveløs væske, når spidsen trykkes mod vorten. Pennen kan opleves som tør. Pennen er designet således, at kun den nødvendige mængde oplosning til behandling af vorten, kommer ud. For at teste, at pennen virker, holder du spidsen af pennen mod et stykke papir. Du vil se et fugtigt aftryk på papiret. Du vil også opleve en skarp lugt fra produktet, når du fjerner hætten.

Figur 1



Åbnes ved at dreje på hætten til den orange streg på pennen er ud for hakket i hætten. Når de er på linje, kan hætten sikret tages af pennen. For at lukke hætten, sæt den på pennen og drej til lukket position. Se figur 1 ovenfor.



Påføring:

- Hold spidsen af pennen let mod vorten, og påfør oplosningen på vortens overflade
- Påfør kun på selve vorten. Dæk hele vorten (illustration A)

- På store vorter tiltes pennen (illustration B)

- Hold spidsen mod vorten i 3 sekunder

- Må ikke påføres på rask hud

- Der behandles **regelmæssigt** en gang om ugen, indtil vorten er fuldstændig forsvundet.



Ved behandling af vorter på **tynd hud** (f.eks. på oversiden af hænder/fodder/fingre), kan det være tilstrækkeligt med en enkelt påføring hver anden eller tredje uge.

Ved større, gamle vorter, fodvorter og vorter med et tykt hudlag over, kan en **hyppigere** påføring være nødvendig.

Hvis vorten ikke responderer på en ugentlig behandling, behandles der to gange ugentligt eller hver anden dag, så længe huden ikke bliver ømme.

PÅFØR IKKE FOR MEGET - påfør kun i op til 3 sekunder og kun på selve vorten.

Hvis du mærker en brændende følelse eller irritation (rødme, snurren, stikken) skal behandlingen stoppes, og se under pkt. 4 MULIGE BIVIRKNINGER. Behandlingen bør ikke genoptages, før irritationen er forsvundet.

Hvis vorten ikke forsvinder, skal du kontakte din læge.

Ved behandling af **mange vorter** skal du starte med at behandle et par stykker i nogle uger. Hvis huden er upåvirket, kan du fortsætte med resten af vorterne.

Sørg for at holde vorten blød mellem behandlingerne ved at smøre den med almindelig fugtighedscreme eller olie. På den måde kan vorteresterne lettere komme ud.

Vorten kan i begyndelsen blive hvid og vokse lidt udad, inden den begynder at udtrørre. Når vorten udvider sig, kan den omgivende hud blive øm. Sørg for at der ikke er hud, som ligger over vorten og forhindrer vorten i at blive afstødt. Se nedenfor.

Hvis vorten er øm, eller hvis det dunker i den, kan det skyldes, at du har brugt for meget oplosning. Se punkt 2.1 BRUG IKKE VORTEFRI PEN. Det kan også skyldes at vorten ikke kan komme op/ud gennem huden over vorten. Hvis huden ligger som et lår over vorten, skal man lave en åbning i huden, f.eks. med en pincet, så vorten kan komme ud. Hvis du har en gammel eller hård vorte, skal du gøre huden blød ved at lægge området i varmt vand indtil huden er blød. Pil huden på vorten op f.eks. med en pincet. Ved tyk hud på indadgående fodvorter kan man forsigtigt fjerne den hårde hud. På neglebåndsvorter kan det være nødvendigt at lave et lille hul i det yderste af huden, så oplosningen kan trænge ind i vorten. Du må ikke file på vorterne uden anbefaling fra sundhedspersonalet. Vorterne kan blive ømme, og der kommer ny hård hud på vorterne.

Efter nogle få behandlinger kan man ofte se sorte prikker i vorterne. Det er små blodkar, som forsyner vorten med blod. Det er tegn på, at vorten er på vej til at forsvinde, og behandlingen skal fortsættes, indtil de sorte prikker og vorten er helt væk. Nogle gange kan de sorte prikker bløde lidt, hvis du skraber på vorten. Vent nogle minutter med at påføre oplosningen, indtil blødningen er stoppet, da det ellers kan svide. Hvis det svider, kan du komme kaldt vand på for at lindre ubehaget.

3.2 BEHANDLING AF BØRN

Børn bør altid behandles af en voksen. Følg nøje 3.1 DOSERING OG ANVENDELSE, da oplosningen er **ætsende**. Små børn har blød og tynd hud. Anvend kun lidt VorteFri PEN på vorter hos børn. Vorterne er typisk væk efter 2-3 behandlinger.

Børn **under 4 år** kan behandles med VorteFri PEN, men kontroller altid, at det virkelig er en vorte og ikke en anden type hudforandringer. Rådfør dig med din læge eller sundhedsplejerske før behandlingen. Til børn under 4 år er det særligt vigtigt at vurdere behandlingsstedet (børn har blød, tynd hud) og at reducere behandlingsfrekvensen. Det anbefales at behandle mindre hyppigt, f.eks. hver anden eller tredje uge.

- Hold spidsen af pennen let mod vorten **en gang** i 3 sekunder, og påfør oplosningen på vortens overflade.
 - Pas på ikke at røre huden rundt om.
 - Hvis barnet kan komme til at slikke på vorten, kan man vaske det behandlede område med vand, eftersom oplosningen trænger ind i vorten med det samme.
 - Hvis det svider eller stikker under behandlingen, skal du skylle vorten med koldt vand og ikke påføre mere VorteFri PEN. Det er allerede trængt ind i vorten.
- Hvis barnet mærker en brændende følelse eller irritation (rødme, snurren, stikken) skal behandlingen stoppes, og se under pkt. 4 MULIGE BIVIRKNINGER. Behandlingen bør ikke genoptages, før irritationen er forsvundet.

3.3 BEHANDLING AF PERSONER MED DIABETES

Diabetikere må kun anvende VorteFri PEN på frisk hud, som er uskadet og upåvirket af sygdommen, og de skal være ekstra forsigtige. Ved problemer skal du altid rådføre dig med din læge/sygeplejerske eller fodterapeut.

3.4 HVOR LÆNGE SKAL MAN ANVENDE VORTEFRI PEN?

VorteFri PEN er meget effektiv – de fleste vorter forsvinder og kommer ikke igen. Nogle gange kan vorter, der har ligget under huden, dukke op, når du begynder at behandle.

Vorter kan være meget forskellige og det kan derfor variere, hvor lang tid det tager at fjerne dem. Det kræver normalt 5-15 behandlinger, men det kan også tage kortere eller længere tid. Der er nogle faktorer, der påvirker, hvor lang tid du skal behandle dine vorter, før de forsvinder. Det er f.eks. din alder, hvilken type vorte det er, dit immunforsvar, hvor vorten sidder, og hvor længe du har haft den. Nedsat immunforsvar og medicinering med f.eks. kortison kan gøre, at det tager længere tid at komme af med vorterne. Det er oftest lettere at fjerne nye vorter end gamle vorter. Vorter på børn er ofte lettere at fjerne end vorter på voksne. Ved indadgående fodvorter eller neglebåndsvorter, som har siddet i mange år, kan det tage lang tid, før man kan se en tydelig effekt af behandlingen, og det tager væsentlig længere tid, inden vorten er helt væk.

3.5 HVORNÅR SKAL JEG STOPPE MED AT ANVENDE VORTEFRI PEN?

Du skal stoppe med at bruge VorteFri PEN, når du ikke kan se flere sorte prikker, eller hvis vorten er faldest af, skrumpet væk, eller der er en fordybning, hvor vorten har været. Huden bliver med tiden normal. Hvis man fortsætter behandlingen for længe, efter at vorten er væk, kan huden blive let rosa og lidt fugtig. Stop at øjeblikkeligt med at bruge VorteFri PEN. Kontroller efter et par uger, hvor vorten har været. Hvis der er vortesterne tilbage, er der en lille prik. Hvis det er tilfældet, skal du behandle med VorteFri PEN et par gange til.

3.6 VED GRAVIDITET OG AMNING

Der findes ingen kendt risiko ved brug af VorteFri PEN under graviditet og amning.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

VorteFri PEN indeholder en stærk syre. Hvis oplosningen anvendes i for store mængder, eller anvendes forkert, kan det medføre skader på huden. Se punkt 2.1 BRUG IKKE VORTEFRI PEN. Følg anvisningerne i punkt 3.1 DOSERING OG ANVENDELSE for at undgå skader på huden.

Der kan opstå midlertidige, ikke alvorlige bivirkninger på det hudområde hvor VorteFri PEN er anvendt, f.eks. sviden, smerte, rødme, brændende fornemmelse i huden eller blødning fra små blodkar. Hold pause med VorteFri PEN indtil huden igen er normal.

Hvis oplosningen anvendes i for store mængder, eller anvendes forkert, kan der opstå svære hudreaktioner, f.eks. blistre, sår, mørk pigmentering i huden, kemisk forbrænding, betændelse, vævsddød eller ar. Det beskadigede hudområde skal holde rent for at undgå infektion. Stop behandlingen og ved alvorlige hudskader kontakt en læge.

VorteFri PEN har en stærk lugt og kan irritere andedrætsorganer og øjne. Lugt ikke til indholdet i pennen. Bivirkninger kan være f.eks. irritation af andedrætssystemet og/eller irritation af svælg, løbende næse, løbende øjne eller besvær med at trække vejret.

Der er rapporteret enkelte tilfælde af allergiske reaktioner, f.eks. svide, udslæt og klø.

5. OPBEVARING OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Opbevaring: **Opbevares utilgængeligt for børn.** Opbevares ved 15-25 °C, helst stående med hætten nedad.

Indhold: Farveløs til let brun oplosning (myresyre, vand, glycerol og citronolie).

En pakning indeholder: Pålørsprøn med hætte og brugsanvisning.

Hætten har en to-trins åbningsfunktion, se 3.1 DOSERING OG ANVENDELSE.

Holdbarhed: Se udløbsdato på pen og æske. Holdbar 6 måneder efter åbning.

Denne brugsanvisning blev senest revideret juli 2018.