

Plats  
för  
porto

ocean

Tejpa här

Ocean AB

Norra Torggatan 15  
434 30 Kungsbacka  
Sverige**SE Silicea Mag-Tarm Gel**

Läs noggrant igenom den här bipacksedeln. Den innehåller viktig information om hur man använder **Silicea Mag-Tarm Gel**. Om du har några frågor kontakta utbildad rådgivare på apotek eller hälsobutik.

**När bör jag använda Silicea Mag-Tarm Gel?**

**Silicea Mag-Tarm Gel** är en medicinteknisk produkt godkänd för behandling av **tillfälliga (akuta) och kroniska mag-tarm problem samt IBS**.

**Silicea Mag-Tarm DIREKT hjälper att återställa magens naturliga balans.**

**Produktinformation**

Den aktiva ingrediensen i **Silicea Mag-Tarm Gel** är kiselgel (kiselhydrat), en förening som består av mineralet kisel (Si) med syre och vatten. Kiselgel har en ovanlig hög bindningsförmåga, inte bara för att binda patogener och deras toxiner utan även för gaser. Således kan det också minska irriterande gaser. Det betyder att gaser, patogener och deras toxiner är bundna även rent fysisk process i mag-tarmkanalen och utsöndras naturligt genom tarmarna. Det lugnar och stöder regenerering av det upprörda mag-tarmkanalen.

**Silicea Mag-Tarm Gel** har en förmåga att binda patogener för att hjälpa och behandla gastrointestinala problem associerade med magsmärtor, illamående, kräkningar, flatulens (gaser), och diarré. Förutom behandling vid akuta mag-tarmproblem rekommenderas även **Silicea Mag-Tarm Gel** för långvarig behandling vid kroniska mag-tarm problem som illamående, gaser, kramp, diarré, kräkningar och halsbränna.

Fri från tillsatser och även lämplig för barn.

**Hur länge och hur ofta kan jag använda Silicea Mag-Tarm Gel?**

**Akuta/Tillfälliga symtom som magsmärtor, illamående, kräkningar, gaser och diarré:** Barn och vuxna rekommenderas 2 dosmätt (2 x 15 ml) 3 till 5 gånger per dag, direkt, alternativt blanda i valfri dryck och vid behov även före sänggående. När de akuta symtomen har minskat kan behandlingen fortsätta några dagar med 1 dosmätt (15 ml) 3 gånger per dag.

**Kroniska problem:** Rekommenderad för långvarig behandling upp till 6 veckor vid kroniska **mag-tarmsvär som illamående, gaser, magkramp, diarré, kräkningar och halsbränna:**

Vuxna rekommenderas inte 1 dosmätt direkt, alternativt blanda i valfri dryck, 3 ggr/dag på tom mage eller mellan måltider. Vi rekommenderar en behandling upp till 6 veckor, symtomen bör avta efter 3 veckor. **Även lämplig för behandling vid IBS.**

**VÄNLIGEN NOTERA/VIKTIG AT NOTERE**

Uppstår kraftig smärta/stærke smelter, hög/høj feber eller om behandlingen inte har effekt/symptomen inte aftager inom 3 dagar, vänligen kontakta en läkare/læge. Denna medicintekniska produkt har inga kända/kendte biverkningar men vi rekommenderar ändå dig som är gravid eller ammar att innan intag först konsultera med din läkare eller barnmorska/jordemoder.

Ett meddelande till användaren och/eller patienten om att alla allvarliga tillbud som har inträffat i samband med produkten bör rapporteras till tillverkaren (customerservice@huebner-vital.de) och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

En meddelelse till brukeren och/eller patienten om, at enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med produktet, bør indberettes til producenten (customerservice@huebner-vital.de) og den rette myndighed i den medlemsstat, hvor brukeren og/eller patienten hører hjemme.

**BIVERKNINGAR/BIVERKNINGER**

Inga kända biverkningar.

**SÄRSKILDA/SÆRLIGE RÅD**

Flaskan skakas/rystes före användning.

Om du lider av diarré är det viktigt att kompensera vätskeförlusten/væsketab genom att dricka mycket vätska/væske, detta är speciellt/især viktigt för barn. Det är också viktigt att följa en sund och balanserad diet/kost vid användandet av Silicea Mag-Tarm Gel under längre perioder.

**DK Silicea Mave-Tarm Gel**

Læs indlægssedlen omhyggeligt. Den indeholder vigtige oplysninger om hvordan du anvender **Silicea Mave-Tarm Gel**. Hvis du har spørgsmål, så spørg en uddannet rådgiver på et apotek eller helsebutik.

**Hvornår skal jeg bruge Silicea Mave-Tarm Gel?**

**Silicea Mave-Tarm Gel** er et medicinteknisk udstyr, der er godkendt til behandling af akutte og kroniske mave-tarm problemer og ved irriteret tyktarm (IBS).

**Silicea Mave-Tarm Gel** hjælper med at genoprette maveens naturlige balance.

**Produktinformation**

Den aktive ingrediens i **Silicea Mave-Tarm Gel** är kiselgel(kiselsyregel), en blanding som består af mineralet silicium (Si) med ilt og vand. Kiselgel har en usædvanlig høj bindingsevne, ikke kun når det gælder patogener og deres toksiner, men også for tarmgas.

Således kan det også mindske generende flatulens (prutten) Det betyder, at tarmgas, patogener og toxiner herfra bindes rent fysisk til kiselgelen i mave-tarmkanalen og udskilles med afføringen. Det dæmper og lindrer symptomer og understøtter regenerering af mave-tarmkanalen.

**Silicea Mave-Tarm Gel** har evnen til at binde patogener, og det udnyttes til behandling af gastrointestinale problemer som mavesmerter, kvalme, opkast, flatulens (tarmgas) og diarré. Udover behandling af akutte mave-tarmproblemer, anbefales Silicea Mave-Tarm Gel også til langtidsbehandling af kroniske mave-tarmproblemer såsom kvalme, flatuens, krampe, diarré, opkast og halsbrand. Fri for tilsætningsstoffer, og er også velegnet til børn.

**Hvor længe og hvor ofte kan jeg bruge Silicea Mave-Tarm Gel?**

**Akutte symptomer som ondt i maven, halsbrand, kvalme, opkastning, oppustethed og diarre:** Børn og voksne bør tage 2 målebægere (2 x 15 ml) 3 til 5 gange om dagen. Tages mellem måltiderne, og om nødvendigt inden sengetid. Efter de akutte symptomer er reduceret, kan behandling fortsætte med 1 målebæger (15 ml) 3 gange om dagen.

**Ved kroniske problemer:** Anbefales til langvarig behandling i op til 6 uger, ved kroniske **gastrointestinale lidelser som kvalme, tarmgas, mavekramper, diarré, opkastning og halsbrand:** Voksne anbefales at tage 1 målebæger (direkte, eller blandet med vand/saft) 3 gange dagligt på tom mave eller mellem måltiderne. Kroniske tilstande behandles i op til 6 uger. Symptomerne bør aftage indenfor 3 uger. **Også egnet til behandling af IBS.**

**INTERAKTIONER/KOMBINATIONSBEHANDLING****Vad bör jag tänka på om jag använder läkemedel/medicin**

Eventuell medicin bør tas minst två/to timer før/eller efter det at man tagit Silicea Mag-Tarm Gel eftersom/da effekten/virkningen av läkemedlet annars/ellers kan påverkas.

**KONTRAINDIKATIONER**

Det finns inga kända kontraindikationer.

**FÖRVARING/OPBEVARING**

Använd/brug inte/ikke efter bäst före datumet som står på dosmätt/målebægere och på ytterförpackningen. Förvaras ej över 25°C. Förvaras/Opbevares utom räckhåll/utilgængeligt för barn/børn.

**KOMPOSITION /SAMMENSÆTNING**

Aktiv substans: 100 ml gel innehåller 100 ml kiselgel (kiselhydrat) med 3,5 g kiseloxid.

**INNEHÅLL/INDHOLD**

Flaska innehållande 200 ml/500 ml gel för invärtes bruk.

Datum för revidering: mars 2020

**MEDICINTEKNISK PRODUKT/MEDICINSK UDSYR**

MD CE 0297



GI01910-10

HÜBNER GmbH & Co. KG			
Artikelcode	Format	Farben	Stand
GI01910-10	240 x 210 mm	Pantone 287 C	17.08.2020



## Vikten av en hälsosam mag-tarmkanal och tarmflora för din hälsa

Din mage och tarm är bland kroppens viktigaste organ och utgör ett mångfacetterat matsmältningssystem vars kedja av harmoniska interaktioner är avgörande för vårt välbefinnande. Om denna kedja är störd, kan vårt matsmältningssystem inte längre uppfylla sina viktiga funktioner.

### Orsaker

Många magproblem orsakas av vår livstil. Det kan handla om t ex kost, motion, rökning, alkohol, stress eller läkemedel. Dessa faktorer kan utgöra en större risk att råka ut för flera vanliga magproblem, då de ofta uppkommer av liknande orsaker.

### Konsekvenser

Ett massivt intrång av patogener (patogener är ämnen som orsakar sjukdomen/besvären) och deras toxiner (gifter) i mag-tarmkanalen kan orsaka gastrointensinala besvär såsom ont i magen, magkramp, gaser, diarré, illamående, uppblåst och spänd, uppsvälld mage eller känsla av fullhet.

### Behandling med Silicea Mag-Tarm Gel

Patogener och deras toxiner är bunda till en helt fysikalisk process i mag-tarmkanalen och försvinner naturligt via tarmen.

Silicea Mag-Tarm Gel är ren mineralisk kiselgel utan konserveringsmedel. Även lämplig/velegnet för barn.

Det dosmätt som finns med i förpackningen är en medicinteknisk produkt och har CE märkning.

### TILLVERKARE

ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG  
Schlossstrasse 11-17  
79238 Ehrenkirchen Tyskland  
www.huebner-vital.com

### MARKNADSFÖRS I SVERIGE AV

OCTEAN AB, Norra Torgg. 15, Kungsbacka.  
Kontakt: 010-703 68 00, info@ocean.se  
www.ocean.se/www.silicea.se

### MARKEDSFÖRES I DANMARK AF

OCTEAN PHARMA ApS - Kundekontakt: 38 422 133,  
info@ocean.se - www.ocean.dk

## Silicea Mag-Tarm Gel och IBS

Flertalet randomiserade, dubbel-blind, kontrollerade studier har gjorts på produkter innehållande kiselgel, som alla övervägande arbetar via principen för adsorption.

**Studierna konstaterade en signifikant förbättring av både varaktighet (längden) och symtomen på olika gastrointensinala (mag-tarm) infektionssjukdomar.** Aktuell forskning visar en förbättring, i detta fall på IBS, och att effekten är utmärkande och symtomen påverkas positivt vid användning av kiselgel. I forskningen kunde det påvisas en anmärkningsvärd minskning av det pro-inflammatoriska proteinet Zonulin, som är **betydande för nedsatt tarmbarriärfunktion vid IBS.**

Baserat på dessa resultat rekommenderas Silicea Mag-Tarm Gel som ett användbart terapeutisk **hjälpmedel vid behandling/minskning av IBS-symtom.** Silicea Mag-Tarm Gel är redan idag godkänd för användning vid akuta besvär, såsom magont, illamående, kräkningar, flatulens (gasbildning) och diarré. Den är även godkänd vid kroniska besvär såsom halsbränna, uppblåst mage, mättadskänsla och magkramp. Baserad på den nya forskningen som gjorts visar det att tillämpningsområdena för Silicea Mag-Tarm Gel har utökats till att nu även inkludera patienter som lider av Irritable Bowel Syndrom (IBS).

### IRRITABLE BOWEL SYNDROME/IBS

IBS, Irritable Bowel Syndrome, är en funktionell mag- och tarmstörning som innebär ökad känslighet i hela matspjälkningskanalen. IBS kallas också för känslig tarm, irriterad tarm eller funktionella tarmbesvär.

Typiska besvär vid IBS:

- » ont i magen/kramp
- » Uppblåsthet
- » Förstoppning/Diarré
- » Problem att tömma tarmen

Det är inte klarlagt varför man får IBS, men det finns vissa faktorer som bidrar till besvären, bland annat psykosociala faktorer, förändringar i funktionen av tarmens egna muskler och nerver tillsammans med samspillet med nerver till och från hjärnan. Man kan inte bota IBS, men det går att lindra symtomen.

För mer information [www.levamedibs.se](http://www.levamedibs.se) [www.1177.se](http://www.1177.se)



## VINN/VIND Silicea Mag-Tarm Gel

Det är viktigt för oss att få del av/lære dina erfarenheter/erfaringer. Vi är tacksamma/taknemiige om du vill fylla i nedanstående formulär eller gå in på [www.ocean.se/formularmage](http://www.ocean.se/formularmage). **DANMARK: [www.ocean.dk/formularmave](http://www.ocean.dk/formularmave)** och fyll i direkt. Som tack för hjälpen/hjælpen är du med i vår utlottning/konkurrence med dragning fyra/fire gånger per år. Du kan vinna/vinde en Silicea Mag-Tarm Gel 15 x15 ml alternativt en biobiljett/biografbiljet. Dessutom kommer du successivt/løbende att få/modtage nyhetsbrev och förmånliga erbjudanden/tilbud från oss.

Namn/Navn  
(Var vänlig texta)

Adress/Adresse

Postnr/Ort/By

Ålder/alders

E-mail

I/MED VILKET/HVILKET SYFTE/FORMÅL TAR DU Silicea Mag-Tarm Gel?

Du kan välja flera, rangordna gärna

- Ont i magen/ond i maven . . . . . ( )
- Gaser/oppustethed . . . . . ( )
- Illamående/kvalme . . . . . ( )
- Kräkningar/opkastning . . . . . ( )
- Diarré/diarre . . . . . ( )
- Halsbränna/halsbrand . . . . . ( )
- IBS/IBS irriteret tyktarm . . . . . ( )
- Övriga kommentarer: \_\_\_\_\_

HUR/HVORNÅR LÄNGE HAR DU ANVÄNT/ANVENDT PRODUKTEN?

NÄR OCH HUR SNABBT/HURTIGT BÖRJADE/BEGYNDTE DU MÄRKA EFFEKT?

HAR SILICEA MAG-TARM/MAVE-TARM MOTSVARAT DINA FÖRVÄNTNINGAR?

Ja  Nej

Kommentera gärna: \_\_\_\_\_

TAR DU LÄKEMEDEL/MEDICIN FÖR DINA MAGPROBLEM?

T ex Losec, Nexium eller Novalucol . . . . . Ja  Nej

Vid nej - Beror det på att behandling med Silicea Mag-Tarm Gel räcker? . . . . . Ja  Nej

Kommentera gärna: \_\_\_\_\_

KAN DU TÄNKA DIG ATT EV. STÄLLA UPP SOM REFERENS Ja  Nej

OM JAG VINNER VILL JAG HELST HA

Silicea Mag-Tarm/Mave-Tarm  Biobiljett/biografbiljet

