


Opperves ved støttemperatur. Indpakningene viser under alle omstændigheder den nødvendige beskyttelse, så produktet ikke forringes under den normale håndtering.

**OPBEVARING:**

Produktene er ikke-størlig i hæderholder i en skæde eller rød. Tag kontakten til din læge inden brug af plastrene, hvis du lidet af særlige sygdomme angænde kredsløbet (se i forbundelse med mikrokredsløbet) eller musklerne. Avnuende ikke plastrene, hvis det udviser synlige tegn på slitage eller fejl. Først straks plastene, hvis der er tegn på overfrosning (eksempelvis kløe og redme).

**ADVAREL:**

Kan anvendes i tilfælde af ubehag ved mensuration. Først placere et stykke plastefra huden af patienten. Plastene vil forståtte med at virke, også selvom de bliver vede (fx i brusebadet). Hvis nødvendigt, gentag behandlingen den efterfulgt med en samme mæde. Vænt ca. 2 minutter før børvegelsen for at sløre, at plastene klapper hen til huden. Det varer til 13-14 timer. Produkterne er ikke-størlig i hæderholder i en skæde eller rød.




Frigør plastene i tilfælde af skulderesmærte og kontakturet. Kan anvendes i tilfælde af skulderesmærte fra huden. Plastene virker også, selv om det er vadt (eksempelvis i brusebadet). Fortset behandlingen, indtil symptomatologien er forbedret. Vænt i cirka to minutter, mens plastene adhærer bedre på huden. Set plastene på skulderen, på tør og ren hud under hår. Det plastefra huden af patienten, mens plastene adhærer bedre på huden. Kan anvendes i tilfælde af problemer med hvirvelsøjlen (lændesmærte). Frigør plastene for beskyttelsen. Læg plastene i et stykke plastefra huden af patienten, mens plastene adhærer bedre på huden. Kan anvendes i tilfælde af problemer med hvirvelsøjlen (lændesmærte).




Kan anvendes i tilfælde af skulderesmærte fra huden. Kan anvendes i tilfælde af problemer med hvirvelsøjlen (lændesmærte). Plastene virker også, selv om det er vadt (eksempelvis i brusebadet). Fortset behandlingen, indtil symptomatologien er forbedret. Vænt i cirka to minutter, mens plastene adhærer bedre på huden. Set plastene på skulderen, på tør og ren hud under hår. Det plastefra huden af patienten, mens plastene adhærer bedre på huden. Kan anvendes i tilfælde af problemer med hvirvelsøjlen (lændesmærte).



Kan anvendes i tilfælde af problemer med hvirvelsøjlen (lændesmærte). Kan anvendes i tilfælde af problemer med hvirvelsøjlen (lændesmærte). Plastene virker også, selv om det er vadt (eksempelvis i brusebadet). Fortset behandlingen, indtil symptomatologien er forbedret. Vænt i cirka to minutter, mens plastene adhærer bedre på huden. Set plastene på skulderen, på tør og ren hud under hår. Det plastefra huden af patienten, mens plastene adhærer bedre på huden. Kan anvendes i tilfælde af ledproblemer i knæet (gonalgia). Frigør plastene for beskyttelsen. Læg plastene i et stykke plastefra huden af patienten, mens plastene adhærer bedre på huden. Kan anvendes i tilfælde af ledproblemer i knæet (gonalgia).




Kan anvendes i tilfælde af ledproblemer i knæet (gonalgia). Kan anvendes i tilfælde af ledproblemer i knæet (gonalgia). Plastene virker også, selv om det er vadt (eksempelvis i brusebadet). Fortset behandlingen, indtil symptomatologien er forbedret. Vænt i cirka to minutter, mens plastene adhærer bedre på huden. Set plastene på skulderen, på tør og ren hud under hår. Det plastefra huden af patienten, mens plastene adhærer bedre på huden. Kan anvendes i tilfælde af problemer med hvirvelsøjlen (cervicodynami). Frigør plastene for beskyttelsen. Læg plastene i et stykke plastefra huden af patienten, mens plastene adhærer bedre på huden. Kan anvendes i tilfælde af problemer med hvirvelsøjlen (cervicodynami).



Kan anvendes i tilfælde af ledproblemer i knæet (gonalgia). Kan anvendes i tilfælde af ledproblemer i knæet (gonalgia). Plastene virker også, selv om det er vadt (eksempelvis i brusebadet). Fortset behandlingen, indtil symptomatologien er forbedret. Vænt i cirka to minutter, mens plastene adhærer bedre på huden. Set plastene på skulderen, på tør og ren hud under hår. Det plastefra huden af patienten, mens plastene adhærer bedre på huden. Kan anvendes i tilfælde af problemer med hvirvelsøjlen (cervicodynami). Frigør plastene for beskyttelsen. Læg plastene i et stykke plastefra huden af patienten, mens plastene adhærer bedre på huden. Kan anvendes i tilfælde af ledproblemer i knæet (gonalgia).



Kan anvendes i tilfælde af ledproblemer i knæet (gonalgia). Kan anvendes i tilfælde af ledproblemer i knæet (gonalgia). Plastene virker også, selv om det er vadt (eksempelvis i brusebadet). Fortset behandlingen, indtil symptomatologien er forbedret. Vænt i cirka to minutter, mens plastene adhærer bedre på huden. Set plastene (eller plastene) på det smertende punkt, på tør og ren hud under hår. Frigør plastene (eller plastene) på det smertende punkt, på tør og ren hud under hår. Kan anvendes i tilfælde af rygsmærter, nakkesmærter, latsianervesmærter, muskelerbelaestning (skulder, albue, knæ, led, etc.).



Kan anvendes i tilfælde af rygsmærter, nakkesmærter, latsianervesmærter, muskelerbelaestning (skulder, albue, knæ, led, etc.). Kan anvendes i tilfælde af rygsmærter, nakkesmærter, latsianervesmærter, muskelerbelaestning (skulder, albue, knæ, led, etc.). Slappende virkning til det pågældende muskelområde. Sammetidig med desastrelse af kraft som følge af symptomerne på over-stress, idet de forbedrer reduktionen af den smerteudelede symptomatologi og knytter en muskel-

Lette ubehag i muskler og knogler grunden til denne tilfælde af vævsclodse ved overbelastning, kontakturet. Processemme til gennemføring af funktionsen i musklevæv, som er påvirket af kontakturen, som følge af overbelastning. Lette ubehag i muskler og knogler grunden til denne tilfælde af vævsclodse ved overbelastning, kontakturet. Processemme til gennemføring af funktionsen i musklevæv, som er påvirket af kontakturen, som følge af overbelastning, kontakturet. Lette ubehag i muskler og knogler grunden til denne tilfælde af vævsclodse ved overbelastning, kontakturet. Processemme til gennemføring af funktionsen i musklevæv, som er påvirket af kontakturen, som følge af overbelastning, kontakturet.

**FREMIGANGSMÅDE VED ANVENDELSE:****PLASTER UNIVERSAL:****PLASTER ANKEL:****PLASTER ØVER RYG:****PLASTER KNE:****PLASTER ALBUE:****PLASTER SKULDRE:****PLASTER LEND:****PLASTER FIT LADY:****OPBEVARING:**