

paperipyyhkeellä, ja vie tikku pulloon niin, että siihen kiinnittyy hieman nestettä. Tällä tavalla et laita liikaa liuosta syyliään.

Levitä tämän jälkeen pieni määrä Kidsner-syylänpaistoaainetta annostelutikulla syyliän päälle (älä tiputa nestettä). Huolehdi siitä, että levität nestettä vain syyliään. Anna nesteen kuivua hetki. Peitä syyliä laastarilla. Viikossa syyliä häviää kerros kerrokselta. Kestää viikon, että neste

kulkeutuu päällimmäisestä iheroksesta syvemmälle, joten et näe tulosta heti levitettyäsi liuosta iholle.

Jonkin ajan kuluttua syylläsolut tuhoutuvat, syyliä muuttuu valkoiseksi ja irtoaa. Älä levitä liuosta useammin kuin kerran viikossa. Syyliän koon ja paksuuden mukaan hoidon toistaminen viikon kuluttua voi olla tarpeen. Syyliät tarttuvat. Siksi emme suosittele, että samaa tuotepakkausta käytettäisiin useamman kuin yhden ihmisen hoitoon.

Levitä minua erittäin varovasti. Liuos on syövyttävää. Ole erityisen varovainen, kun levität liuosta niihin kehon osiin, joihin on vaikea ulottua. Tämä koskee erityisesti liikuntarajoitteisia tai henkilöitä, joiden hienomotoriikka on vaikeutunut (käsienvapina, jäykät sormet). Kierrä korkki huolellisesti kiinni käytön jälkeen.

### 3. KÄYTÄ MINUA VAROVASTI

- Älä käytä minua:
- alle 4-vuotiaille
  - yhtäjaksoisesti pidempään kuin 30 päivää
  - jos olet yliherkkä jollekin ainesosalle
  - kasvoihin (liuos ei koskaan saa osua silmiin tai nenään tai suun limakalvoille)
  - visvasyyliin tai sukuelinten alueelle
  - syntymämerkkeihin, ontelosyyliin, avohaavoihin, luomiin, (ruskeisiin) rasvasyyliin, tummiin, karvaisiin tai erikoisen näköisiin syyliin
  - punoittaviin, ärtynesiin tai

tulehtuneisiin syyliin;

- heti syylien kirurgisen poiston, jäädyttämisen (kryoterapia) tai laserhoidon jälkeen. Tämä on erityisen tärkeää, jos iho on punoittava tai kipeä hoidon jälkeen. Tässä tapauksessa odota ainakin neljä viikkoa, kunnes ihon punoitus tai tulehdus on kokonaan hävinnyt. Voit käyttää minua vasta sen jälkeen
- jos olet raskaana tai imetät
- syyliin, jotka ovat kokonaan tai osittain kynnen alla.

Käytä minua erityisen varovasti:

- jos et ole varma diagnoosista (jos ihomuutos ei selvästi näytä syyliältä)
- immuunipuutoksen yhteydessä (esim. jos käytät solunsalpaajia)
- jos sinulla on diabetes tai muu haavojen paranemista hidastava vaiva, esimerkiksi jokin verisuonisairaus.

Näissä tapauksissa et saa käyttää minua, ennen kuin olet kysynyt lääkäriltä neuvoo.

### VAROITUKSET:

- Vain ulkoiseen käyttöön.
- Levitä minua vain käsissä ja jalkaterissä oleviin syyliin
- Käytä minua erittäin varovasti. Liuos on syövyttävää.
- Jos terve iho joutuu kosketuksiin liuoksen kanssa, huuhto se vedellä. Jos näistä varoitoimista huolimatta iho artyy, sitä täytyy hoitaa kuin palovammaa.
- Kysy neuvoo lääkäriltä, jos vaivas jatkuu.
- Sulje pullo huolellisesti käytön jälkeen ja säilytä sitä pystyasennossa.
- Säilytä pienten lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä minua ilman aikuisen apua.
- Vältä kosketusta vaatteisiin, tekstiileihin, pöytäliinaan tai ihoon.
- Kynsien lähellä olevien syylien hoitaminen saattaa olla kivuliasta, koska liuosta voi mennä kynnen alle ja aiheuttaa herkän ihon ärtymistä.
- Älä käytä, jos sinulle ilmaantuu rakkuloita.

### Haittavaikutukset

Saatan aiheuttaa joitakin haittavaikutuksia, vaikka kaikki eivät näitä haittavaikutuksia saa.

Seuraavia haittavaikutuksia voi ilmetä minua käytettäessä: ihon ärtyminen, polttelu, ihon punoitus tai yliherkkyysoireet. Jos jokin näistä haittavaikutuksista muuttuu vakavaksi tai jos havaitset haittavaikutuksia, joita ei ole lueteltu käyttöohjeessa, kysy neuvoo lääkäriltä tai apteekista.

### Yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa

Minun ja lääkkeiden välillä ei ole tunnettuja haitallisia vaikutuksia.

### 4. AINESOSAT

Monokloorietikkahappo, puhdistettu vesi

### 5. SÄILYTYS

Säilytä minut 15–25 °C:n lämpötilassa, kuivassa ja pimeässä. Säilytä minut alkuperäispakkauksessa. Viimeinen käyttöpäivämäärä on painettu pakkauksen pohjaan. Avaamisen jälkeen minua voi käyttää 1 kuukauden ajan.

### 6. YHTEYSTIEDOT

Lähetä kaikki minua koskevat kysymykset jokelijalle. Katso lisätietoja verkkosivulta [www.kidsner.fi](http://www.kidsner.fi).

Olen lääkinällinen laite. Lue käyttöohjeeni ennen käyttöä.

### Jakelija

TMOS Pharma AS  
Camilla Colletts veg 31  
2407 Elverum  
Norja  
[www.kidsner.fi](http://www.kidsner.fi)

### Valmistaja

P.K. Benelux B.V.  
Vluchtoord 17  
5406 XP Uden  
Alankomaat

Tarkistettu viimeksi heinäkuussa 2018

CE 0481 15°C 4ml



Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder mig. Kasta inte bilagan eftersom den innehåller viktig information.

### INNEHÅLL INSTRUKTIONER

#### 1. ANVÄND MIG TILL

#### 2. HUR DU ANVÄNDER MIG

#### 3. VAR FÖRSIKTIG MED MIG

#### 4. MIN INNEHÅLLS-FÖRTECKNING

#### 5. HUR SKA DU LAGRA MIG?

#### 6. MIN KONTAKT-INFORMATION

#### 1. ANVÄND MIG TILL

Hej på dig! Jag är Willy vårtborttagaren, och tillsammans skall vi göra det här! Denna flaska innehåller en osynlig, icke-glänsande, lokal gel som effektivt tar bort vårtor och fotvårtor. Jag innehåller monoklorättiksyra, ett ämne som har en nedbrytande effekt på huden. Vårtan kommer att lösas upp lager för lager. Monoklorättiksyra kommer att säkerställa att celler som innehåller vårtvirus försvinner.

#### 2. HUR DU ANVÄNDER MIG

Den barnsäkra korken öppnar du så här: Placera mig på en stabil yta som tål frätande vätska. Undvik kontakt med kläder, textilier eller dukar. Du öppnar korken genom att trycka ner den samtidigt som du vrider på den. Ta bort korken från flaskan.

Använd mig endast en gång i veckan. För att huden runt vårtan inte ska påverkas, rekommenderar vi att smörja med vaselin eller zinkpasta på huden runt vårtan.

Torka först applikatorn med papper. Sänk sedan applikatorn igen i flaskan så att endast lite vätska sätter sig fast. På så sätt applicerar du inte för mycket vätska mot vårtan.

Tillsätt sedan en liten mängd Kidsner på vårtan med applikatorn (låt inte vätskan tippa). Se till att jag bara hamnar på dina vårtor. Låt mig torka en stund, så kan du sätta på ett plåster. Efter en vecka löser vårtan upp sig, lager för lager. Min vätska behöver en vecka för att lösa upp det övre lagret av huden, så du kan inte se några resultat omedelbart efter appliceringen.

Efter ett tag förstörs cellerna i vårtan och vårtan får en vit färg och kommer att stöts bort. Använd inte mer än en gång i veckan. Beroende på vikten och tjockleken kan det vara nödvändigt att upprepa behandlingen efter en vecka. Vårtor är smittsamma. Därför rekommenderar vi inte att fler personer använder produkten.

Var försiktig när du använder mig då innehållet i flaskan är frätande. Var extra försiktig när du använder mig på kroppsdelar som är svåra att nå. Detta gäller särskilt för personer med nedsatt rörlighet eller i fall av störd finmotorik (skakande händer, styva fingrar). Stäng försiktigt min flaska efter användning.

### 3. VAR FÖRSIKTIG MED MIG

- Använd mig inte:
- För barn under 4 år.
  - I mer än 30 dagar.
  - Om du är överkänslig för en eller flera av ingredienserna.
  - I ansiktet /vätskan får aldrig komma i kontakt med ögon eller slemhinnor i näsan och munnen.
  - För genitala vårtor eller på genitalierna.
  - På födelsemärken är vattenfyllda vårtor, öppna sår, leverfläckar, Naevius, senila (bruna) vårtor, mörka /håriga vårtor eller vårtor som ser onormala ut.
  - På röda, irriterade eller

infekterade vårtor.

- Omedelbart efter kirurgisk borttagning av vårtor, frysning av vårtor (kryoterapi) eller laserbehandling. Detta gäller speciellt om huden är röd eller smärtsam efter behandling. Vänta i minst fyra veckor tills rodnad eller inflammation är helt borta. Först då kan du börja använda mig.
- Om du är gravid eller ammar.
- På vårtor som visas delvis eller helt under nageln.

Var extra försiktig när du använder mig:

- Vid icke tydlig diagnos (förändringar i huden som inte kan förklaras fullständigt som vårta).
- Vid försvagat immunförsvaret (till exempel vid användning av cytostatisk medicinering).
- Vid diabetes eller andra sjukdomar som kärlsjukdomar, vilket gör att sår inte läker så lätt. I dessa fall kan du inte använda mig innan du rådgjort med en läkare.

### Varningar

- Endast för extern användning
- Använd mig bara mot vårtor på händer och fötter.
- Använd mig med stor försiktighet. Min vätska är frätande.
- Skölj av med vatten om jag kommer i kontakt med frisk hud. Om huden blir irriterad, använd samma behandling som du gör vid brännskador, även om du har tagit dessa försiktighetsåtgärder.
- Kontakta en läkare om symptomen kvarstår.
- Skruva fast korken efter användning och förvara den i upprätt läge.
- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Använd inte mig utan någon av dina föräldrars närvaro.
- Undvik kontakt med kläder, textilier eller hud.
- Behandling av vårtor intill nageln kan vara smärtsamt eftersom vätskan kan absorberas under nageln och ge irritation på den känsliga huden.
- Avbryt användningen om blåsor uppstår.

### Biverkningar

Jag kan orsaka en del biverkningar, men inte alla kommer att uppleva dessa. De biverkningar som kan uppstå är: irriterad hud, brännande känsla,

hudrödhet eller överkänsliga reaktioner. Om några av dessa biverkningar blir allvarliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i bipacksedeln, kontakta din läkare.

Interaktion med andra läkemedel: Det finns ingen känd negativ effekt mellan mig och andra läkemedel.

### 4. MIN INNEHÅLLS-FÖRTECKNING

Monoklorättiksyra, sterilt vatten.

### 5. HUR SKA DU LAGRA MIG?

Förvara mig på en torr mörk plats vid 15–25 °C i originalförpackningen. Mitt utgångsdatum är tryckt på botten av asken. Jag kan användas i 1 månad efter öppnandet.

### 6. MIN KONTAKTINFORMATION

Alla frågor om mig kan skickas till distributören. För mer information om mig, besök [www.kidsner.se](http://www.kidsner.se)

Jag är en medicinsk anordning, läs min bipacksedel före användning.

### Distributör

TMOS Pharma AS  
Camilla Colletts veg 31  
2407 Elverum Norge  
[www.kidsner.se](http://www.kidsner.se)

### Tillverkare

P.K. Benelux B.V.  
Vluchtoord 17  
5406 XP Uden  
Nederländerna

Revisionsdatum: Oktober 2018



Først, tørk av applikatoren med papir. Deretter senker du applikatoren ned i flasken slik at litt væske fester seg på den. På denne måten vil du ikke påføre for mye væske på vorten.

Så, legg en liten mengde Kidsner vortebehandling på vorten med applikatoren (ikke la væsken dryppe). Forsikre deg om at jeg kun ligger igjen på vorten. La meg tørke et øyeblikk, så kan du legge på et plaster. Etter en uke

vil vorten løse seg opp, lag etter lag. Væsken min trenger en uke for å løse opp det øverste laget av huden, så du kan ikke se noe resultat umiddelbart etter påføring.



Etter en stund ødelegges cellene i vorten, og vorten får en hvit farge og vil støtes bort. Du må ikke bruke meg mer enn 1 gang i uken. Avhengig av størrelsen og

tykkelsen på vorten, kan det være nødvendig å repetere behandlingen med meg etter en uke. Vorter er smittsomme. Derfor anbefaler vi ikke at mere en person bruker produktet.

Vær veldig forsiktig når du bruker meg da innholdet i flasken er kaustisk. Vær ekstra forsiktig når du skal bruke meg på kroppsdeler som er vanskelige å nå. Dette gjelder spesielt personer med nedsatt mobilitet eller i tilfeller med forstyrret finmotorikk (skjelvende hender, stive fingre). Lukk flasken min forsiktig etter bruk.



### 3. VÆR FORSIKTIG MED MEG

Ikke bruk meg:

- Til barn under 4 år
- I mer en 30 dager
- Hvis du er over sensitive mot en eller flere av ingrediensene
- I ansiktet /væsken skal aldri være i kontakt med øyne eller slimhinner i nese og munn
- Kjønnsvorter eller i underlivet.
- På fødselsmerker, vannvorter, åpne sår, føflekker, Naevius, senile (brune) vorter, mørke/hårete vorter eller vorter som ser unormale ut.
- På røde, irriterte eller infiserte vorter.

- Rett etter kirurgisk fjerning av vorter, frysing av vorter (kryoterapi) eller laserbehandling. Dette gjelder spesielt om huden er rød eller smertefull etter behandlingen. I dette tilfellet skal du vente i minst fire uker, til rødheten eller inflammasjonen er fullstendig borte. Først da kan du starte å bruke meg.
- Hvis du er gravid eller ammer.
- På vorter som oppstår delvis eller fullstendig under neglen.

Vær ekstra forsiktig når du bruker meg:

- I tilfeller som gjelder diagnose (endringer i huden som ikke fullstendig kan forklares som vorte)
- Ved immundefekt (for eksempel når du bruker cytostatisk medisinering)
- Ved diabetes eller andre plager som vaskulære sykdommer, som gjør at sår ikke leges så lett. I disse tilfellene kan du ikke bruke meg før du har konsultert med lege.



### Advarsler:

- Advarsler:
- Kun for utvortes bruk
- Bruk meg bare på vorter på hendene og føttene.
- Bruk meg med ytterst forsiktighet. Væsken min er etsende.
- Hvis jeg kommer i kontakt med sunn hud, vennligst skyl meg av med vann. Hvis huden blir irritert, selv om du har tatt disse forhåndsreglene, må du bruke samme behandling som du gjør ved brannskår.
- Kontakt lege, hvis plagene dine forsetter.
- Skru korken godt igjen etter bruk og oppbevar den i stående posisjon.
- Oppbevares utilgjengelig for barn
- Ikke bruk meg uten at en av dine foreldre er til stede.
- Unngå kontakt med klær, tekstiler eller hud.
- Behandling av vorter rett ved siden av neglen kan være vondt, da væsken kan absorberes under neglen å skape irritasjon på den sarte huden.
- Avslutt bruken om det oppstår bløttinger.



### Bivirkninger

Jeg kan forårsake noen bivirkninger, men ikke alle vil oppleve disse. Bivirkningene som kan oppstå er: irritert hud, brennende følelse, rødhet i huden eller oversensitive reaksjoner. Hvis noen av disse bivirkningene blir alvorlige, eller om du opplever andre bivirkninger som ikke står i pakningsvedlegget, vennligst kontakt medisinsk hjelp.

### Interaksjon med andre medisiner

Det finnes ingen kjent negative effekt mellom meg og andre medisiner.

### 4. MINE INGREDIENSER

Monokloreddiksyre, sterilt vann.

### 5. HVORDAN OPPBEVARE MEG

Oppbevar meg på et tørt mørkt sted med 15-25°C i originalesken. Utløpsdatoen min står printet på bunnen av esken. Jeg kan brukes i 1 måned etter åpning.

### 6. MINE KONTAKTOPPLYSNINGER

Alle spørsmål om meg kan sendes til distributøren. For mer informasjon om meg vennligst besøk [www.kidsner.no](http://www.kidsner.no)

Jeg er et medisinsk utstyr, les pakningsvedlegget mitt før bruk.

### Distributør

TMOS Pharma AS  
Camilla Colletts veg 31  
2407 Elverum Norge  
[www.kidsner.no](http://www.kidsner.no)

### Produsent

P.K. Benelux B.V.  
Vluchtoord 17  
5406 XP Uden  
Nederland

Revision date: Oktober 2018



Tør først applikatoren af med papir. Derefter sænkes applikatoren ned i flasken, så noget gel klæber til den. På denne måde vil du ikke anvende for meget gel til vorten.

Så påfør en lille smule Kidsner vorte behandling på vorten med applikatoren (lad ikke væsken dryppe). Sørg for, at jeg kun påføres på vorterne. Lad mig tørre et øyeblikk, så du kan lægge et plaster på. Efter en uge opløses vorten, lag for lag. Min væske har brug for en uge til at opløse det øverste lag af huden, så du kan ikke se resultatet umiddelbart efter påføring.



Efter et stykke tid bliver cellerne ødelagt i vorten, og vorten får en hvid farve og bliver afstødt. Brug mig ikke mere end en gang om ugen. Afhængig

af vortens størrelse og tykkelse kan det være nødvendigt at gentage min behandling efter en uge. Vorter er smitsom. Derfor anbefaler vi ikke, at flere mennesker bruger produktet.

Vær meget forsigtig, når du bruger mig. Indholdet af flasken er ætsende. Vær ekstra forsigtig, når du bruger mig på kropsdeler, der er vanskelige at nå. Dette gælder især for personer med nedsat mobilitet eller i tilfælde af forstyrret finmotorik (skælvende hænder, stive fingre). Luk forsigtigt min flaske efter brug.



### 3. VÆR FORSIKTIG MED MIG

Brug mig ikke:

- For børn under 4 år
- I mere end 30 sammenhængende dage
- Hvis du er overfølsom over for en eller flere af ingredienserne
- I ansigtet / væsken må aldrig komme i kontakt med øjne eller slimhinder i næse og mund
- Kønsvorter eller vorter på kønsdelene.
- I modernærker, vandvorter, åbne sår, skønhedspletter, Naevius, senile (brune) vorter, mørke / behårede vorter eller vorter, der ser

unormale ud.

- På røde, irriterede eller inficerede vorter.
- Umiddelbart efter kirurgisk fjernelse af vorter, frysning af vorter (kryoterapi) eller laserbehandling. Dette gælder især hvis huden er rød eller smertefuld efter behandling. Vent mindst fire uger til rødmen eller betændelsen er helt væk. Først da kan du begynde at bruge mig.
- Hvis du er gravid eller ammer.
- På vorter, der ses helt eller delvis under neglen.

Vær ekstra forsigtig, når du bruger mig:

- I tilfælde af tvivl ved diagnosen (ændringer i huden, der ikke kan forklares fuldstændigt som vorte)
- I tilfælde af immundefekt (for eksempel ved anvendelse af cytostatisk medicin)
- I tilfælde af diabetes eller andre lidelser som vaskulære sygdomme, hvilket gør, at sår ikke heler så let. I disse tilfælde kan du ikke bruge mig før du har konsulteret en læge.



### Advarsler:

- Kun til utvendig bruk
- Bruges kun til vorter på hænder og fødder.
- Brug mig med stor forsigtighed. Min væske er ætsende.
- Skyl af med vand, hvis jeg kommer i kontakt med sund hud. Hvis huden bliver irriteret, selvom du har taget disse forholdsregler, skal du bruge samme behandling som ved forbrændinger
- Kontakt en læge, hvis dine symptomer vedvarer.
- Skru proppen på igen efter brug og oppbevar den i opretstående stilling.
- Oppbevares utilgjengelig for børn
- Brug ikke mig uden en af dine forældres tilstedeværelse.
- Undgå kontakt med tøj, tekstiler eller hud.
- Behandling af vorter lige ved siden af neglen kan være smertefuld, da gelen kan absorberes under neglen og forårsage irritation af den sarte hud.
- Afbryd bruken, hvis der opstår vabler.



### Bivirkninger

Jeg kan forårsage nogle bivirkninger, men ikke alle vil opleve disse. De bivirkninger, der kan opstå, er: irriteret hud, brændende fornemmelse, rødme i huden eller overfølsomhedsreaktioner. Hvis nogen af disse bivirkninger bliver alvorlige, eller hvis du bemærker nogen bivirkninger, som ikke er nævnt i indlægssedlen, bedes du kontakte din læge.

Interaktion med andre lægemidler Der er ingen kendt negativ effekt mellem mig og andre lægemidler.

### 4. MINE INDHOLDSTOFFER

Monokloreddiksyre, sterilt vand.

### 5. HVORDAN OPPBEVARES JEG

Oppbevares på et tørt mørkt sted ved 15-25 °C i den originale æske. Min udløpsdato er trykt i bunden af æsken. Jeg kan bruges i 1 måned efter åbningen.

### 6. MINE KONTAKTOPPLYSNINGER

Alle spørgsmål om mig kan sendes til distributøren. For mere information om mig besøg vennligst [www.kidsner.dk](http://www.kidsner.dk)

Jeg er et medicinteknisk produkt, læs min brugsanvisning inden brug.

### Distributør

TMOS Pharma AS  
Camilla Colletts veg 31  
2407 Elverum Norge  
[www.kidsner.dk](http://www.kidsner.dk)

### Produsent

P.K. Benelux B.V.  
Vluchtoord 17  
5406 XP Uden  
Holland

Revideret: Oktober 2018

