3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive (GB)

High Performance Foam Adhesive Dressing

Description:
3M™ Tegaderm™ High Performance Foam Adhesive Dressing is a highly absorbent, breathable wound dressing. It is constructed from a comfortable polyurethane foam pad, additional absorbent nonwoven layers, and a top layer of transparent adhesive film. This film is moisture vapor permeable which prevents wound exudate strike-through and acts as a barrier to outside contamination, including bacteria and viruses.* The dressing maintains a moist wound environment, which has been proven to enhance wound healing. The dressing is supplied sterile.

Indications for Use:
Tegaderm™ Foam Adhesive dressing is designed to allow easy, one-handed application to difficult body contours, including heels and elbows, without the need for cutting. The dressing is indicated for use as a primary dressing for low to highly exuding, partial and full thickness dermal wounds, including:
• pressure ulcers • venous leg ulcers • abrasions • arterial ulcers • skin tears • neuropathic ulcers

Additional applications of Tegaderm™ Foam Adhesive dressing include:
• use as a secondary (cover) dressing in conjunction with wound fillers (such as gauze or alginate dressings).
• use under compression wrap systems for venous leg ulcer treatment.

This product is not designed, sold or intended for use except as indicated. Tegaderm™ Foam Adhesive dressing is not intended for use in pressure reduction or as a surgical sponge.

Contraindications: None known

Warnings: None known

Precautions:
1. Do not use Tegaderm™ Foam Adhesive dressing in combination with oxidizing agents such as hydrogen peroxide or hypochlorite solution. These solutions may affect the structure and performance of the polyurethane foam.
2. At the time of dressing change, if the dressing is adhered to the wound surface, saline solution should be used to remove the dressing.
3. Observe the wound for signs of infection. If infection occurs, signs of which may be fever, increased pain, redness, swelling or an unusual odor or discharge, see a health care professional. Tegaderm™ Foam Adhesive dressing may be used on infected wounds only under the care of a health care professional.
4. If the wound does not begin to show signs of healing or if any other unexpected symptoms occur, consult a health care professional.

Directions for Use:
Note: Follow facility guidelines for infection control.

Before Using the Dressing:
1. Clip excess hair for patient comfort.
2. Cleanse wound and surrounding skin according to facility policy. Note: If periwound skin is fragile or exposure to wound exudate is likely, apply a barrier film. Allow the barrier film to dry before dressing application.
3. Assess wound. Select appropriate size dressing to ensure that the foam pad is larger than the wound area.

Applying the Dressing:
1. Remove dressing from package.
2. Hold the dressing by one of the side tabs and remove the printed liner, exposing the adhesive border (Figure 1).
3. While holding the tabs, position the dressing over the wound.
4. Gently press the adhesive film border to the skin (Figure 2). Avoid stretching the dressing or the skin.
5. Beginning at the center of the dressing, grasp one section of the paper carrier and pull toward the outer edge of the dressing. Repeat this for each of the remaining carrier strips until all paper carrier is removed (Figure 3).
6. Firmly press and conform the adhesive border to the skin (Figure 4).

Heel/Elbow Application
1. Remove dressing from package.
2. Hold the dressing by one of the side tabs and remove the printed liner, exposing the adhesive border (Figure 1).
3. While stabilizing the leg or surrounding tissue with one hand, position the dressing over the wound (Figure 2).
4. With one hand, press or "cup" the dressing into the skin. Continue to press and conform the dressing and adhesive border into the skin (Figure 3).
5. Beginning at the center of the dressing, grasp one section of the paper carrier and pull toward the outer edge of the dressing. Repeat this for each of the remaining carrier sections until all paper carrier is removed (Figure 4).
6. Firmly press and conform the adhesive border to the skin (Figure 5).

Removing the Dressing:
1. Carefully lift the dressing edges from the skin. If there is difficulty lifting the dressing, apply tape to the edge of the dressing and use the tape to lift.
2. Continue lifting the edges until all are free from the skin surface. Remove the dressing.

Dressing Change Considerations:
1. Observe the dressing frequently. As the dressing absorbs, exudate will wick to the top of the dressing, and discoloration may be noticeable. When the exudate spreads to the edges of the dressing or the dressing begins to leak, a dressing change is indicated.
2. Dressing change frequency will depend on the type of wound, volume of exudate, and clinical situation. Change at least every seven days, or as indicated per treatment protocol.

Storage and Shelf Life:
For best results, store at room temperature. Avoid excessive heat and humidity. For shelf life, refer to the expiration date printed on each box.

How Supplied:
Supplied in boxes of individually packaged dressings. Sterility of product is guaranteed unless the individual pouch is damaged or open. If you have any questions or comments, in the USA please contact the 3M Health Care Customer Helpline at 1-800-228-3957.
In Canada, contact 3M Canada Company, P.O. Box 5757, London, Ontario, N6A-4T1, 1-800-364-3577.
Outside the United States, contact your local 3M subsidiary.

* In vitro testing shows that the transparent film provides a viral barrier from viruses 27 nm in diameter or larger while the dressing remains intact without leakage.

Explination of Symbols

Do not use if package is damaged
Not Made With Natural Rubber Latex
Caution, see instructions for use
STERILE R Sterilized by irradiation
Do not re-use
Manufacturer
Use by date
LOT Batch code
Date of manufacture

Patent: 3M.com/Patents

CE 0086
Made in Germany by
3M Health Care
2510 Conway Ave
St. Paul, MN 55144, USA
www.3M.com/Tegaderm
1-800-228-3957
Date of issue: 2017-11

3M and Tegaderm are trademarks of 3M.
Used under license in Canada.
3M et Tegaderm sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
© 2018, 3M. All rights reserved/Tous droits réservés.
3M Canada Company P.O. Box 5757, London, Ontario, N6A-4T1
1-800-364-3577

EC REP
3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Germany

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive (FR)

Pansement Hydrocellulaire Adhésif Haute Performance

Description :
Le pansement hydrocellulaire adhésif Haute Performance 3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive est un pansement très absorbant et qui autorise les échanges gazeux. Il est composé d'une mousse de polyuréthane confortable, d'une couche de fibres non tissées super-absorbantes, et recouvert d'un film adhésif transparent. Ce film est imperméable aux liquides tout en restant perméable à la vapeur d'eau. Il empêche les fuites d'exsudat et agit comme une véritable barrière contre les virus et les bactéries extérieures.* Le pansement maintient la plaie dans un environnement humide, une condition favorable à la cicatrisation. Le pansement est fourni en emballage individuel stérile.

Conseils d'utilisation
Le pansement Tegaderm™ Foam Adhesive est conçu pour permettre une application aisée à une main sur des zones du corps anguleuses, comme les talons et les coudes, sans aucune découpe nécessaire. Il s'utilise comme pansement primaire pour le traitement des plaies d'épaisseur partielle à complète produisant un exsudat faible à abondant, telles que :
• escarres • ulcères veineux de jambes • dermabrasions • ulcères artériels • déchirures cutanées • ulcères neuropathiques

Le pansement hydrocellulaire adhésif Tegaderm™ Foam Adhesive peut également être utilisé :
• comme pansement secondaire sur une compresse de gaze ou un alginate par exemple.
• sous une bande de compression pour le traitement des ulcères veineux.

Ce produit doit être strictement utilisé conformément aux indications. Le pansement hydrocellulaire adhésif 3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive n'est pas conçu pour être utilisé en réduction de pression ou en tant qu'éponge chirurgicale.

Contre-indications : Aucune

Mises en garde: Aucune

Précautions d'emploi :
1. Ne pas utiliser le pansement hydrocellulaire adhésif 3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive Haute Performance avec des agents oxydants tels qu'une solution de hypochlorite ou de l'eau oxygénée. Ceci affecterait la composition et les propriétés de la mousse polyuréthane.
2. Si le pansement adhère à la surface de la plaie lors de son changement, l'imprégner largement de sérum physiologique et le décoller lentement.
3. Surveiller la plaie pour s'assurer de l'absence d'infection. En cas d'infection, pouvant se manifester par de la fièvre, une douleur accrue, une rougeur, un œdème, une odeur ou un écoulement inhabituels, demander un avis médical. Le pansement hydrocellulaire adhésif Tegaderm™ Foam Adhesive ne doit être utilisé sur des plaies infectées que sous surveillance médicale.
4. Si la plaie n'évolue pas vers la guérison ou si des symptômes inhabituels apparaissent, demander un avis médical.

Mode d'emploi :
Remarque : respecter les protocoles d'asepsie habituels.

Avant d'utiliser le pansement :
1. Tondre les poils pour améliorer le confort du patient.
2. Nettoyer la plaie et la peau peri-lésionnelle suivant le protocole de soin des plaies défini dans l'établissement. Remarque : si la peau autour de la plaie est fragile ou susceptible d'être exposée à l'exsudat, appliquer un film protecteur. Laisser bien sécher le film protecteur avant d'appliquer le pansement.
3. Examiner la plaie. Sélectionner la taille du pansement à plus adaptée en s'assurant que la mousse est plus grande que la surface de la plaie.

Application du pansement :
1. Retirer le pansement de son emballage.
2. Tenir le pansement par l'une des ailettes de pose et tirer le film protecteur pour libérer la partie adhésive (fig. 1).
3. Placer le pansement sur la plaie.
4. Appuyez légèrement sur la bordure adhésive (cf. figure 2). Éviter d'étirer l'adhésif ou la peau.
5. En commençant par le centre du pansement, saisir l'une des parties du cadre de pose et le tirer du centre vers les coins externes du pansement. Recommencer l'opération pour chacun des parties restantes, jusqu'à ce que tout le cadre de pose soit enlevé (fig.3).
6. Appuyer fermement sur le pansement pour bien coller les bords adhésifs sur la peau (fig. 4).

Application sur un talon/coude
1. Retirer le pansement de son emballage.
2. Tenir le pansement par l'une des ailettes de pose et tirer le film protecteur pour libérer la partie adhésive (fig. 1).
3. En maintenant d'une main la jambe ou le tissu environnant, placer le pansement sur la plaie (fig. 2).
4. D'une main, appliquer le pansement sur la peau en appuyant dessus ou en le fissant "en arrondi". Continuer à appuyer et à adapter le pansement et ses bords adhésifs sur la surface de la peau (fig. 3).
5. En commençant par le centre du pansement, saisir l'une des parties du cadre de pose et le tirer du centre vers les coins externes du pansement. Recommencer l'opération pour chacun des parties restantes, jusqu'à ce que tout le cadre de pose soit enlevé (fig.4).
6. Appuyer fermement sur le pansement pour bien coller les bords adhésifs sur la peau (fig. 5).

Retrait du pansement :
1. Soulever délicatement les bords du pansement. Si vous éprouvez des difficultés à soulever le pansement, appliquer un adhésif sur le bord du pansement et l'utiliser pour soulever le pansement.
2. Continuer à soulever les bords jusqu'à ce qu'ils soient tous décollés. Retirer le pansement.

Changement du pansement :
1. Surveiller l'état du pansement. Comme il est absorbant, l'exsudat remonte à la surface et peut entraîner une décoloration. Lorsque l'exsudat se diffuse vers les bords du pansement ou que ce dernier commence à suinter, il convient de le changer.
2. La fréquence de changement du pansement dépend du type de plaie, de la quantité d'exsudat et de la situation clinique. Il doit être changé au moins tous les sept jours, ou selon le protocole de traitement.

Conservation et date d'expiration :
Pour avoir les meilleurs résultats, conserver le pansement à température ambiante. Éviter chaleur et humidité excessives. Pour la durée de conservation, voir la date d'expiration figurant sur l'emballage.

Présentation :
Livré en boîtes contenant des pansements stériles emballés individuellement. La stérilité du produit est garantie sauf si la pochette individuelle est ouverte ou détériorée.
Pour toute question ou commentaire, contactez l'assistance téléphonique des Laboratoires 3M Santé au 0 810 331 300 ou adressez une télécopie au +33 1 30 31 85 51.
Laboratoires 3M Santé, Boulevard de l'Oise, 95029 Cergy Pontoise Cedex.
En dehors des États Unis, se mettre en rapport avec la filiale locale de 3M.

* Les essais in vitro montrent que le film transparent constitue une barrière virale pour des virus d'un diamètre de 27 nm ou plus, à condition qu'il n'y ait pas de fuites et que l'intégrité du pansement soit respectée.

Signification des symboles

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Ne pas réutiliser - usage unique
Attention, consulter le mode d'emploi
STERILE R Stérilisé par irradiation
Fabricant
Date de péremption
LOT Numéro de lot
Date de fabrication
Utilisation unique
LOT Numéro de lot
Date de fabrication

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive (DE)

Hochleistungsfähiger, klebender Schaumverband

Produktbeschreibung:
Bei dem hochleistungsfähigen, klebenden 3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive handelt es sich um einen stark absorbierenden, atmungsaktiven Wundverband. Der Verband besteht aus angeaugsnaftigem Polyurethanschaum, einer zusätzlichen saugfähigen, nicht-gewebenen Schicht und einer oberen Schicht aus einer transparenten Klebefolie. Diese Folie ist wasserdampfdurchlässig, was ein Durchschlagen des Wundexudats verhindert und als Barriere gegen Kontamination von außen, einschließlich Bakterien und Viren, fungiert.* Die Wundauflage erhält ein feuchtes Wundmilieu, was die Wundheilung fördert. Der Verband wird steril angeboten.

Indikationen:
Tegaderm™ hochleistungsfähiger, klebender und ermüdet eine einfache einhändige Applikation an schwierigen Körperstellen, wie z. B. an Fersen und Ellbogen. Er muss dafür nicht zugeschnitten werden. Der Verband ist als Primärverband für schwach bis stark nässende, oberflächliche und tiefe dermale Wunden vorgesehen, einschließlich:
• Druckgeschwüre • venöse Beingeschwüre • Schürfwunden • arterielles Ulkus • Hautrisse • neuropathisches Ulkus

Weitere Indikationen für den Tegaderm™ Foam Adhesive umfassen die Anwendung:
• Als Sekundärverband (Deckverband) für den Einsatz mit Wundfüllmaterial (wie Gaze oder Alginatverbänden).
• Unter Druckverbänden für die Behandlung venöser Beinulcera.

Dieses Produkt ist nur für die genannten Indikationen bestimmt. Der Tegaderm™ Foam Adhesive ist nicht für die Druckreduzierung oder als chirurgischer Tupfer vorgesehen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt

Warnhinweise: Keine bekannt

Vorsichtsmaßnahmen
1. Den Tegaderm™ Foam Adhesive nicht zusammen mit Oxidationsmitteln wie Wasserstoffperoxid oder Hypochloritlösung verwenden. Diese Lösungen können die Struktur und Leistung des Polyurethanschaumes beeinträchtigen.
2. Falls der Verband beim Verbandwechsel an der Wundoberfläche anhaftet, kann er mit gewöhnlicher Kochsalzlösung getränkt und sanft von der Wunde abgelöst werden.
3. Die Wunde auf Anzeichen einer Infektion beobachten. Bei Auftreten einer Wundinfektion (Symptome: Fieber, stärkere Schmerzen, Rötung, Schwellung oder ungewöhnlicher Geruch oder zunehmende Exsudation), sofort an medizinisches Fachpersonal wenden. Der Tegaderm™ Foam Adhesive darf bei infizierten Wunden nur unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal angewendet werden.
4. Wenn die Wunde keine Anzeichen einer Heilung aufweist oder andere unerwartete Symptome auftreten, sollte hinzugezogen werden.

Gebrauchsanweisung:
Hinweis: Folgen Sie allen gültigen Richtlinien zur Infektionskontrolle.

Vor der Verwendung des Verbandes:
1. Entfernen Sie vorhandenen Haarwuchs, um später ein schmerzhaftes Abnehmen des Verbandes zu vermeiden.
2. Reinigen Sie die Wunde und die umgebende Haut gemäß den gültigen Pflegestandards. Hinweis: Tragen Sie einen Hautschutzfilm auf den Wundrand auf, wenn die wundumgebende Haut empfindlich oder ein Kontakt mit Wundexsudat wahrscheinlich ist. Lassen Sie den Hautschutzfilm trocknen, bevor der Verband angelegt wird.
3. Wunde beurteilen. Wählen Sie einen Verband so aus, dass die Wundauflage die intakte Haut überlappt.

Anlegen des Verbandes:
1. Verband aus der Verpackung nehmen.
2. Den Verband an einer der Seitenlaschen halten und das bedruckte Schutzpapier abziehen, um die Kleberänder freizulegen (Abbildung 1).
3. Den Verband an beiden Laschen festhalten und über der Wunde zentrieren.
4. Den Kleberand vorsichtig auf die Haut drücken (Abb. 2). Vermeiden Sie ein, Verband oder Haut dabei zu dehnen.
5. Zuerst Sie nur hugeschnitten der Mitte des Verbandes die erste Speiche des Trägerpapiers fach nach außen hin ab. Vorgang für sämtliche Trägerpapierabschnitte wiederholen, bis das gesamte Trägerpapier entfernt ist (Abbildung 3).
6. Die Klebränder fest auf der Haut andrücken und anpassen (Abbildung 4).

Anpilation an Ferse und Ellenbogen
1. Verband aus der Verpackung nehmen.
2. Den Verband an einer der Seitenlaschen halten und das bedruckte Schutzpapier abziehen, um die Klebränder freizulegen (Abbildung 1).
3. Das Bein bzw. das umgebende Gewebe mit einer Hand stabilisieren und den Verband über der Wunde platzieren (Abbildung 2).
4. Mit einer Hand den Verband auf der Haut andrücken. Den Verband und die Klebränder weiter auf der Haut andrücken und anpassen (Abbildung 3).
5. Zuerst Sie nur hugeschnitten der Mitte des Verbandes die erste Speiche des Trägerpapiers fach nach außen hin ab. Vorgang für sämtliche Trägerpapierabschnitte wiederholen, bis das gesamte Trägerpapier entfernt ist (Abbildung 4).
6. Die Klebränder fest auf der Haut andrücken und anpassen (Abbildung 5).

Abnehmen des Verbandes:
1. Vorsichtig die Verbandränder von der Haut flach abziehen. Sollten sich die Verbandränder nicht gut ablösen lassen, kann ein Stück Rollenpflaster auf dem Rand angeklebt und mit dem Pflaster angehoben werden.
2. Die Ränder weiterhin flach abziehen, bis sie von der Hautoberfläche entfernt sind. Den Verband entfernen.

Empfehlungen zum Verbandwechsel:
1. Den Verband häufig überprüfen. Wenn der Verband Exsudat absorbiert, dringt dieses zur Verbandoberseite durch. Wenn das Exsudat die Verbandränder erreicht bzw. aus dem Verband auszutreten beginnt, muss der Verband gewechselt werden.
2. Die Häufigkeit des Verbandwechsels hängt vom Wundtyp, der Exsudatmenge und der klinischen Situation ab. Verband mindestens alle sieben Tage oder wie im Behandlungsprotokoll angezeigt wechseln.

Lagerung und Haltbarkeit:
Für beste Ergebnisse bei Zimmertemperatur lagern. Übermäßige Wärme und Feuchtigkeit vermeiden. Das Verfallsdatum ist auf der Packung aufgedruckt.

Darreichungsform
Tegaderm Foam Adhesive wird in Packungen mit einzeln verpackten, sterilen Verbänden geliefert. Die Sterilität des Produkts ist sichergestellt, solange die Einzelverpackung unbeschädigt und ungeöffnet ist.
Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen Aussendienstmitarbeiter oder den regionalen 3M-Kundenservice (in Deutschland unter der Rufnummer 0800-1002830) oder unter der Adresse 3M Medica, Abt. Medical, Hammfeldstamm 11, 41453 Neuss). In der Schweiz oder Österreich kontaktieren Sie bitte die nächste 3M-Geschäftsstelle.

* In-vitro Tests belegen, dass der transparente Film, solange er intakt ist, für Viren mit einem Durchmesser von 27 nm oder größer eine Barriere bildet.

Erklärung der Symbole

Bei beschädigter Packung nicht verwenden
Nicht mit Naturkautschuklatex gefertigt
Nicht zur Wiederverwendung
Gebrauchsanweisung beachten
STERILE R Sterilisation durch Bestrahlung
Hersteller
Verwendbar bis
LOT Chargenbezeichnung
Herstellungsdatum

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive (IT)

Medicazione adesiva in schiuma ad alte prestazioni

Descrizione:
3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive Medicazione adesiva in schiuma ad alte prestazioni è una medicazione altamente assorbente e altamente permeabile al vapore. È costituita da un tampone in schiuma di poliuretano confortevole, uno strato aggiuntivo assorbente in tessuto non tessuto e uno strato superficiale di pellicola adesiva trasparente. Questa pellicola è permeabile al vapore acqueo, ed evita pertanto la fuoriuscita dell essudato della ferita e funge da barriera per la contaminazione esterna, compresi batteri e virus.* La medicazione, inoltre, consente di mantenere umido l'ambiente della ferita, ottimizzando il processo di cicatrizzazione. La medicazione è fornita sterile.

Indicazioni per l'uso:
La medicazione Tegaderm™ Foam Adhesive è stata ideata per consentire la semplice applicazione su contorni difficili del corpo, come talloni e gomiti, utilizzando una sola mano e senza la necessità di tagliare. La medicazione è indicata per l'uso come medicazione primaria per ferite cutanee a spessore parziale e totale, con essudato da basso a elevato, quali:
• ulcere da decubito • ulcere venose degli arti inferiori • abrasioni • ulcere arteriose • lacerazioni cutanee • ulcere neuropatiche

La medicazione Tegaderm™ Foam Adhesive è inoltre indicata nei seguenti casi:
• utilizzare come medicazione secondaria (di copertura) insieme ad altri riempitivi per ferite (ad esempio garze o alginati).
• utilizzare sotto sistemi di bendaggio compressivo per il trattamento delle ulcere venose.

Questo prodotto non è progettato, né venduto o inteso per usi diversi da quelli espressamente indicati. La medicazione Tegaderm™ Foam Adhesive non è indicata per la riduzione della pressione né come spugna chirurgica.

Controindicazioni: Nessuna particolare avvertenza nota

Avvertenze: Nessuna particolare avvertenza nota

Precauzioni:
1. Non utilizzare la medicazione Tegaderm™ Foam Adhesive in associazione con agenti ossidanti come acqua ossigenata o ipoclorito. Queste soluzioni infatti possono alterare la struttura e le prestazioni della schiuma di poliuretano.
2. Al momento di sostituire la medicazione, se questa aderisce alla ferita, saturarla di soluzione fisiologica e rimuoverla delicatamente.
3. Osservare la ferita per scoprire eventuali segni di infezione. In caso di infezione (indicata da presenza di febbre, aumento del dolore, arrossamento, gonfiore oppure odore o essudati anomali) consultare un operatore sanitario. La medicazione Tegaderm™ Foam Adhesive può essere utilizzata su ferite infette solo sotto la supervisione di un operatore sanitario.
4. Se la ferita non inizia a mostrare segni di guarigione o se si manifesta qualsiasi altro sintomo inatteso, consultare un operatore sanitario professionista.

Istruzioni per l'uso:
Nota bene: applicare i protocolli in uso per il controllo delle infezioni.

Prima di usare la medicazione:
1. Tagliare i peli in eccesso per migliorare il comfort del paziente.
2. Pulire la ferita e la cute circostante come indicato dai protocolli in uso. Nota bene: se la cute circostante la ferita è fragile o se si prevede l'esposizione a essudato, applicare un film barriera. Attendere che il film sia asciutto prima di applicare la medicazione.
3. Valutare lo stato della ferita. Selezionare una misura della medicazione più grande rispetto alla superficie della ferita.

Applicazione del medicato:
1. Estrarre la medicazione dalla confezione.
2. Afferrare la medicazione per una delle linguette laterali e togliere la striscia stampata in modo da esporre il bordo adesivo (Figura 1).
3. Stabilizzando la gamba o il tessuto circostante con una mano, posizionare la medicazione sulla ferita (Figura 2).
4. Applicare la medicazione alla cute tenendola con la mano a coppa. Continuando a premere, conformare bene la medicazione e il bordo adesivo sulla pelle (Figura 3).
5. Iniziare a rimuovere la cornice in carta superiore, partendo dalla sezione al centro della medicazione, tirandola verso l'esterno. Ripetere questa operazione per ogni parte della guida in carta fino a che sia rimossa tutta (Figura 4).
6. Premere con forza e conformare bene il bordo adesivo sulla cute (Figura 4).

Applicazione sul tallone/gomito
1. Estrarre la medicazione dalla confezione.
2. Afferrare la medicazione per una delle linguette laterali e togliere la striscia stampata in modo da esporre il bordo adesivo (Figura 1).
3. Stabilizzando la gamba o il tessuto circostante con una mano, posizionare la medicazione sulla ferita (Figura 2).
4. Applicare la medicazione alla cute tenendola con la mano a coppa. Continuando a premere, conformare bene la medicazione e il bordo adesivo sulla pelle (Figura 3).
5. Iniziare a rimuovere la cornice in carta superiore, partendo dalla sezione al centro della medicazione, tirandola verso l'esterno. Ripetere questa operazione per ogni parte della guida in carta fino a che sia rimossa tutta (Figura 4).
6. Premere fermamente e conformare il bordo adesivo alla cute (Figura 5).

Rimozione della medicazione:
1. Sollevare con cura i bordi della medicazione dalla cute. Se si riscontrano difficoltà, applicare un pezzo di cerotto ai bordi della medicazione e utilizzarlo per sollevare i bordi.
2. Continuare a sollevare i bordi fino al completo distacco dalla superficie cutanea. Rimuovere la medicazione.

Istruzioni per la sostituzione della medicazione:
1. Controllare frequentemente la medicazione. Man mano che la medicazione assorbe, l'essudato si sposta verso la superficie della medicazione ed è possibile osservare uno scolorimento. Quando l'essudato raggiunge i bordi della medicazione o inizia a fuoriuscire, è necessario sostituire la medicazione.
2. La frequenza di sostituzione della medicazione dipende dal tipo di ferita, dal volume di essudato e dalla situazione clinica. La medicazione deve essere sostituita almeno una volta alla settimana o secondo le indicazioni del protocollo di trattamento.

Conservazione e durata:
Per ottenere migliori risultati, conservare a temperatura ambiente. Evitare l'esposizione a calore e umidità eccessivi. Per informazioni sul periodo di conservazione, fare riferimento alla data di scadenza stampata su ogni confezione.

Confezioni:
Il prodotto è fornito in scatole contenenti medicazioni sterili confezionate singolarmente. La sterilità del prodotto è garantita se la singola confezione non è aperta o danneggiata.
Per informazioni o commenti, negli USA contattare la linea diretta dell'assistenza clienti 3M Health Care al numero 1-800-228-3957. In Italia, contattare 3M Italia SpA, 800-802145.

* I test in vitro mostrano che la pellicola trasparente fornisce una barriera ai virus di 27 nm di diametro o superiore, se la medicazione resta intatta senza perdite.

Legenda dei simboli

Non utilizzare se la confezione è danneggiata
Contiene lattice di gomma naturale
Prodotto monouso
Attenzione, leggere le istruzioni per l'uso
STERILE R Sterile, sterilizzato per irraggiamento
Fabbricante
Data di scadenza
LOT Numero di lotto
Data di produzione

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive (ES)

Apósito adhesivo de espuma de alto rendimiento

Descripción:
3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive es un apósito para heridas, de alto rendimiento, muy absorbente y transpirable. Se compone de una capa de espuma de poliuretano muy adaptable, de una capa adicional absorbente de fibras no tejidas y una capa más externa de lámina transparente adhesiva. Esta película es permeable al vapor húmedo lo que evita la exudación de la herida y actúa como barrera frente a la contaminación exterior, incluyendo virus y bacterias.* El apósito mantiene un ambiente húmedo en la herida, que está demostrado que mejora su cicatrización. El apósito se presenta estéril.

Indicaciones de Uso:
El apósito adhesivo de espuma Tegaderm™ está diseñado para adaptarse a la perfección a zonas del cuerpo con contornos difíciles, como los talones o los codos y sin necesidad de cortarlo. El apósito está indicado para usarse como apósito primario en heridas cutáneas con exudado de moderado a alto como, por ejemplo:
• úlceras por presión • úlceras venosas de la pierna • abrasiones • úlceras arteriales • desgarros de piel • úlceras neuropáticas

Otras aplicaciones del apósito adhesivo de espuma Tegaderm™ Foam Adhesive incluyen su uso:
• como apósito secundario (cobertura) para utilizarse conjuntamente con rellenos para heridas (como gasas o apósitos de alginato).
• bajo sistemas de vendajes compresivos para en el tratamiento de úlceras venosas de la pierna.

Este producto no ha sido diseñado ni puede ser vendido o utilizado para fines diferentes a los aquí indicados. El apósito adhesivo de espuma Tegaderm™ Foam Adhesive no está indicado para disminuir la presión ni tampoco como esponja quirúrgica.

Contraindicaciones: No se han descrito

Advertencias: No se han descrito

Precauciones:
1. No utilice el apósito adhesivo de espuma Tegaderm™ Foam Adhesive en combinación con agentes oxidantes como peróxido de hidrógeno o solución de hipoclorito. Estas soluciones pueden afectar la estructura y rendimiento de la capa de poliuretano del apósito hidrocelular.
2. En el momento de vendaje, si el apósito está adherido a la superficie de la herida, saturelo con solución salina normal y despéguelo suavemente.
3. Observe la úlcera por si tuviera signos de infección. Si se produce una infección, cuyos síntomas serían fiebre, aumento de dolor, rojez, hinchazón o un olor o supuración anormales, consultar con un profesional sanitario. El apósito adhesivo de espuma Tegaderm™ Foam Adhesive puede utilizarse en heridas infectadas sólo bajo el cuidado de un profesional sanitario.
4. Si la herida no comienza a mostrar señales de cicatrización o si se presenta algún otro síntoma inesperado, consulte con un profesional sanitario.

Instrucciones de uso:
Nota: Siga el protocolo para el control de la infección de su centro sanitario.

Antes de utilizar el apósito:
1. Recorte el exceso de vello para mayor comodidad del paciente.
2. Limpie la herida y la piel circundante de acuerdo con el protocolo del centro sanitario. Nota: Si la piel circundante de la herida es frágil o es posible que se exponga a la exudación de la herida, aplique una película protectora a modo de barrera. Deje que la película seque antes de aplicar el apósito.
3. Evalúe la herida. Seleccione el tamaño apropiado del apósito, asegurándose de que la espuma es mayor que el área de la herida.

Aplicación del apósito:
1. Extraiga el apósito del paquete.
2. Sujete el apósito por uno de los laterales y retire el separador impreso, dejando al descubierto el borde del adhesivo (figura 1).
3. Mientras sujeta las pestañas, coloque el apósito sobre la herida.
4. Presione suavemente el borde de película adhesiva a la piel (figura 2). Evite estirar el apósito o la piel.
5. Desde el centro del apósito, sujete una parte de la guía de papel y tire hacia el borde exterior del apósito. Repita este proceso con cada una de las secciones restantes del soporte hasta que haya quitado todas (figura 3).
6. Presione con firmeza y ajuste el borde adhesivo a la piel (figura 4).

Aplicación en talón/codo
1. Extraiga el apósito del paquete.
2. Sujete el apósito por uno de los laterales y retire el separador impreso, dejando al descubierto el borde del adhesivo (figura 1).
3. Al mismo tiempo que estabiliza la pierna o el tejido circundante con una mano, coloque el apósito sobre la herida (figura 2).
4. Con una mano, presione el apósito sobre la piel. Continúe presionándolo de modo que el apósito y el borde adhesivo se adapten al contorno de la piel (figura 3).
5. Desde el centro del apósito, sujete una parte de la guía de papel y tire hacia el borde exterior del apósito. Repita este proceso con cada una de las secciones restantes del soporte hasta que haya quitado todas (figura 4).
6. Presione con firmeza y ajuste el borde adhesivo a la piel (figura 5).

Retirada del apósito:
1. Despegue cuidadosamente los bordes del apósito. Si encuentra dificultad para levantar el apósito, aplique una tira de separadoras en el borde y utilícela para levantarlo.
2. Siga despegando los bordes hasta que todos se hayan desprendido de la superficie cutánea. Quitar el apósito.

Consideraciones sobre el cambio de apósito:
1. Observar frecuentemente el apósito. A medida que el apósito absorbe, la exudación subirá a la parte superior del apósito, y se notará una decoloración. Cuando la exudación se extienda a los bordes del apósito o éste empieze a gotear, es necesario cambiarlo.
2. La frecuencia de cambio de apósito dependerá del tipo de herida, el volumen de exudación y la situación clínica. Cambiar el apósito por lo menos cada siete días o según indique el protocolo de tratamiento.

Almacenamiento y caducidad del producto:
Para obtener los mejores resultados, almacenar a temperatura ambiente. Evitar exceso de calor y humedad. Consultar la fecha de caducidad impresa en cada caja para verificar la validez del producto.

Forma de suministro:
Se presenta en cajas con los apósitos estériles empaquetados individualmente. La esterilidad del producto está garantizada a menos que el envase individual esté dañado o abierto.
Si tiene alguna pregunta o comentario, comuníquese con nuestra Línea de Atención al Cliente de 3M (en España) en el 900-210-584. Fuera de los Estados Unidos, póngase en contacto con la subsidiaria local de 3M.

* Las pruebas in vitro muestran que la película transparente proporciona una barrera eficaz frente a virus de 27 nm de diámetro o más siempre que el apósito permanezca intacto sin fugas.

Explicación de los símbolos

No utilice si el producto o el paquete se encuentra dañado
No fue elaborado con látex de goma natural
No volver a utilizarlo
Precaución: consulte las instrucciones de uso
STERILE R Esterilizado por medio de irradiación
Fabricante
Utilizar antes de la fecha
LOT Código de lote
Fecha de fabricación

3M™ Tegaderm™ Klevend foamverband (NL)

High-performance klevend foamverband

Omschrijving:
3M™ Tegaderm™ High-performance klevend foamverband is een ademend wondverband met een hoog absorptievermogen. Het is gemaakt van een naar het lichaam vormend, polyurethaan foamkompres, extra absorberende nonwoven lagen en een bovenlaag van doorzichtig klevende film. Deze film is doorlaatbaar voor zuurstof en waterdamp en voorkomt lekkage van wondvocht. De film voorziet tevens in een barrière voor contaminatie van buitenaf, inclusief bacteriën en virussen.* Het verband houdt een vochtig wondmilieu, dat wondheling optimaliseert. Het verband wordt steriel geleverd.

Gebruiksaanwijzing:
Tegaderm™ Klevend foamverband is dusdanig ontworpen dat het eenvoudig met één hand kan worden aangebracht op verschillende lichaamscontouren, zoals hielen en ellebogen, zonder dat het hoeft te worden gekrist. Het wondverband is geïndiceerd voor gebruik als primair wondverband voor weing tot sterk exsuderende, oppervlakkige en diepe huidwonden, zoals:
• drukulcera • veneuze beenulcera • schuurplekken • arteriële ulcera • gescheurde huid • neuropathische ulcera

Tegaderm™ Klevend foamverband kan ook worden gebruikt:
• als secundair verband in combinatie met wondvullende materialen (zoals gaas- of alginaatverbanden).
• onder compressiezwachtels bij de behandeling van ulcus cruris veneusum.

Dit product is alleen ontworpen en bedoeld voor de aangegeven doeleinden en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt of verkocht. Tegaderm™ Klevend foamverband is niet bedoeld om de druk te reduceren of te gebruiken als chirurgische spons.

Contra-indicaties: Geen bekend

Waarschuwing: Geen bekend

Voorzorgsmaatregelen:
1. Gebruik 3M Tegaderm™ Klevend foamverband niet in combinatie met oxiderende middelen zoals waterstofperoxide of hypochlorietoplossing. Deze oplossingen kunnen de structuur en de werking van het polyurethaan foamkussen aantasten.
2. Indien bij het verwijderen het verband aan het wondoppervlak kleeft, dient u het met een standaard fysiologische zoutoplossing te verzadigen en zachtjes los te maken.
3. Observeer de wond voor tekenen van een infectie. Raadpleeg een medisch specialist indien tekenen van infectie zich voordoen, zoals koorts, hevige pijn, een rode of gezwollen huid of een ongewone geur of afscheiding. Tegaderm™ Klevend foamverband mag alleen onder toezicht van een medisch specialist op geïnfecteerde wonden worden gebruikt.
4. Als de wond geen tekenen van genezing vertoont of als zich andere onverwachte symptomen voordoen, raadpleeg dan een medisch specialist.

Gebruiksaanwijzing
Opmerking: Volg de richtlijnen van uw ziekenhuis voor het bestrijden van infecties.

Vóór u het verband gebruikt:
1. Verwijder overtollig haar voor het comfort van de patiënt.
2. Reinig de wond en omringende huid overeenkomstig het ziekenhuisbeleid. Opmerking: als de huid rondom de wond kwetsbaar is of als de kans groot is dat de huid met wondvocht in contact komt, dient u een barrière film aan te brengen. Laat de barrière film droogtrekken voordat u het verband aanbrengt.
3. Beoordeel de wond. Kies het juiste formaat om er zeker van te zijn dat het foamkompres groter is dan het

3M™ Tegaderm™ HP Foam Adhesive (NO)

Høyabsorberende selvklebende skumbandasje

Beskrivelse:
3M™ Tegaderm™ høyabsorberende selvklebende skumbandasje er en meget absorberende semipermeabel bandasje som lar huden puste. Produktet er fremstilt av formbart polyuretanskum, et absorberende nonwoven lag, og et topplag med transparent, semipermeabel, selvklebende film. Denne filmen er fuktighetsgjennomtrengende, forhindrer at sårvæske trenger gjennom og virker som en barriere mot kontaminasjon utenfra, inkludert bakterier og viruser.* Bandasjen opprettholder et fuktig sårmiljø, som fremmer sårtilheling. Bandasjen leveres steril.

Bruksområder:
Tegaderm™ selvklebende skumbandasje er designet for enkel påsetting med én hånd på krevende kroppskonturer, inkludert hæler og albuer, uten å måtte klippe. Bandasjen er indisert for bruk som en primærbandasje for lite til svært væskende sår i huden, med delvis eg full tykkelse, inkludert:
- tryksår • venøse bensår • skrubbsår • arterielle sår • riffer i huden • nevropatiske sår

Ytterligere bruk av Tegaderm™ HP Foam selvklebende bandasje omfatter:
- som sekundærbandasje sammen med sårfyller (som gas eller alginatbandasje).
- under kompresjonsbandasjer til behandling av venøse leggsår.

Dette produktet er ikke designet, solgt eller tilrettelt annet enn det som nevnes her. Tegaderm™ HP Foam selvklebende bandasje er ikke ment til bruk som trykkavlastning eller som en kirurgisk svamp.

Kontraindikasjoner: Ingen kjente

Advarsler: Ingen kjente

Forsiktighetsregler:
1. Bruk ikke Tegaderm™ Foam selvklebende bandasje sammen med oksiderende midler som hydrogenperoksid eller en hypokloritholdig løsning. Slike opplesninger kan adelegge polyuretanskummets struktur og funksjon.
2. Hvis bandasjen kleber seg fast til sårflate på det tidspunktet den skal byttes, bør den gjennombløtes med vanlig saltløsning og lesnes varsomt.
3. Kontroller såret for tegn på infeksjon. Dersom infeksjon oppstår, med symptomer som feber, økt smerte, rødhet, hevelse eller utsivelse av sårvæske, bør såret undersøkes av lege eller helsepersonell kontaktes. Tegaderm™ Foam selvklebende bandasje må bare brukes på infiserte sår under tilsyn av profesjonelle helsepersonale.
4. Dersom såret ikke viser tegn til heling, eller hvis et annet uventet symptom oppstår, bør man rådføre seg med helsepersonale.

Bruksanvisning:
Merknad: Følg instruksjonene veiledninger for smittevern.

Forberedelse:
1. For pasientens skyld bør overflødig hårvekst fjernes.
2. Rengjør såret og huden rundt i henhold til institusjonens retningslinjer. Merknad: Dersom huden er sart,eller utsatteflse for sårvæske er sannsynlig, bør en barrierefilm brukes på huden. La barrierefilmen tørke fullstendig før bandasjen legges på.
3. Vurder såret. Velg en riktig størrelse av bandasjen slik at skummet er større enn sårområdet.

Applisering av bandasjen:
1. Fjern bandasjen fra pakken.
2. Hold bandasjen i en av sidelikene og ta av den trykte papirforingen, slik at klebekanten blir synlig (figur 1).
3. Hold likene og dissper bandasjen over såret.
4. Trykk forsiktig ned den klebende kanten på huden (figur 2). Unngå å strekke bandasjen eller huden.
5. Start midt på bandasjen, grip en del av papiret og dra ut det trykketanken av bandasjen. Gjenta for alle papirforinger, til alt er fatt av (figur 4).
6. Trykk klebekanten ned med et fast trykk langs huden (figur 4)

Applisering av bandasje på hæl/albue
1. Fjern bandasjen fra pakken.
2. Hold bandasjen i en av sidelikene og ta av den trykte papirforingen, slik at klebekanten blir synlig (figur 1).
3. Stabiliser benet eller omkringliggende vev med en hånd, og plasser bandasjen over såret (figur 2).
4. Trykk bandasjen på huden med en hånd. Fortsett å trykke bandasjen og klebekanten ned langs huden (figur 3).
5. Start midt på bandasjen, grip en del av papiret og dra mot ytterkanten av bandasjen. Gjenta for alle papirforinger, til alt er fatt av (figur 4).
6. Trykk klebekanten ned med et fast trykk langs huden (figur 5).

Fjerning av bandasjen:
1. Løft flimkanterne forsiktig fra huden. Dersom bandasjen er vanskelig å fjerne bør tape brukes til å løfte opp kantene.
2. Fortsett å løfte opp alle kantene fra hudoverflaten. Fjern deretter bandasjen.

Vurderinger ved skifting av bandasje:
1. Kontroller bandasjen ofte. Etter hvert som bandasjen absorberer, vil sårvæske stige til det ytterste laget av bandasjen, og misfarging kan bli synlig. Når sårvæske spres til kantene av bandasjen, eller bandasjen begynner å lekke, skal den skiftes.
2. Hvor hyppig bandasjen utskiftes er avhengig av type sår, mengde med sårvæske, og klinisk situasjon. Bandasjen skal skiftes minst en gang i uken, eller som anvist i behandlingsjournalen.

Oppbevaring og holdbarhet:
Oppbevares ved romtemperatur. Unngå for mye varme og fuktighet. For holdbarhet henvises det til utløpsdato på eskene.

Leveringsform:
Leveres i esker med individuelt pakkede sterile bandasjer. Produktets sterilitet garanteres så lenge den individuelle posen ikke er skadet eller åpnet.
Har du spørsmål eller kommentarer i USA, vennligst kontakt 3M kundelinjen for helsemorsog. I Norge, ta kontakt med 3M Norge A/S, avd. Helse på 0 63 84. Utenfor USA kontaktes det lokale 3M datterselskapet.

*In vitro testing viser at den gjennomskittige filmen gir en virusbarriere fra virus 27 nm i diameter eller større når bandasjen er intakt og uten lekkasje.

Symbolforklaring

Ikke bruk hvis emballasjen er skadet · Forsiktig, se bruksanvisningen · Fremstilt uten naturgummi-lateks · Sterilisert ved hjelp av bestråling · Produsent · Bruk før dato · Vimeinen käyttöpäivä · Lot Eränumero · Produksjonsdato

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive (FI)

Erittäin suorituskykyinen, liimallinen vaahtolevysidos

Tuotekuvaus:
3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive Erittäin suorituskykyinen, liimallinen vaahtolevysidos on erittäin hyvin imevä ja hengittävä haavasidos. Sidos on valmistettu muotoutuvasta polyuretaanivaahtolevystä, imevästä kuitukangaskerroksesta ja läpinäkyvästä, liimapintaisesta tiivistävästä kalvosta. Kalvo on kosteuden läpäisevää materiaalia, joka estää ulkoisten epäpuhtauksien, mukaan lukien bakteerien ja virusten, pääsyn haavaan.* Sidos pitää haavan kosteana, minkä on todettu edistävän haavan paranemista. Sidos on steriili.

Käyttökohteet:
Tegaderm™ Foam -vaahtolevysidos on suunniteltu mahdollistamaan helppo kiinnitys yhdellä kädellä hankalanmuotoisin kehon osin, mukaan lukien kantapäihin ja kyynärpäihin, ilman, että sitä tarvitsee leikata. Sidos on indikoitu käyttöaiheisiksi ensisijaisena sidoksena vähäinen/kohtalaista runsaaritelleisille, toisen ja kolmannen asteen ihohaavoille, jotkin kuuluvat esimerkiksi:
- painehaavat • laskimoperäiset säärihaavat • iholrikot • valtimoperäiset haavat • ihon repeämät
- neuropaattiset haavat

Tegaderm™ Foam Liimallisen vaahtolevysidoksen muita käyttökohteita ovat:
- toissijainen (peitto) sidos, jota käytetään haavatamponien kanssa (kuten sideharso- tai alginaatti-sidokset).
- laskimoperäisten säärihaavojen kompressiosidosten alla.

Tätä tuotetta ei ole suunniteltu, myyty eikä tarkoitettu muuhun kuin indikaatioiden mukaiseen käyttöön. Tegaderm™ Foam Liimallista vaahtolevysidosta ei ole tarkoitettu käytettäväksi staasaavana painesidoksena tai kirurgisena sienenä.

Kontraindikaatiot: Ei tunnetu

Varoitukset: Ei tunnetu

Varotoimet:
1. Älä käytä Tegaderm™ Foam Liimallista vaahtolevysidosta hapettavien aineiden, kuten vetyperoksidin tai hypokloriittiliuoksen, kanssa. Nämä luokset voivat heikentää polyuretaanivaahtomuovin rakennetta ja toimintaa.
2. Jos sidosta vaihdettaessa huomat, että sidos on tarttunut haavan pintaan, irrota sidos varovasti hyödyntäen fysiologista suolaliuosta apuna.
3. Tarkista, onko haavassa infektio-oireita. Infektion oireita ovat esimerkiksi kuume, lisääntynyt kipu, punoitus, turvotus tai epätavallinen haju tai eritys. Jos haavassa on infektio, hakeudu lääkärin hoitoon. Tegaderm™ Foam Liimallista vaahtolevysidosta voidaan käyttää infektoituneissa haavoissa vain hoitohenkilökunnan valvonnassa.
4. Jos haavassa ei ala näkyä paranemisen merkkejä tai ilmenee muita odottamattomia oireita, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Käyttöohje:
Huom: Noudata infektioiden torjuntaa koskevia ohjeita.

Ennen sidoksen asettamista:
1. Poista liika karvoitus potilaan mukavuutta varten.
2. Puhdista haava ja sitä ympäröivä iho saatavan ohjeiden mukaisesti. Huom: Jos haavan ympärillä oleva iho on haurasta tai altistuminen haavaeritteille on todennäköistä, käytä ihonsuojakalvoa. Anna ihonsuojakalvon kuivua ennen sidoksen pakkaileen laittamista.
3. Arvioi haava. Valitse oikean kokoinen haavasidos ja varmista, että sidoksen vaahtolevyosuus on suurempi kuin haava.

Sidoksen asettaminen haavaan:
1. Poista sidos pakkauksesta.
2. Pidä sidosta toisessa sivukiinnikkeestä ja irrota painotekstisä sisältävä taustapaperi niin, että liimareuna tulee esiin (kuva 1).
3. Aseta sidos haavan pälle siten kiinnin sivuliuoksista.
4. Paina kalvon reuna varovasti kiinni ihoon (kuva 2). Vältä sidoksen tai ihon venyttämistä.
5. Aloita sidoksen keskeltä, älä kiinnin suojapaperin yläosista osasta ja vedä sitä sidoksen ulkoreunaa kohti. Toista tämä suojapaperin kaikisen osien kohdalla, kunnes suojapaperi on kokonaan poistettu (kuva 3).
6. Paina liimareunaa ja muotoile se tiiviisti kiinni ihoon (kuva 4).

Sidoksen kiinnittäminen kantapäähän/kyynärpäähän
1. Poista sidos pakkauksesta.
2. Pidä sidosta toisesta sivukiinnikkeestä ja irrota painotekstisä sisältävä taustapaperi niin, että liimareuna tulee esiin (kuva 1).
3. Samalla, kun pidät jalasta tai ympäröivästä kudoksesta kiinni toisella kädellä, aseta sidos toisella kädellä haavan pälle (kuva 2).
4. Paina sidos toisella kädellä kiinni ihoon tai muotoile se samalla "kuppimaiseksi". Jatka sidoksen ja liimareunan painamista ja muotoilemista ihoon (kuva 3).
5. Aloita sidoksen keskeltä, älä kiinni suojapaperin yläosista osasta ja vedä sitä sidoksen ulkoreunaa kohti. Toista tämä suojapaperin kaikisen osien kohdalla, kunnes suojapaperi on kokonaan poistettu (kuva 4).
6. Painele ja muotoile liimareuna tiiviisti ihoon kiinni (kuva 5).

Haavasidoksen poistaminen:
1. Nosta haavasidoksen reunat varovaisesti irti ihosta. Jos sidoksen nostamisessa on vaikeuksia, kiinnitä sidoksen reunaan teippipä ja irrota sidos teipin avulla.
2. Jatka reunojen nostamista, kunnes kaikki reunat ovat irronneet ihosta. Poista sidos.

Huomioonottavtaa sidosta vaihdettaessa:
1. Tarkista sidos säännöllisesti. Kun sidoksen imeytyy haavaeritettä, haavaerite leviää sidoksen pinnalle, jolloin sidoksen pinnan väri voi muuttua. Jos haavaerite leviää sidoksen reunolle tai sidos alkaa vuotaa, sidos on vaihdettava.
2. Sidoksen vaihtoheryys riippuu haavan tyypistä, haavaeritteen määrästä ja kliinisestä tilanteesta. Vähän sidos vähintään seitsemän päivän välein tai hoito-ohjeiden mukaisesti.

Varastointi ja säilyvyys:
Säilytä huoneenlämmössä. Vältä liiallista kuumuutta ja kosteutta. Katso tuotteen viimeinen käyttöpäivämäärä pakkauksesta.

Pakkaukset:
Sidokset ovat steriilejä ja ne toimitetaan rasioissa yksittäispakattuina. Tuote on steriili, mikäli sidoksen pussi ei ole vaurioituinut tai avaunut.
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja, ota yhteyttä: Suomen 3M Oy, Medical. Lars Sonckin kaari 6, 02600 Espoo puhelin: (09) 525 21 faksi: (09) 512 2944. Ota Yhdysvaltojen ulkopuolella yhteys 3M:n työtarvitsen.

*In vitro -testaus osoittaa, että läpinäkyvä kalvo suojaa halkaisijaltaan 27 nm:n kokoisilta tai suuremmilta viruksilta, kun sidos on ehjä eikä se vuoda.

Merkkien selitykset

Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut · Huom! Katso käyttöohjeet · Steriilisti säteilyttämällä · Älä käytä uudelleen · Ei saa käyttää uudelleen · Valmistaja · Valmistusjakso · Valmistusjakso · Valmistusjakso

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive (PT)

Penso de Espuma Adesivo de Elevado Desempenho

Descrição:
O Penso Adesivo de Espuma de Alto Desempenho Tegaderm™, 3M.™ é um penso de elevada absorção e respirável para feridas. É elaborado com uma almofada de espuma de poliuretano conformável, camadas absorventes de tecido não-tecido adicionais, e uma camada de película adesiva transparente na parte superior. Esta película é permeável ao vapor de água, impedindo a repassagem do exsudado da ferida, e funciona como uma barreira protectora contra a contaminação exterior (por vírus e bactérias).* O penso mantém o ambiente húmido da ferida, condição que tem sido demonstrado como sendo favorável na cicatrização das feridas. O penso é fornecido estéril.

Indicações para Utilização:
O Penso Adesivo de Espuma Tegaderm™ foi concebido para permitir uma aplicação fácil, apenas com uma mão, em contornos difíceis do corpo, como calcanhares e cotovelos, sem necessidade de cortar. O penso é indicado para utilização como um penso primário em feridas dérmicas com baixa ou alta exsudação e espessura parcial ou total, tais como:
- úlceras de pressão • úlceras venosas nas pernas • abrasões • úlceras arteriais • rasgos na pele
- úlceras neuropáticas

Outras aplicações para o penso adesivo de espuma Tegaderm™ incluem:
- a sua utilização como penso secundário (cobertura) em conjunto com enchumaços para feridas (tais como gaze ou pensos de alginato).
- a sua utilização sob os sistemas de ligadura de compressão no tratamento da úlcera venosa da perna.

O produto não foi concebido nem pode ser vendido ou utilizado para outros fins que não os indicados. O penso adesivo de espuma Tegaderm™ não é concebido para utilizar na redução de pressão ou como esponja cirúrgica.

Contra-indicações: Nenhuma conhecida

Avisos: Nenhuma conhecida

Precauções:
1. Não use o penso adesivo de espuma Tegaderm™ em combinação com agentes oxidantes tais como peróxido de hidrogénio ou solução de hipoclorito de sódio. Estas soluções podem afectar a estrutura e desempenho da espuma de poliuretano.
2. Na altura de mudança do penso, se este estiver colado à superfície da ferida, sature com solução salina normal e solte com cuidado.
3. Observe a ferida para verificar se existem indícios de infecção. Se ocorrer infecção, a qual poderá ter como sintomas como a febre, aumento de dor, vermelhidão, inchaço ou um odor ou exsudado fora do normal, consulte um profissional de saúde. O penso adesivo de espuma Tegaderm™ só pode ser usado em feridas infectadas sob os cuidados de um profissional da saúde.
4. Consulte um profissional de saúde se a ferida não começar a mostrar sinais de melhoria ou se quaisquer outros sintomas fora do comum forem observados.

Instruções de Utilização
Nota: Siga corretamente as normas da instituição, para controlo da infecção.

Antes de aplicar o penso:
1. Corte o excesso de pêlos para maior conforto do doente.
2. Limpe a ferida e a pele circundante de acordo com o protocolo da instituição. Nota: Se a pele ao redor da ferida for frágil ou se for provável a sua exposição ao exsudado da ferida, aplique uma película de barreira. Permita que a película de barreira seque antes de aplicar o penso.
3. Avalie a ferida. Selecione o tamanho de penso apropriado, para que o seu tamanho seja sempre maior que seja sempre maior que a área da ferida a tratar.

Aplicar o Penso:
1. Retire o penso da embalagem.
2. Segure o penso por uma das abas laterais e remova o revestimento impresso, expondo o rebordo adesivo (Figura 1).
3. Estabilizando a pena ou o tecido circundante com uma mão, posicione o penso sobre a ferida (Figura 2).
4. Com uma mão, pressione ou faça concha para dodrado o penso à pele. Continue a pressionar e a moldar o penso e o limite adesivo à pele (Figura 3).
5. Começando no centro do penso, pegue numa secção do suporte de papel e puxe-a no sentido da extremidade externa do penso. Repita este procedimento para cada uma das restantes secções do papel de protecção até que todo o papel esteja removido (Figura 3).
6. Pressione firmemente e molde o rebordo adesivo à pele (Figura 4).

Remover o penso:
1. Levante cuidadosamente as margens do penso da pele. Se tiver dificuldades a levantar o penso, coloque fita na margem do penso e use a fita para levantar.
2. Continue a levantar as margens, até que nenhuma fique em contacto com a superfície da pele. Remova o penso.

Considerações sobre a mudança do penso:
1. Observe o penso frequentemente. A medida que o penso for absorvendo, o exsudado aderirá ao topo do penso, e poder-se-á notar uma certa descoloração. Quando o exsudado se espalhar para as margens do penso, ou quando este começar a descolar, é aconselhável proceder à troca do penso.
2. A frequência da mudança do penso dependerá do tipo de ferida, volume de exsudado e situação clínica. Troque o penso pelo menos uma vez cada sete dias, ou conforme indicado de acordo com o protocolo de tratamento.

Armazenamento e prazo de validade:
Para obter os melhores resultados, armazene à temperatura ambiente. Evite o calor e a humidade excessivos. Para saber o prazo de validade em armazenamento, consulte o prazo de validade impresso em cada caixa.

Apresentação:
Fornecido em caixas de pensos esterilizados embalados individualmente. A esterilidade do produto é garantida a menos que a bolsa individual esteja aberta ou danificada.
Para quaisquer dúvidas ou comentários, deverá contactar a 3M Portugal-Linha de Apoio ao Cliente, através do número: 21 313 4619. Fora dos Estados Unidos, contactar o representante local da 3M.

*Os ensaios in vitro demonstram que a película transparente proporciona uma barreira viral contra vírus com diâmetro de 27 nm ou superior enquanto o penso estiver intacto e sem fugas.

Explicação dos Símbolos

Não utilize se a embalagem estiver danificada · Não é fabricado em látex de borracha natural · Não reutilizar · Atenção: consulte as instruções de utilização · Esterilizada por irradiação · Fabricante · Data de Validade · Data de Fabrico · Lote · Código do lote · Número do Lote · Data de Fabrico

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive (GR)

Αφρώδες Αυτοκόλλητο Επίθεμα Υψηλής Αποδόσης

Περιγραφή:
Το 3M™ Tegaderm™ Αφρώδες Αυτοκόλλητο Επίθεμα Υψηλής Απόδοσης είναι ένα εξαιρετικά απορροφητικό, διατεμαστό στην ανάπτυκτη, επίθεμα τραύματος. Αποτελείται από μια αυτοκόλλητη πρώτη αφρώδες πολυουρεθάνη, απορροφητικά στρώματα μη υφασμένου υλικού και στην άνω επιφάνεια μια τυπωμένη αυτοκόλλητη μεμβράνη. Αυτή η αδιάβροχη μεμβράνη είναι διατεμαστή από τους ιόβρυπαρμε, μεγαίνες που αποτρέπει την διαφυγή των εξιδρωμάτων κυμών και δρα ως φραγμός προστασίας ενάντια εξωτερικών μολυσματικών, συμπεριλαμβανομένων βακτηριών και ιών.* Το επίθεμα διατηρεί ένα υγρό περιβάλλον στο τραύμα, που έχει δοκιμαστεί ότι αυξάνει το ρυθμό επουλώματος. Το επίθεμα παρέχεται αποστειρωμένο.

Ενδείξεις για χρήση:
Το Tegaderm™ Αφρώδες Επίθεμα έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή με το ένα χέρι σε δύσκολες ανατομικές περιοχές του σώματος, οπως αστράγαλοι κ.τ.λ. τα τα τα

Möllers
DRUCK UND MEDIEN

Markusstraße 6
48599 Gronau-Epe
e-Mail: info@moellers-druck.de

Tel.: 0 25 65 / 93 24 21
Fax: 0 25 65 / 93 24 24

Customer	3M Medica	Colours used Front: 1 / Back: 1	
Description	Tegaderm Foam Adhesive Leaflet	Colour name: Black / Black	■ ■
DV-No.	DV-1563-0025-8/1018	/	□ □
Open Size	816 mm x 306 mm	/	□ □
Folded Size	102 mm x 89 mm	Material g/m²	
Proof No.	5		
Date	24-10-2018 Germany	Info: MD&M 518-00562	