*smith&nephew

Artwork Info:

Artwork Ref:	15731
Previous/Base:	N/A
Product Code:	4959
Component:	Carton
Brand:	Ichthopaste
Range:	XXX
Product:	Zinc Paste Ichthammel Bandage
Quantity:	
Barcode:	N/A
Dimensions:	N/A
Version:	252 x 330 mm
Artworker:	00
Amend Date:	Ezra

Tech Colours:

Guides

Cutter

Crease

Print Free	Varnish	Braille

Artwork Colours:

Pantone Black	PXXX	PXXX
PXXX	PXXX	PXXX

FR

EVOLAN

ICHTHOPASTE®

Bande imprégnée de pâte de zinc et d'ichthyolammonium

Description
ICHTHOPASTE est une bande tissée à la structure aérée imprégnée d'une pâte contenant de l'oxyde de zinc BP à 6,32 % et de l'ichthyolammonium BP à 2 % enroulée autour d'un support en matière plastique. ICHTHOPASTE contient également de l'eau purifiée, de la glycérine, de la gélatine (d'origine porcine), de la cire émulsifiante et du phénoxyéthanol. Chaque boîte en carton contient une bande sous enveloppe protectrice dans un sachet hermétique en polyéthylène.

Mode d'action
ICHTHOPASTE est un traitement à usage topique. Il permet la cicatrisation en milieu humide des ulcères veineux de la jambe, aide à soulager les irritations cutanées et calme et protège les tissus cutanés environnants. Ne sèche pas une fois en place.

Indications
ICHTHOPASTE est indiqué dans la prise en charge des ulcères de jambe. En cas d'insuffisance veineuse, la bande imprégnée sera accompagnée d'une bande de contention dégressive. ICHTHOPASTE est également adapté dans la prise en charge de l'eczéma/dermatite chronique, lorsque l'occlusion s'impose.

Contre-indications
Ne pas utiliser en cas de sensibilité ou d'allergie connue à l'un des composants

Précautions d'emploi
En cas d'insuffisance veineuse, utiliser ICHTHOPASTE sous une bande de contention progressive après avoir écarté toute artériopathie à l'examen du patient. A cette fin, l'examen Doppler est recommandé. La bande de contention ne devra pas être utilisée chez le patient atteint d'artériopathie (IPS <0,8). Elle n'est pas non plus recommandée chez le patient diabétique atteint de microangiopathie au stade avancé. **L'absence de détection d'un débit artériel faible peut avoir des conséquences sérieuses : nécroses de compression, amputation, voire décès. Le risque d'atteinte mixte (à la fois veineuse et artérielle) augmente avec l'âge.** La peau des patients souffrant d'ulcère de jambe réagit facilement aux médicaments topiques, y compris aux agents de conservation. On soupçonnera tout particulièrement une sensibilisation chez le patient présentant une dégradation des tissus cutanés environnants. Dans ce cas, le patient devra être orienté vers un service adapté pour y subir un examen spécialisé, notamment un test épicutané. Les pansements occlusifs ont entre autres pour fonction d'augmenter l'absorption. Une attention particulière devra donc être portée en cas d'application topique de préparations à base de stéroïdes, d'anesthésiques ou de rétinoïdes sous la bande, car il est possible que leur absorption en soit considérablement accrue. L'effet du produit anesthésique pourra alors être écourté et le risque de sensibilisation à de telles préparations accru. À usage topique uniquement. ICHTHOPASTE est un produit à usage unique. L'utilisation chez plus d'un patient peut entraîner une contamination croisée ou une infection. Après ouverture du sachet, tout pansement non utilisé ne doit pas être gardé pour une application ultérieure. Les patients doivent être informés que le produit contient de la gélatine d'origine porcine avant l'utilisation.

Mode d'emploi
Une fois retiré de son sachet hermétique et de son enveloppe protectrice, ce produit est prêt à l'emploi. Deux méthodes d'application sont possibles :
1. En partant de la base des orteils, appliquer la bande en spirale *(sans serrer)* autour du pied, du talon et de la jambe jusqu'au-dessous du genou. Une fois posée, lisser la surface de la bande pour qu'elle moule parfaitement la jambe.
2. En partant de la base des orteils, appliquer la bande *(sans serrer)* autour du pied et du talon, puis à partir de la cheville, replier la bande sur elle-même sur le devant de la jambe à chaque spire. Répéter ce geste jusqu'à atteindre le dessous du genou. Faire suivre d'une bande de contention si nécessaire. Une fois l'application d'ICHTHOPASTE terminée, recouvrir la jambe d'une bande ou d'un pansement afin de ne pas tacher les vêtements.

Durée d'utilisation recommandée chez les adultes et les enfants
Changer le bandage si nécessaire, peut rester en place jusqu'à 7 jours au maximum.

Effets indésirables éventuels
ICHTHOPASTE peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Ont été declarés :
- réactions cutanées locales : éruptions (rash), rougeurs, démangeaisons et brûlures.

Présentation du produit

Code	Taille	Présentation
4959	7,5cm x 6m	Boîte de 1 bande

Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Suède
™Marque de commerce de Evolan Pharma AB ©Evolan Pharma AB
Date d'édition 02/2021

DE

EVOLAN

ICHTHOPASTE®

Verband mit Zinkpaste und Ichthammol

Beschreibung
ICHTHOPASTE ist ein Mullbindenverband, der mit einer Paste aus 6,32 % Zinkoxid BP und 2 % Ichthammol BP getränkt und auf einen Kunststoffkern aufgerollt ist. Die Paste enthält außerdem destilliertes Wasser, Glyzerin, Schweinegelatine, Emulgierwachs und Phenoxyethanol. Jeder Verband wird in einer Hülle und eingeschweißt in einen Polyethylenbeutel in einer Kartonverpackung geliefert.

Funktionsprinzip
ICHTHOPASTE dient der topischen Behandlung. Der Verband schafft ein feuchtes Milieu für die Wundheilung über einem venösen Beinulkus, hilft Hautirritationen zu reduzieren und beruhigt und schützt die umgebende Haut. Die Paste trocknet während der Anwendung nicht ein.

Indikationen
ICHTHOPASTE ist zur Unterstützung bei der Versorgung von venösen Beingeschwüren indiziert. Bei bestehender Veneninsuffizienz sollte der Pastenverband unter einem graduierten Kompressionsverband angewendet werden.
ICHTHOPASTE eignet sich auch zur Versorgung von chronischem Ekzem/Dermatitis, sofern Okklusion indiziert ist.

Gegenanzeigen
Nicht verwenden, wenn eine Überempfindlichkeit oder Allergie gegen einen der Bestandteile bekannt ist.

Vorsichtsmaßnahmen
Wenn eine venöse Insuffizienz vorliegt, sollte ICHTHOPASTE unter einem abgestuften Kompressionsverband angewendet werden, und nur, nachdem bei dem Patienten eine arterielle Verschlusskrankheit ausgeschlossen wurde. Zu diesem Zweck wird die Verwendung von Doppler-Ultraschall empfohlen. Kompressionsverbände sollten nicht für Patienten verwendet werden, bei denen eine arterielle Verschlusskrankheit (ABPI < 0,8) vorliegt, und sind nicht empfohlen für diabetische Patienten mit fortgeschrittener Mikroangiopathie. **Wenn eine verringerte arterielle Durchblutung nicht erkannt wird, kann dies Druck-nekrosen, Amputationen oder sogar den Tod zur Folge haben. Das Risiko, dass ein Patienten sowohl unter arterieller als auch venöser Verschlusskrankheit leidet, steigt mit dem Alter an.** Die Haut von Patienten mit Beinulzera sensibilisiert sich schnell gegenüber topischen Medikamenten, einschließlich der Konservierungsmittel. Eine Sensibilisierung sollte insbesondere bei Patienten vermutet werden, bei denen eine Verschlimmerung der umgebenden Haut vorliegt. Diese Patienten sollten zur Diagnose einschließlich Patch-Test an einen Spezialisten überwiesen werden. Eine der Funktionen eines Okklusionsverbands besteht in einer Steigerung der Absorption. Daher muss die Anwendung von topischen Steroiden, Anästhetika oder Retinoiden unter dem Verband sorgfältig abgewägt werden, da diese Präparate signifikant stärker absorbiert werden könnten. Dies kann die Wirkdauer eines topischen Anästhetikums verkürzen und das Risiko einer Sensibilisierung gegenüber solchen Präparaten erhöhen. Nur zur äußerlichen Anwendung. ICHTHOPASTE ist ein Einmal-Produkt. Eine Verwendung bei mehr als einem Patienten kann Kreuzkontamination oder Infektionen zur Folge haben. Nach dem Öffnen der Verpackung darf ungebrauchtes Material nicht für eine spätere Anwendung aufbewahrt werden. Die Patienten sollten vor der Anwendung darüber informiert werden, dass die Paste Schweinegelatine enthält.

Gebrauchsanweisung
Dieses Produkt ist nach dem Entnehmen aus dem verschweißten Beutel und dem Entfernen der Hülle gebrauchsfertig. Der Verband kann auf zwei Arten angewendet werden:
1. Beginnen Sie unterhalb der Zehen und wickeln Sie den Verband *locker* um Fuß, Ferse und dann spiralförmig das Bein hinauf bis knapp unter das Knie. Nach dem Anlegen sollte der Verband um das Bein festgedrückt und glattgestrichen werden.
2. Beginnen Sie unterhalb der Zehen und wickeln Sie den Verband *locker* um Fuß und Ferse. Ab dem Knöchel schlagen Sie den Verband nach jeder Runde vorne am Bein um, so dass sich eine Falte ergibt. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis knapp unterhalb des Knies. Anschließend kann ein Kompressionsverband angelegt werden. Nach dem Anlegen von ICHTHOPASTE sollte das Bein mit einer Binde oder einem Schutzverband umhüllt werden, damit die Kleidung nicht verschmutzt wird.

Empfohlene Dauer der Anwendung bei Erwachsenen und Kindern
Wechseln des Verbands je nach Bedarf; kann bis zu 7 Tage getragen werden.

Mögliche Nebenwirkungen
ICHTHOPASTE kann Nebenwirkungen verursachen, obwohl nicht jeder sie bekommt. Wurde gemeldet:
- lokale Hautreaktionen wie Hautausschlag, Rötung, Juckreiz und Brennen.

Produktverfügbarkeit

Code	Größe	Verfügbarkeit
4959	7,5cm x 6m	Karton mit 1

Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Schweden
™Marke von Evolan Pharma AB
©Evolan Pharma AB
Ausgabedatum 02/2021

ES

EVOLAN

ICHTHOPASTE®

Vendaje con pasta de zinc e ictamol

Descripción
ICHTHOPASTE es un vendaje hecho de un tejido laxo impregnado con una pasta que contiene 6,32 % de óxido de zinc BP y 2 % de ictamol BP, enrollado sobre un cuerpo de plástico. También contiene agua purificada, glicerina, gelatina (de origen porcino), cera emulsificante, fenoxietanol. Cada vendaje se presenta envuelto individualmente dentro en una bolsa de polietileno sellada, incluida en una caja de cartón.

Mecanismo de acción
ICHTHOPASTE proporciona tratamiento tópico. Sobre una úlcera venosa en la pierna, proporciona un entorno húmedo para la cicatrización de la herida, ayuda a reducir la irritación de la piel, y alivia y protege la piel circundante. No se seca durante el uso.

Indicaciones
ICHTHOPASTE está indicado para ayudar en el tratamiento de las úlceras venosas de piernas. En caso de insuficiencia venosa, este vendaje debe utilizarse debajo de un vendaje de compresión gradual.
ICHTHOPASTE también está indicado para su uso en el tratamiento de eczemas/dermatitis crónicos, en los casos en los que esté indicada la oclusión.

Contraindicaciones
No utilizar en casos conocidos de sensibilidad o alergia a cualquiera de los componentes.

Precauciones
Cuando exista insuficiencia venosa, ICHTHOPASTE deberá utilizarse debajo de un vendaje de compresión graduada, después de haber evaluado al paciente para excluir la enfermedad arterial. Con este fin, se recomienda utilizar la ecografía Doppler. El vendaje de compresión no debe utilizarse en pacientes que tengan enfermedad arterial (índice de presión tobillo-brazo <0,8) y no se recomienda utilizarlo en pacientes diabéticos con microangiopatía avanzada. **Si no se detecta la disminución del flujo arterial, se podría producir necrosis por presión, amputación o incluso la muerte. El riesgo de que un paciente tenga una patología tanto arterial como venosa aumenta con la edad.** La piel de los pacientes con úlceras en la pierna se sensibiliza fácilmente a los medicamentos tópicos, incluidos los conservantes. Se debe sospechar que existe sensibilización en los pacientes especialmente cuando la piel circundante muestra deterioro. Estos pacientes deben remitirse a un especialista para su diagnóstico, que incluye las pruebas de contacto. Una de las funciones de los vendajes oclusivos es aumentar la absorción. Por tanto, debe tenerse cuidado si se decide aplicar una preparación con retinoides, anestésicos o esteroides tópicos debajo del vendaje, ya que su absorción puede aumentar de forma considerable. Esto puede reducir la duración del efecto de un anestésico tópico, además de aumentar el riesgo de sensibilización a estas preparaciones. Para uso tópico exclusivamente. ICHTHOPASTE es un producto de un solo uso. Si se utiliza en más de un paciente, puede producirse contaminación o infección cruzada. Una vez abierto el envase, no debe conservarse el material no utilizado para aplicarlo en una fecha posterior. Antes de utilizar el producto, se debe informar a los pacientes del contenido de origen porcino (gelatina).

Instrucciones de uso
Este producto está listo para utilizarse tras extraerlo de la bolsa sellada y la envoltura. Hay dos formas de aplicar el vendaje:
1. Empezando por la base de los dedos del pie, el vendaje debe *envolverse sin apretar* alrededor del pie, el talón y alrededor de la pierna de forma espiral, hasta justo debajo de la rodilla. Después de aplicarlo, el vendaje debe alisarse y moldearse en torno a la pierna.
2. Empezando por la base de los dedos del pie, el vendaje debe *envolverse sin apretar* alrededor del pie y el talón, y después, a partir del tobillo, el vendaje debe doblarse sobre sí mismo formando un pliegue en la parte delantera de la pierna en cada vuelta. Esto debe repetirse a lo largo de toda la pierna hasta justo debajo de la rodilla. A continuación puede aplicarse un vendaje de compresión. Una vez que se ha aplicado ICHTHOPASTE, la pierna debe cubrirse con un vendaje o apósito para evitar que se ensucie la ropa.

Duración de uso recomendada en adultos y niños
Cambie el vendaje según sea necesario; puede llevarse durante un máximo de 7 días.

Posibles efectos adversos
ICHTHOPASTE puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Se ha comunicado:
- reacciones locales de la piel, tales como, sarpullido, enrojecimiento, picor y quemazón.

Disponibilidad del producto

Código	Tamaño	Disponibilidad
4959	7,5cm x 6m	Caja con 1

Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Suecia
™Marca comercial de Evolan Pharma AB
© Evolan Pharma AB
Fecha de emisión 02/2021

IT

EVOLAN

ICHTHOPASTE®

Benda all'ossido di zinco e ittiolo

Descrizione
ICHTHOPASTE è una benda costituita da tessuto a trama aperta impregnato con una pasta contenente ossido di zinco BP (6,32%) e ittiolo BP (2%) avvolto su un rocchetto in plastica. Contiene inoltre acqua purificata, glicerina, gelatina (di origine suina), cera emulsionante, fenossietanolo. Ogni benda è confezionata singolarmente in un involucro, e sigillata in un sacchetto di polietilene contenuto all'interno di una scatola di cartone.

Meccanismo d'azione
ICHTHOPASTE costituisce un trattamento locale. Fornisce un ambiente umido per la cicatrizzazione della ferita in corrispondenza dell'ulcera venosa dell'arto inferiore, è utile nella riduzione delle manifestazioni irritative, decongestiona e protegge la cute perilesionale. Non si secca durante l'uso.

Indicazioni
ICHTHOPASTE è indicato come coadiuvante nel trattamento delle ulcere venose degli arti inferiori. In presenza di insufficienza venosa, la benda con pasta dovrebbe essere impiegata sotto un bendaggio compressivo graduale.
ICHTHOPASTE è adatto anche nella gestione di eczemi o dermatiti croniche, nei casi in cui sia indicata l'occlusione.

Controindicazioni
Non utilizzare nei casi accertati di sensibilità o allergia a uno qualsiasi dei componenti.

Precauzioni
In presenza di insufficienza venosa, applicare ICHTHOPASTE effettuando un bendaggio a compressione graduale, dopo avere esaminato il paziente per escludere un'arteriopatia. A tale scopo si raccomanda l'impiego di ultrasonografia Doppler. Non effettuare il bendaggio compressivo in pazienti con arteriopatia (ABPI < 0,8); se ne sconsiglia l'uso nei pazienti diabetici con microvasculopatia in stadio avanzato. **La mancata diagnosi di un ridotto flusso arterioso può portare alla necrosi da pressione, all'amputazione e persino alla morte. Il rischio di un'arteriopatia in associazione alla patologia venosa aumenta con l'età del paziente.** La cute dei pazienti affetti da ulcere degli arti inferiori è particolarmente sensibile ai trattamenti topici, compresi i conservanti. Si deve sospettare la sensibilizzazione soprattutto nei pazienti che presentano un deterioramento della cute perilesionale. Tali pazienti devono essere inviati allo specialista per l'esecuzione di patch test a fini diagnostici. Una delle funzioni del bendaggio occlusivo è aumentare l'assorbimento. Si deve dunque fare attenzione, qualora si decida di applicare sotto il bendaggio preparazioni topiche a base di steroidi, anestetici o retinoidi, dal momento che il loro assorbimento può aumentare notevolmente. Ciò può ridurre la durata dell'effetto degli anestetici locali, oltre che aumentare il rischio di sensibilizzazione a tali preparazioni. Solo per uso topico. ICHTHOPASTE è un prodotto esclusivamente monouso. Se utilizzato su più di un paziente, potrebbero verificarsi contaminazioni crociate o infezioni. Una volta aperto il confezionamento, il materiale non utilizzato non deve essere conservato per essere applicato in un secondo momento. Prima dell'uso i pazienti devono essere informati del contenuto di origine suina (gelatina).

Istruzioni per l'uso
Una volta estratto dal sacchetto sigillato e dall'involucro, il prodotto è pronto per l'uso.
Il bendaggio si può applicare in due modi:
1. Partendo dalla base delle dita del piede, *avvolgere senza stringere* la benda attorno al piede, al tallone e alla gamba procedendo a spirale, fin sotto il ginocchio. Una volta applicata, fare aderire e modellare la benda attorno alla gamba.
2. Partendo dalla base delle dita del piede, *avvolgere senza stringere* la benda attorno al piede e al tallone e quindi, mentre si procede dalla caviglia, a ogni giro ripiegare la benda su se stessa sul lato anteriore della gamba. Ripetere per tutta la gamba fin sotto il ginocchio. In seguito si può applicare un bendaggio compressivo. Una volta applicato ICHTHOPASTE, coprire la gamba con una benda o una medicazione per evitare di sporcare gli indumenti.

Durata d'impiego raccomandata per adulti e bambini
Il bendaggio va cambiato secondo le necessità, può rimanere in sede fino a 7 giorni.

Possibili effetti collaterali
ICHTHOPASTE può causare effetti collaterali, sebbene non tutte le persone li manifestino.
Sono state segnalate:
- reazioni cutanee locali come eruzione cutanea, arrossamento, prurito e bruciore.

Confezioni disponibili

Codice	Dimensioni	Confezione
4959	7,5cm x 6m	Scatola da 1 bendaggio

Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Svezia
™Marchio di Evolan Pharma AB
© Evolan Pharma AB
Data di revisione 02/2021

DK

EVOLAN

ICHTHOPASTE®

Zinkpasta og ichthammol-bandage

Beskrivelse
ICHTHOPASTE er en bandage, der er fremstillet af gazebind med åben vævning, og som er imprægneret med en pasta, der indeholder 6,32% zinkoxid BP og 2% ichthammol BP, som er rullet på en kerne af plast. Den indeholder desuden renset vand, glycerin, gelatine (porcin indhold), emulgeret voks, phenoxyethanol. Hver bandage leveres i et omslag og er forseglet i en polythenpose i en papkarton.

Virkemåde
ICHTHOPASTE anvendes til topisk behandling. Den giver et fugtigt sårhelingsmiljø over et venøst bensår, er med til at reducere hudirritation og lindrer og beskytter den omgivende hud. Bandagen tørrer ikke ud under brug.

Indikationer
ICHTHOPASTE er velegnet ved behandling af venøse bensår. I tilfælde af venøs insufficiens skal pastabandagen anvendes under gradueret bandagering med kompression.
ICHTHOPASTE er også egnet til anvendelse ved behandling af kronisk eksem/dermatitis, hvor okklusion er indiceret.

Kontraindikationer
Må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed eller allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler
I tilfælde af venøs insufficiens skal ICHTHOPASTE anvendes under gradueret bandagering med kompression, efter at patienten er undersøgt for at udelukke arterielt sygdom. Anvendelse af Doppler-ultralyd anbefales til dette formål. Bandagering med kompression bør ikke anvendes til patienter med arteriel sygdom (ABPI <0,8) og anbefales ikke til anvendelse til diabetespatienter med fremskreden småkarssygdom. **Hvis nedsat arteriel gennemstrømning ikke opdages, kan det medføre trykneekrose, amputation eller endda dødsfald.**
Risikoen for, at en patient både har arteriel og venøs sygdom, stiger i takt med alderen. Huden på patienter med bensår sensibiliseres nemt over for topiske præparater, herunder konserveringsmidler. Muligheden for sensibilisering hos patienterne skal overvejes, især i tilfælde af forringelse af den omgivende hud. Sådanne patienter skal overlades til diagnosticering med patch-test hos en specialist. En af okklusionsbandagens funktioner er at øge absorptionen. Der skal derfor udvises forsigtighed, hvis det besluttes at anvende topiske steroider, anæstetika eller retinoide præparater under bandagen, da disse midlers absorption kan blive øget markant. Dette kan føre til kortere varighed af virkningen af et topisk anæstetikum, udover at det øger risikoen for sensibilisering over for disse præparater. Kun til topisk anvendelse. ICHTOPASTE er et engangsprodukt. Anvendelse af samme produkt på mere end en patient, kan lede til kontamination eller infektion. Når emballagen er åbnet/brudt, må ubrugt materiale ikke gemmes for brug på et senere tidspunkt. Patienter bør informeres om porcin indhold (gelatine), før brug.

Instruktioner vedrørende anvendelsen
Dette produkt er klar til brug, når det er fjernet fra den forseglede pose og omslaget. Bandagen kan påføres på to måder:
1. Med start ved basis af tæerne skal bandagen *omvikles løst* omkring fod, hæl og ben i et spiralmønster til lige under knæet. Når bandagen er påført, skal den udglattes og formes omkring benet.
2. Med start ved basis af tæerne skal bandagen *omvikles løst* omkring fod og hæl. Derefter skal bandagen - mens den omvikles fra anklen - bukkes tilbage på sig selv i en fold foran på benet for hver drejning. Dette gentages op ad benet, indtil bandagen når til lige under knæet. Bandagering med kompression kan foretages derefter. Når ICHTHOPASTE er blevet påført, skal benet dækkes af en bandage eller forbinding for at forhindre, at tøjet bliver snavset.

Anbefalet varighed af brug til voksne og børn
Bandagen skiftes efter behov, kan bæres i op til 7 dage.

Mulige bivirkninger
ICHTHOPASTE kan give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Følgende bivirkninger er indberettet:
- lokale hudreaktioner som f.eks. udslæt, rødme, kløe og brændende fornemmelse.

Produkt-/pakningsstørrelser

Kode	Produktstr.	Pakningsstr.
4959	7,5cm x 6m	Karton med 1

Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Sverige
™Varemærke tilhørende Evolan Pharma AB
© Evolan Pharma AB
Dato for udgivelse 02/2021

NO

EVOLAN

ICHTHOPASTE®

Bandasje med sinkpasta og ichthammol

Beskrivelse
ICHTHOPASTE er en bandasje laget av åpenvevd tekstil impregnert med en pasta inneholdende 6,32 % sinkoksid (BP-grad) og 2 % ichthammol (BP-grad) rullet i en plastisk kjerne. Den inneholder også renset vann, glyserin, gelatin (svin), emulgerende voks og fenoksyetanol. Hver bandasje leveres i en innpakning og forseglet i en polytenpose i en pappeske.

Virkemåte
ICHTHOPASTE gir topisk behandling. Den sørger for et fuktig sårtilhelingsmiljø over venøse bansår, bidrar til å redusere hudirritasjon og lindrer og beskytter den omkringliggende huden. Den tørker ikke ut under bruk.

Indikasjoner
ICHTHOPASTE er indisert til bruk ved venøse bensår. Ved venøs insuffisiens, bør pastabandasjen brukes under gradert kompresjonsbandasje. ICHTHOPASTE er også egnet til bruk ved håndtering av kronisk eksem/dermatitt, der okklusjon er indisert.

Kontraindikasjoner
Må ikke brukes ved kjent overfølsomhet eller allergi overfor noen av ingrediensene.

Forsiktighetsregler
ICHTHOPASTE skal brukes ved gradert kompresjonsbandasjering der det foreligger venøs insuffisiens etter at pasienten først er blitt vurdert for å utelukke arterielle sykdommer. Til dette formålet anbefales det å bruke dopplerultralyd.
Kompresjonsbandasjering skal ikke utføres på pasienter med arterielle sykdommer (ankel/arm-indeks < 0,8), og den er ikke anbefalt for bruk på diabetespasienter med avansert småkarsykdom. **Manglende påvisning av redusert arteriell gjennomstrømning kan medføre trykknekrose, amputasjon eller til og med død. Risikoen for at en pasient har arteriell så vel som venøs sykdom økes med alderen.** Huden på pasienter med bensår kan lett bli sensibilisert mot topiske medikamenter, inkludert konserveringsmidler. Det skal fattes mistanke om sensibilisering hos pasienter, spesielt når den omkringliggende huden er forverret. Slike pasienter skal henvises til en spesialist for diagnostisering, inkludert lappetesting. En av funksjonene til okklusive bandasjer er å øke absorpsjonen. Derfor skal det utvises forsiktighet ved påføring av topiske steroid-, anastesi- eller retinoidpreparater under bandasjen da risikoen for at de absorberes kan være svært stor. Dette kan forårsake kortere effektvarighet av et topisk anestesiprodukt i tillegg til økning i risikoen for sensibilisering mot disse preparatene. Kun til topisk bruk. ICHTHOPASTE er et produkt kun til engangsbruk. Bruk på mer enn én pasient kan medføre krysskontaminering eller infeksjon. Så snart pakningen er åpnet, må du ikke ta vare på ubrukt materiale for påføring på en senere dato. Pasienter bør få beskjed om innholdet av svin (gelatin) før bruk.

Bruksanvisning
Dette produktet er klart til bruk når det er tatt ut av den forseglede posen og innpakningen. Bandasjen kan påføres på to måter:
1. Begynn under tærne og *surr bandasjen løst* rundt foten, hælen og benet opp til like under kneet. Når bandasjen er påført, skal den glattes ut og formes rundt benet.
2. Begynn under tærne og *surr bandasjen løst* rundt foten og hælen, og mens den surres fra ankelen skal bandasjen brettes tilbake over seg selv i en fold foran på benet hver gang den surres rundt. Dette skal gjentas opp til benet like under kneet. Kompresjonsbandasjering kan så utføres. Så snart ICHTHOPASTE er påført, skal benet dekkes av en bandasje slik at ikke klærne blir tilsmusset.

Anbefalt varighet for bruk på voksne og barn
Skift bandasjen ved behov. Kan brukes i opptil 7 dager.

Mulige bivirkninger
ICHTHOPASTE kan gi bivirkninger, men ikke alle får dem.
Har blitt rapportert:
- lokale hudreaksjoner som utslett, rødhet, kløe og en brennende følelse.

Produktets tilgjengelighet

Kode	Størrelse	Tilgjengelighet
4959	7,5cm x 6m	Eske med én

Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, Box 120, 182 12 Danderyd, Sverige
™Varemerke tilhørende Evolan Pharma AB
© Evolan Pharma AB
Utgivelsesdato 02/2021

1089-3