

Désignation	Dexyane	Code	337165	 NOTRE SEULE LIMITÉ EST VOTRE IMAGINATION
Format à plat	150 x 235	Format plié	150 x 20	
Impression R°	299-2153-Rubine Red	Impression V°	299-2153-Rubine Red	
Papier	50g	Date	31/10/2023	

V.RICHARD_EXE DEF - 10/10/23 | 337165_PROS DEX DM PALP 15ML 9L DU • FT À PLAT 235X150 - PLIÉ 20X150 MM

Pantone® 299 C Pantone® 2153 C Pantone® 214 C

NO DEXYANE MED Palpebral
BEHANDLING AV ØYELOKK
VED ATOPISK EKSEM ELLER KONTAKTEKSEM
MEDISINSK UTSTYR

Spedbarn fra 3 måneder, barn og voksne

Hvanneholder DEXYANE MED Palpebral?

WATER (AQUA), GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BUTYLENE GLYCOL, POLYSORBATE 60, GLYCERYL STEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, BEESWAX, PEG-100 STEARATE, 10-HYDROXYDECENOIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, CETYL ALCOHOL, CITRIC ACID, GLYCIRRHETIC ACID, POLYACRYLATE-13, POLYSORBATE 20, SCLEROTIUM GUM, SORBITAN SOSTEARATE.

Hvilke tilfeller er DEXYANE MED Palpebral godkjent?

DEXYANE MED Palpebral er godkjent til behandling av eksem på øyelokk, atopisk eksem og kontakteksem. Disse eksemstilstandene kjennetegnes ved endringer i hudenbarren med en høy risiko for reaksjon (tornitt, irritasjon, klok) på allergener og irritante stoffer.

Hvordan virker DEXYANE MED Palpebral?

1. LUNDRER og børger øyeblikkelig.
2. GJENSKAPER den endre hudbarren og reduserer torphet takket være en kombinasjon av glyserin, shasmør og triglyserider.

3. LINDRER klok og smerte, reduserer graden av inflammatoriske symptomer (rodet og irritasjon).

4. BESKYTTER huden med en semi-økklusiv film, som danner av kremens galaktiske formel beriket med returlig polyakrylat.

5. BEGRENSER bakterien adhesjon (S. aureus er potensielt involvert i superinfeksjonen av lesonen).

Påvist klinisk virking: DEXYANE MED Palpebral forbeder behandlingen av øyelokkene:

- Kan brukes alene som forsegingsbehandling av milde utbrudd: Behandler lesoner og lindrer smerte.

- I kombinasjon med topikale kortikosteroider mot moderate eller alvorlige eksemutbrudd: Forbedrer effekten og gir raskere lindring for pasienten etter kun 3 dager.

- Som oppfølging på topikale kortikosteroider, forhindrer nye eksemutbrudd.

Kremen føles behagelig på huden, de fleste ikke klikket, og har en ultrahydrende og beskyttende ge-klem tekstur som gjør det enkelt for pasienten å fullføre behandlingen. Eksemhud gjenvinner sin smidighet og mykhet.

Husk testet tolerance. Uten kortison, uten parfyme og testet for nikkel.

Hvordan bruker DEXYANE MED Palpebral?

Påfør et tynt lag 2 ganger daglig direkte på det inflammatoriske eksemet på øyelokket med en ren finger og unngå kontakt med øyet. Kun til utvidig bruk. Kan anvendes alene, i kombinasjon med, eller etter bruk av topikale kortikosteroider. Når det kombineres med et lokalt kortikosteroid, påfør kortikosteroidet først og vent minst innen 15 minutter før du påfører DEXYANE MED Palpebral. Spør legen din om råd for bruk av DEXYANE MED Palpebral med topikale kortikosteroid som er foreskrevet for spedbarn 3 måneder og barn. Hvis symptomene ikke forsvinner etter et ukers behandling, kontakt lege.

Når skal DEXYANE MED Palpebral ikke anvendes?

Skal ikke brukes ved allergi mot en av ingrediensene. I mangl av data, skal den ikke brukes på gravide eller ammende kvinner.

Hvilke forholdsregler bør tas ved bruk av DEXYANE MED Palpebral?

Vel årdig! Etter bruk av DEXYANE MED Palpebral, kontakt med øyne. Oppbevar ute til gjengang. Unngå å kremen kommer direkte i kontakt med øynene. Oppbevar ute til gjengang. Bruk ikke før øyeblikket når du pôrferingstestedet (brennende eller prikkende følelse, roder, klok, torphet...) forventes hos personer med eksem fordi disse pasientene har en endret hudbarriere. Det er mulig å observere en midlertidig forvering av eksem. Hvis ingen bedring eller ved forvering av eksemssymptomer innen 8 til 10 dager, kontakt lege. Hvis du er i tvil og/eller opplever usønske bivirkninger knyttet til bruken av dette produktet, kontakt lege. Hvis du har grunn til å tro at det er oppstått en alvorlig hendelse i forbindelse med bruken av dette produktet, bes du rapportere det til din nasjonale myndighet og til produsenten.

15 ml tube.

Revideringsdato for dette dokument: 05/2023

Medisinsk utstyr CE merket i 2019

ديكسيان ميد بالبيبرال
 الكريم لعلاج اكيريا الجفون.
 التالية أو التماضية
 مستلزم طبي

الرضع من عمر 3 أشهر وما فوق - الأطفال - البالغون



DEXYANE MED Palpebral
RAVI SILMALAUGUDELE ATOPIILISE
VÕI KONTAKTEKSEMI KORRAL
MEDITSIINISEADE

Imikud olates 3. elukuust - lapsed - täiskasvanud

Mida DEXYANE MED Palpebral sisalda?

WATER (AQUA), GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BUTYLENE GLYCOL, POLYSORBATE 60, GLYCERYL STEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, BEESWAX, PEG-100 STEARATE, 10-HYDROXYDECENOIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, CETYL ALCOHOL, CITRIC ACID, GLYCIRRHETIC ACID, POLYACRYLATE-13, POLYSORBATE 20, SCLEROTIUM GUM, SORBITAN SOSTEARATE.

ما هي دواعي استخدام كريم ديكسان ميد بالبيبرال؟

يوصف ديكسان ميد بالبيبرال كريم لعلاج اكيريا الجفون التالية أو التماضية.

تتميز هذه الأكيريا بغير حاجز الجلد مع زيادة حظر ثغرات (جفاف، تهيج، حكة) بسبب التسوس والتهابات.

ما هي آثار جانبية كريم ديكسان ميد بالبيبرال؟

يعطي ديكسان ميد بالبيبرال تطهيرًا على الفور وخفيف من الاحتكاك.

ويعد حاجر الجلد الواقي المتغير ويوضح المفاجئ ترطيب من الغليسيرين وزيادة الشفافية والتلألق.

يُبقي الكفة والأكلام، وغافل عن طرق تشكيل طبقة سطحية تُعيق تكوين القاثيس، القنة يُعدّه الماء المائي.

يُخفِّف من التهابات الكثيرة التي تحدث في العين.

وتحافظ على إمدادات الماء المائي التي تحيط بالعين.

ويحسن من فاعلية المكونات المائية التي تحيط بالعين.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

يُخفِّف من تهيج الكروتيكوتريستيرويدات الموضعية بعد 3 أيام فقط.

FR DEXYANE MED Palpébral
TRAITEMENT DES ECZÉMAS DES PAUPIÈRES,
ATOPIQUES OU DE CONTACT

DISPOSITIF MÉDICAL

Bébés à partir de 3 mois, enfants, adultes

Que contient DEXYANE MED Palpébral ?

WATER (AQUA), GLYCERIN, CAPRYLYL/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BUTYLENE GLYCOL, POLYSORBATE 60, GLYCERYL STEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, BEESWAX, PEG-100 STEARATE, 10-HYDROXYDECENOIC ACID, CAPRYLIC GLYCOL, CETYL ALCOHOL, CITRIC ACID, GLYCIRRHETINIC ACID, POLYACRYLATE-13, POLYSOBUTENE, POLYSORBATE 20, SCLEROTIUM GUM, SORBITAN ISOSTEARATE.

Dans quel cas DEXYANE MED Palpébral est indiqué ?

DEXYANE MED Palpébral est indiqué dans le traitement des eczémas des paupières, atopiques ou de contact. Ces eczémas sont caractérisés par une barrière cutanée altérée avec un risque accré de réactions (sécheresse, irritations, démeangéaisons) aux allergènes et agents irritants.

Comment fonctionne DEXYANE MED Palpébral ?

1. SOULAGE immédiatement et décongestionne.
2. RESTAURE la barrière cutanée altérée et corrige la sécheresse grâce à l'association de glycerine, beurre de karité et triglycérides.
3. APAISE les démeangéaisons et la douleur, diminue les rougeurs et les irritations.
4. PROTEGE la peau en formant un film semi-occlusif de surface formé par sa galénique riche en polyacrylate naturel.
5. LIMITÉ l'adhésion bactérienne (*S. aureus* potentiellement impliquée dans la surinfection des lésions).

Son efficacité clinique a été démontrée: DEXYANE MED Palpébral améliore la prise en charge de l'eczème des paupières:

- Seul en 1^{re} intention sur les lésions en poussées légères : Traite les lésions et apaise la douleur.
- En association aux democorticoïdes sur les lésions en poussées modérées à sévères : Accélère leur efficacité pour soulager plus rapidement les patients dès 3 jours.
- En relais des democorticoïdes, limite la réapparition des lésions.

Pour garantir une bonne observance, sensation plaisir s'étale facilement et ne colle pas. Les patients présentent des lésions retrouvent souplesse et confort. Tolérance testée clairement. Ne contient ni cortisone, ni parfum, nickel-testé.

Comment utiliser DEXYANE MED Palpébral ?

Appliquer 2 fois par jour en fine couche directement sur les lésions inflammatoires des paupières avec un doigt propre, en évitant tout contact avec l'œil. Usage externe seulement. A utiliser seul, en association et/ou en relais des democorticoïdes. En cas d'association avec un democorticoïde, appliquer le democorticoïde et attendre quelques minutes (5-15 minutes) avant d'appliquer DEXYANE MED Palpébral. Demander conseil à votre médecin pour l'utilisation de DEXYANE MED Palpébral avec le democorticoïde prescrit chez les bébés ≥ 3 mois et les enfants. Si les symptômes ne disparaissent pas après 3 semaines de traitement, consulter un médecin.

Quelles sont les contre-indications à l'utilisation de DEXYANE MED Palpébral ?

Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des composants. En l'absence de données, ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante.

Quelles sont les précautions à prendre pour utiliser DEXYANE MED Palpébral ?

En cas de réactions allergiques, consulter un médecin. Eviter tout contact avec les yeux. Tenir éloigné de la portée des enfants. Bien renfermer le tube après utilisation. Des réactions cutanées au site d'application (sensation de brûlure, picotements, érythèmes, démeangéaisons, sécheresse,...) sont attendues chez les patients avec de l'eczème car ces patients présentent une barrière cutanée altérée. Il est possible d'observer une aggravation temporaire de l'eczème. En l'absence d'amélioration ou en cas d'aggravation des symptômes de l'eczème dans les 8 à 10 jours, consulter un médecin. En cas de douleur et/ou effets indésirables liés à l'utilisation du produit, consulter un médecin. Si vous avez des raisons de croire qu'un incident grave est survenu en lien avec l'utilisation du dispositif, veuillez le reporter à l'autorité nationale et au fabricant.

Tube 15ml

Date de révision : 05/2023

Année d'apposition du marquage CE : 2019

EN DEXYANE MED Palpebral
TREATMENT FOR EYELID, ATOPIC OR CONTACT
ECZEMA

MEDICAL DEVICE

Babies from 3 months, children and adults

What does DEXYANE MED Palpébral contain ?

WATER (AQUA), GLYCERIN, CAPRYLYL/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BUTYLENE GLYCOL, POLYSORBATE 60, GLYCERYL STEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, BEESWAX, PEG-100 STEARATE, 10-HYDROXYDECENOIC ACID, CAPRYLIC GLYCOL, CETYL ALCOHOL, CITRIC ACID, GLYCIRRHETINIC ACID, POLYACRYLATE-13, POLYSOBUTENE, POLYSORBATE 20, SCLEROTIUM GUM, SORBITAN ISOSTEARATE.

In which cases is DEXYANE MED Palpébral indicated ?

DEXYANE MED Palpébral is indicated for the treatment of eyelid, atopic, or contact eczema. These eczemas are characterized by an altered skin barrier with a high risk of reaction (dryness, irritations, itching) to allergens and irritant agents.

How does DEXYANE MED Palpébral work ?

1. Instantly RELIEVES and decongests.
 2. RESTORES the altered skin barrier and corrects dryness with a combination of glycerin, shea butter and triglycerides.
 3. SOOTHES itching and pain, reduces redness and irritation.
 4. PROTECTS skin with a semi-occlusive surface film formed by its galenic formula, enriched with natural polysaccharide.
 5. LIMITS bacterial adhesion (*S. aureus* potentially involved in the superinfection of lesions).
- Proven clinical efficacy: DEXYANE MED Palpébral improves the treatment of eyelid eczema:
- Alone as a first-line treatment for mild flare-up lesions: treats lesions and soothes pain.
 - In combination with topical corticosteroids for moderate to severe flare-up lesions: improves their efficacy to provide faster patient relief, after only 3 days.
 - As a follow-up to topical corticosteroids, limits the recurrence of lesions. The cream does not stick, and spreads on easily, which encourages good patient compliance. Eczematic skin regains suppleness and comfort. Clinically tested tolerance. Cortisone-free, fragrance-free and nickel-tested.

How should DEXYANE MED Palpébral be used ?

Apply twice a day a thin layer directly to inflammatory eczema eyelid lesions with a clean finger, avoiding any contact with the eye. For external use only. Can be used as stand-alone treatment, in combination with or following topical corticosteroids. When combined with a topical corticosteroid, apply the topical corticosteroid and wait a few minutes (5-15 minutes) before applying DEXYANE MED Palpébral. Ask your doctor for advice for the use of DEXYANE MED Palpébral with the topical corticosteroid prescribed for babies ≥ 3 months and children. If the symptoms are not resolved after 3 weeks of treatment, consult a doctor.

What are the contraindications to the use of DEXYANE MED Palpébral?

Do not use in case of allergy to one of the ingredients. In the absence of available data, do not use on pregnant or breastfeeding women.

What precautions should be taken when using DEXYANE MED Palpébral?

In case of allergic reaction, consult a doctor. Avoid direct contact with eyes. Keep out of reach of children. Close the tube carefully after use. Cutaneous application site reactions (burning sensation, stinging, erythema, itching, dryness...) are expected in subjects with eczema because these subjects present an altered skin barrier. It is possible to observe a temporary aggravation of eczema. If no improvement or in case of worsening of eczema symptoms within 8 to 10 days, consult a doctor. If in any doubt and/or any undesirable side effects linked to the use of this product, consult a doctor. If you have reason to believe that a serious incident occurred linked to the use of this product, please report it to your national authority and to the manufacturer.

15 ml tube

Revision date: 05/2023

CE mark year: 2019

LT DEXYANE MED Palpebral
PRIEMONĖ AKIŲ VOKŲ ATOPINIAMIR
KONTAKTINIŪ DERMATITULENGVINTI
MEDICINOS PRIEMONĖ

Kūdikiams nuo 3 mėn., vaikams ir suaugusiems.

What does DEXYANE MED Palpébral contain?

WATER (AQUA), GLYCERIN, CAPRYLYL/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BUTYLENE GLYCOL, POLYSORBATE 60, GLYCERYL STEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, BEESWAX, PEG-100 STEARATE, 10-HYDROXYDECENOIC ACID, CAPRYLIC GLYCOL, CETYL ALCOHOL, CITRIC ACID, GLYCIRRHETINIC ACID, POLYACRYLATE-13, POLYSOBUTENE, POLYSORBATE 20, SCLEROTIUM GUM, SORBITAN ISOSTEARATE.

Kokias atvejais naudojamas DEXYANE MED Palpébral?

DEXYANE MED Palpébral skirtas akinių vokų atopiniam ir kontaktiniui dermatitui lengvinti. Pastrėsiant dermatitą, kiekiasi apsauginis odos barijeras, todėl oda labiau reaguoja (tampa sausa, sudirginta, niežta) į alergenus ir dirginančias medžiagas.

Kaip DEXYANE MED Palpébral veikia?

1. Gretai MALSINA simptomas ir ramina odą.
2. Suderėty esantis glicerol, apsaugina vokus iš aliejuų ar triglyceridų derinys ATKURIA paktusiskumą mažinant priemonę, odos barijerą ir drekiama susisūdingoja.
3. MAZINA niežtų ir skausmų, slopiniai paradumai ir sudirgimai.
4. Galinėmis suderėties priemonės su natūralais polisacharidais APSAUGO odą, padengdama jo paviršius pūsiu plauðiui slinkti.
5. RIBOJA bakiųjų dalmasišimus (S. aureus, kuri galima uveliai antrinę pažeistę vlietį infekciją).

Irodyti: klinikinių veiksmingumas: DEXYANE MED Palpébral kremas padeda lengvinėti akinių vokų dermatito simptomus:

- Naudojimas vienais kai pagrindinei apsauginei diskomfortui, esant odos pažeidimams: mažina pažeidimus ir mažina skausmą.
- Naudojamas kartu su vietiniais kortikosteroidais, esant vidutinio sunkumo ar sunikiems pažeidimams: sustiprina jų veikimą ir gretesnį pagerejimą iki 3 dienų.
- Naudojamas po gydymo kortikosteroidais, saugo nuo pakartotinio pažeidimo atsirašymo.

Kremas yra nelipiosi tekstūros, lengvai pasiskirsto ant odos, gerai tolenuojamas pacientų. Atkuriama dermatito pažeistos odos elastinumas ir komforto požiūjis.

Klinikinių tyrimų patikintas tolerancija. Be kortizono ir kvapiųjų medžiagų. Atleisti tyrimai dėl nikelio.

Kaip naudoti DEXYANE MED Palpébral?

Švari pristėpti ploniu slinkniu 2 kartus per dieną tiesiai ant uždegimino dermatito pažeistų akinių vokų. Venkite pakartomis išnaudoti. Naudokite tik išskirtinai. Priemonę galima naudoti vieną arba kartais su vietiniais kortikosteroidais, arba po gydymo. Kai naudojate kartu su vietiniais kortikosteroidais, pirmiausia teipkite vietinius kortikosteroidus, palauke keliąs minutės (5-15 minučių) ir tada teipkite DEXYANE MED Palpébral. DEXYANE MED Palpébral naudojimo kartu su vietiniais kortikosteroidu, skirtu kūdikiams nuo 3 mėn. ir vaikams, pastarkite su gydymu.

Jei per 3 savaites simptomas nepareinė, kreipkitės į gydytoją.

Jei per 3 savaites simptomas nepareinė, kreipkitės į gydytoją.

Kokios yra DEXYANE MED Palpébral kontraindikacijos?

Nenaudoti, jei yra alergija bei kūnai yra sudedami medžiagų. Nenaudoti nėšomos ar kritimi matinaminioms moterims, nės duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka.

Kokią atsargumo priemonių reikia imtis naudojant DEXYANE MED Palpébral?

Jei atsirauna alerginė reakcija, kreipkitės į gydytoją. Venkite tiesioginiu patiekimo į akis. Laikejite valkams neprilegiamą vlietį. Po naudojimo tubelė sandariai uždirkite. Pacientams, sergantiams dermatitu, gali pažeistų salutinės reakcijos (deginimai, pojūtis, perstengimai, eritema, niežtas, sausumas ir kt.), nės yra odos barijeras yra pakitus. Galimas laikinas dermatito pažeimimas. Jei per 8-10 dienų būtė nepergebię arba didelio simptomų pasunkėja, kreipkitės į gydytoją. Jei kyla abejonė, arba atsiranda bet kokis neapgaudėjamas salutinis poeivis, susiję su šios priemonės naudojimu, kreipkitės į gydytoją. Jei turite pagrūtinį motyvą, kad neapgaudėjame būtęs suteiktas šios priemonės naudojimas, apie šią savaitę praneškite vietus institucijai ir gamintojui.

15 ml tubelė

Peržiūros data: 05/2023

CE ženklinimo metai: 2019

DA DEXYANE MED Palpebral
BEHANDLING AF ØJENLÅGS-, ATOPISK
ELLER KONTAKTNØG
MEDICINSK UDSTYR

Spædbørn fra 3 måneder, børn og voksne

Hvad indeholder DEXYANE MED Palpebral?

WATER (AQUA), GLYCERIN, CAPRYLYL/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BUTYLENE GLYCOL, POLYSORBATE 60, GLYCERYL STEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, BEESWAX, PEG-100 STEARATE, 10-HYDROXYDECENOIC ACID, CAPRYLIC GLYCOL, CETYL ALCOHOL, CITRIC ACID, GLYCIRRHETINIC ACID, POLYACRYLATE-13, POLYSOBUTENE, POLYSORBATE 20, SCLEROTIUM GUM, SORBITAN ISOSTEARATE.

I hvilke tilfælde er DEXYANE MED Palpebral anvendeligt?

DEXYANE MED Palpebral er godkendt til behandling af eksem på øjenlår, atopisk eksem og kontaktøje. Disse ekskemstændte er karakteriserede ved ændringer i hudenbarrieren med en høj risiko for reaktion (torhed, irritationer, klo) på allergener og irritante stoffer.

Hvordan virker DEXYANE MED Palpebral afsejtet?

DEXYANE MED Palpebral er godkendt til behandling af eksem på øjenlår, atopisk eksem og kontaktøje. Disse ekskemstændte er karakteriserede ved ændringer i hudenbarrieren med en høj risiko for reaktion (torhed, irritationer, klo) på allergener og irritante stoffer.

Kako djeluje DEXYANE MED Palpebral?

1. Trenutno UBLAZIVA i smanjuje otoklin.
2. OBNAVLJAVA promjenjuju kožni barjeru i ublažava suhoću jer sadrži glikozid, polisorbat 60, gliceryl stearat, butirospermum parkii (shea) butter, cetyl alkohol, citric acid, glycirrhetic acid, poliacrylate-13, polisobutene, polisorbat 20, sclerotium gum, sorbitan isostearat.

U pojmu slajčanje je indiciran DEXYANE MED Palpebral?

DEXYANE MED Palpebral indiciran je za liječenje atopiskog ili kontaktognog ekzema na očnim kapicama. Stanje ekzema karakterizira promjenjena kožna bariera s visokim rizmom za reakcije (suhota, nadražnost, svrbež, na alegene i nadražujuće tvori.

Kako djeluje DEXYANE MED Palpebral?

1. Trenutno UBLAZIVA i smanjuje otoklin.
2. OBNAVLJAVA promjenjuju kožni barjeru i ublažava suhoću jer sadrži glikozid, polisorbat 60, gliceryl stearat, butirospermum parkii (shea) butter, cetyl alkohol, citric acid, glycirrhetic acid, poliacrylate-13, polisobutene, polisorbat 20, sclerotium gum, sorbitan isostearat.

U pojmu slajčanje je indiciran DEXYANE MED Palpebral?

DEXYANE MED Palpebral indiciran je za liječenje atopiskog ili kontaktognog ekzema na očnim kapicama. Stanje ekzema karakterizira promjenjena kožna bariera s visokim rizmom za reakcije (suhota, nadražnost, svrbež, na alegene i nadražujuće tvori.

Kako djeluje DEXYANE MED Palpebral?

1. Trenutno UBLAZIVA i smanjuje otoklin.
2. OBNAVLJAVA promjenjuju kožni barjeru i ublažava suhoću jer sadrži glikozid, polisorbat 60, gliceryl stearat, butirospermum parkii (shea) butter, cetyl alkohol, citric acid, glycirrhetic acid, poliacrylate-13, polisobutene, polisorbat 20, sclerotium gum, sorbitan isostearat.

Obnovljiva kremica DEXYANE MED Palpebral?

Dokazana klinička djelotvornost: DEXYANE MED Palpebral poboljšava liječenje ekzema na očnim kapicama:

- Samostalno kao prva linija liječenja za blaže razubukale lezije: liječi lezje i umiruje bol.
- U kombinaciji s lokalnim kortikosteroidima za umjerjene do teže razubukale lezije: poboljšava njihovu djelotvornost, pruža brže ublažavanje polenskih tegoba, nakon samo 3 dana.
- Nakon liječenja lokalnim kortikosteroidima, ograničava ponovnu pojavu ležja.

Krema foles behageljig po huden, da foles ikkstret og har en ultrahydrende og beskyttende gel-creme tekstur, der gør det nemmere for patienten af fuldføre behandlingen. Eksemhud gevindrer sin smidighed og blodhæd.

Kremni opfølgning af DEXYANE MED Palpebral?

Må ikke anvendes i tilfælde af allergi over for en af ingredienser. Grundet manglen på data, må den ikke anvendes til gravide eller ammende kvinder.

Hvornår må DEXYANE MED Palpebral ikke anvendes?

Må ikke anvendes i tilfælde af allergi over for en af ingredienser. Grundet manglen på data, må den ikke anvendes til gravide eller ammende kvinder.

Kontrolla døgnviske reaktioner af DEXYANE MED Palpebral?

Ne primjeniti u slučaju alergije na neki od sastojaka. Zbog nedostatka podataka, ne primjeniti u slučaju alergije na neki od sastojaka. Zbog nedostatka podataka, ne primjeniti u slučaju alergije na neki od sastojaka.

Kontraindikacije za primjenu DEXYANE MED Palpebral?

Ne primjeniti u slučaju alergije na neki od sastojaka. Zbog nedostatka podataka, ne primjeniti u slučaju alergije na neki od sastojaka.

Koje mjerne opreme treba poduzeti kod primjene DEXYANE MED Palpebral?

U slučaju alergijske reakcije, obratite se liječniku. Izbjegavati izravn i dodir s očima. Cuvati izvan dohvata djece. Nakon primjene tubu pdajivo zatvoriti. Kožne reakcije na mjestu primjene (osjećaj žarenja, pečanje, crvenilo, svrbež, suhoća...) očekivane su kod osoba koje imaju eksem na mjestu primjene kožnog barjera. Moguće je primjetiti privremeno pogorjevanje ekzema. Ako nema poboljšanja ili u slučaju pogorjevanja simptoma ekzema u roku do 8 do 10 dana, obratite se liječniku. U slučaju bilo kakvih nedoumica/ili bilo kakvih nepoželjnih događaja povezanih s primjenom ovog proizvoda, obratite se liječniku. Ako imate razloga vjerovati kako se dogodio ozbiljan stenični događaj povezan s primjenom ovog proizvoda, molimo prijavite to nacionalnom nadležnom tijelu i proizvođaču.

Tuba od 15 ml

Datum revizije: 05/2023

Godina CE oznake: 2019