

AcidDuo
Purutablet

LÄÄKINNÄLLINEN LAITE CE0426

**VÄHENTÄÄ MAHANSIÄLLÖN TAKAISINVIRTAUSTA
LIEVITÄÄ LIIKAHAPPOSUUTTA**

SUOJAA MAHALAUKUN LIMAKALVOA

1. Valmiste, koostumus, ja käyttötarkoitus

Acidduo on tarkoitettu mahansisällön takaisinvirtauksen, hapon aiheuttaman polttelun ja näihin liittyvän raskaan olon lievitämiseen.

Acidduo lievittää mahan liikahapposuutta ehkäisten näärystästä, vatsakipua ja happamuuteen liittyviä ruoansulatusvaivoja.

Acidduo on tehoskaalalla riippumatta siitä, mistä vaivat johtuvat. Tätä valmistetta voi myös käyttää gastritit (mahalaukan limakalvon tulehdusen, ns. mahakatarrin) tukihoitoona.

1.1 Vaikutustapa

Acidduo sisältää seoksia useita eri ainesosia, jotka toimivat yhdessä mahalaukan happamassa ympäristössä. Alginatiota on polysakkariidi (kuitu), jota eristetään tietytyyppisistä merileivistä.

Kun tämä kuitu pääsee mahalaukan happamaan ympäristöön, se muodostaa nopeasti viskoosin ja kevenee geelin, joka peittää ja suojaa mahalaukan limakalvoa.

Valmisteen erityinen koostumus, joka sisältää sekä natriumalginaattia, algiinihappoa että bikarbonaattia, nopeuttaa edellä mainittua reaktiota entisestään. Viskoosi (eli sakea, sitkeä) alginaattegeeli hillitsee mahalaukan mahansisältöä takaisin ruokatorveen työttävä liikkeitä ja vähentää siten takaisinvirausten määriä. Karbonaatin ja bikarbonaatin yhdistelmä neutraloi mahahappoa. Reaktiossa muodostuvat hiilihioksidikuplat jäävät alginaattegeelin sisälle, jolloin geeli muuttuu mahansisällön päälle kellumaan nousevaksi vaahdoksi.

1.2 Koostumus

Jokainen tabletti sisältää: 200 mg natriumalginaatti, 50 mg algiinihappoa, 80 mg natriumbikarbonaatti ja 140 mg kalsiumkarbonaatti.

Apuaineet

Mannitol, sukralosi, piidioksiidi, kasviperäinen magnesiumsteraatti, glycerylidibehenaatti, makuaineet: inkivääriutee, eteerinen inkivääriöljy, sitruuna, minttu.

2. Pakkaus

Yksi pakkaus sisältää 24 tai 36 tablettaa.

3. Annostus ja antotapa

Ennen valmisteen mahdollista antoa lapselle, suositellaan keskusteluja lääkärin kanssa. Varoitukset ja varotoimet, ks. tämän käytööhjeen kohta 7.

Aikuiset (12-vuotiaista alkaen): Suositussanos on 2 purutablettia jokaisen pääterian jälkeen. Lapset (6–12-vuotiaat): Suositussanos on 1 purutabletti jokaisen pääterian jälkeen.

Edellä mainitut annokset lievittävät tehokkaasti liikahapposuutta ja estävät mahansisällön takaisinvirtausta ruokatorveen. Suositeltava annosta ei saa ylittää.

4. Haittavaikutukset
Acidduo-valmisteen sisältämät ainesosat on spesifisesti testattu ja osoitettu turvallisuksi, täysin bioyhteensopivaksi ja hyvin siedetyiksi.

Ohjeen mukaisella annostuksella ainoat raportoidut, mahdollisesti ilmenevät haittavaikutukset ovat ummetus ja ohimenevä ripulia.

Jos oireet jatkuvat, käännyn lääkärin puoleen. **5. Yhteisvaikutukset ravintolisien ja lääkkeiden kanssa**

Acidduo-valmisteen sisältämillä ainilla ei ole tunnuttuja yhteisvaikutuksia ravintolisien kanssa. Yleissäntönä voidaan kuitenkin todeta, että kaikki ravintolisät (kuten vitamiinit, ravintoainevalmisteet, yrtti- tai homeopaattiset valmisteet) olisi otettava viimeistään kaksi tuntia ennen, tai aikaisintaan kaksi tuntia jälkeen, **Acidduo**-annoksen.

5.1 Yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa

Viskoosin luonteesa vuoksi tämä lääkinnällinen laite saattaa viivästyttää tai vähentää samanaikaisesti otettujen lääkkeiden

imeytymistä. Ole siis yhteydessä lääkäriin ennen **Acidduo**-taipaisen valmisteen käytön aloittamista, jos käytät lääkkeitä ja etenkin, jos käytät ehkäisypillereitä.

Tähän valmisteeseen ei liity tunnettuja vastαιheita samanaikaiselle omepratsoli-, simetidiini- tai sisapridilääkitykselle. Näissä tapauksissa suositellaan kuitenkin keskustelemaan käytöstä lääkärin kanssa.

6. Säilytys

Säilytä **Acidduo** kuivassa paikassa, suoressa suorilta lämmönlähteiltä ja valolata.

Älä käytä tästä valmistetta, jos pakkaus on vaurioitunut. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Säilytä valmiste alle 25°C:ssa.

7. Varoitukset ja varotoimet

Tämä valmiste on pääosin tarkoitettu yli 18-vuotiaille aikuisille, ja ennen valmisteen käyttöä on suositeltavaa keskustella hoidosta apteekkihenkilökunnan tai lääkärin kanssa.

Valmisteesta voi myös tilapäisesti antaa lapsille ja teini-ikäisille huomioiden, että annoksen 6–12-vuotiaalle lapsille pitää olla puolet aikuisten annoksesta ja että käytön tulee tapahtua terveydenhuollon ammattilaisten ohjeiden mukaan.

Raskauden ja imetyksen aikana suositellaan keskustelemaan lääkärin kanssa ennen mahdollista

käyttöä. Suositeltua annostusta ei saa ylittää, sillä liian isot annokset voivat aiheuttaa ummetusta tai ohimenevää ripulia. Valmisteesta ei saa käyttää kroonisen ummetuksen tai ripulin, munuaissairauden tai kroonisen sydämen vajaatoiminnan yhteydessä.

Älä käytä **Acidduo**-valmistetta yli 30 peräkkäisenä päivän ajan. Jos oireet jatkuvat, käännyn lääkärin puoleen. Tabletti on käytettävä kerralla ja se on otettava pakauksestaan vasta käytöhetkellä.

Älä käytä tästä valmistetta, jos huomaat siedettävyysongelman. Älä ota valmistetta, jos tiedät olevasi yliherkkä jollekin valmisteeseen sisältämälle ainesosalle.

8. Kestoaika

Älä käytä tästä valmistetta pakauksessa mainitun viimeisen käytöspäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käytöspäivämäärä koskee ehjässä pakauksessa säilytettyä tuotetta.

9. Hävittäminen

Vanhentunut valmiste on hävitettävä paikallisten jättesäätösten mukaisesti. Älä missään tapauksessa heitä valmistetta tai sen pakkausta luontoon.

Tarkistettu viimeksi: 05/2024

AcidDuo
Tuggabletter

MEDICINTEKNISK PRODUKT, CE0426

**DÄMPAR HALSBRÄNNA OCH SURA UPPSTÖTNINGAR
LINDRAR VID FÖR MYCKET MAGSYRA
SKYDDAR MAGSLEMHINNAN**

1. Produkt, sammansättning och användningsändamål

Acidduo används för att motverka sura uppstötningar och halsbränna.

Acidduo gör det möjligt att kontrollera för mycket syra i magsäcken, förhindra halsbränna, magont och matsmältningsbesvär.

Acidduo är effektivt oberoende av vad besvären beror på och kan också användas som stödbehandling vid gastrit (en inflammation i magsäckens slemhinnan, s.k. magkatarr).

1.1 Verkningsmekanism

Acidduo innehåller en blandning av flera ingredienser som verkar tillsammans i magsäckens sura miljö.

Alginat är en polysackarid (fiber) som utvärns ur vissa typer av havsalger.

När denna fiber kommer i kontakt med magsäckens sura miljö, bildar den snabbt en viskös och lätt gel, som täcker och skyddar magsmehinnan.

Denna speciella sammansättning innehållande natriumalginate, algiinsyra och bikarbonat påskyndar ovannämnda reaktion.

Den viskosa alginatgelen gör det svårare för magsafnen att röra sig uppåt, vilket därmed minskar antalet episoder med halsbränna och sura uppstötningar. Kombinationen av karbonat och bikarbonat neutralisera magsyran.

På grund av sin viskosa natur kan denna medicintekniska produkt fördjöla eller minska upptaget av läkemedel som tas samtidigt. Därfor ska du kontakta läkare innan du börjar använda produkter som **Acidduo**, speciellt om du tar

1.2 Sammansättning

Varje tablet innehåller 200 mg natriumalginate, 50 mg algiinsyra, 80 mg natriumbikarbonat och 140 mg kalciumkarbonat.

Hjälppämen

Mannitol, sukralos, kiseldioxid, växtbaserat magnesiumstearat, glyceryldibehenat, smakämnen: extrakt av ingefära, etisk ingefärsolja, citron, mint.

2. Förpackning

En förpackning innehåller 24 eller 36 tabletter.

3. Dosering och administrieringsätt

Innan användning till barn rekommenderas att tala med läkare. För varningar och försiktighetsåtgärder, se avsnitt 7 i denna bruksanvisning.

Vuxna (från 12 år): rekommenderad dos är 2 tugitabletter efter varje huvudmåltid.

Barn (6–12 år): rekommenderad dos är 1 tugitablett efter varje huvudmåltid.

Ovan nämnda doser ger en effektiv lindring av besvär och orsakade av för mycket magsyra, och de förhindrar också reflux av maginnehåll till matstrupen.

De rekommenderade doserna får inte överskridas.

4. Biverkningar

Ingredienserna i **Acidduo** har i specifika tester visats vara säkra, helt biokompatibla och vältolererade.

Vid rekommenderade doser är de enda rapporterade, möjliga förekommande biverkningarna förstopning och övergående diarri.

Kontakta läkare om symptomet fortsätter.

5. Interaktioner med kostillskott och läkemedel

Ingredienserna i **Acidduo** har inga kända interaktioner (samtörningar) med kostillskott. Som regel kan man dock konstatera att alla kostillskott (såsom vitaminer, näringssupplmenter, örtpreparat eller homeopatiska produkter) ska tas senast två timmar före, eller tidigast två timmar efter, **Acidduo**.

5.1 Interaktioner med läkemedel

På grund av sin viskosa natur kan denna medicintekniska produkt fördjöla eller minska upptaget av läkemedel som tas samtidigt. Därfor ska du kontakta läkare innan du börjar använda produkter som **Acidduo**, speciellt om du tar

preventivmedel.

Detta preparat är inte förknippat med några kända kontraindikationer mot samtidig behandling med omeprazol, cimetidin eller cisaprid. I dessa fall rekommenderas dock

7. Varningar och försiktighetsåtgärder

Detta preparat är främst avsett för vuxna från 18 år. Detta rekommenderas att tala med apotekspersonal eller läkare innan användning.

Preparatet kan ibland ges till barn och tonåringar, men då ska man observera att 6–12-åringar ska endast få hälften av den dos som rekommenderas till vuxna och att behandlingen ska utföras enligt instruktioner av hälsovårdspersonal.

Vid graviditet och amning rekommenderas konsultation med läkare före användning.

Rekommenderad dos är ej överskridas, eftersom alltför stora doser kan orsaka förstopning eller övergående diarri.

Detta preparat får inte användas vid kronisk förstopning eller diarri, njursjukdom eller kronisk hjärtsvit.

Använd inte **Acidduo** i mer än 30 dagar i sträck. Kontakta läkare om symptomet fortsätter. Tablettorna är så kallade engångstabletter, och varje tablet ska tas ur sin förpackning först då det är dags att ta den.

Använd inte detta preparat om du observerar toleransproblem. Ta inte preparatet om du vet att du är överkänslig mot någon av ingredienserna.

8. Hållbarhet

Använd inte detta preparat efter det "används före"-datumet. Datumen avser preparat som förvarats i intakt förpackning.

9. Destruktion

När "används före"-datumen passerats ska överblivet preparat förstöras enligt lokala regler för avfallshantering. Släng aldrig preparat eller förpackningar i naturen.

Reviderad senast: 05/2024

08-07-2024/AG





PROOF COLOURS:



Size : 130 x 480 mm

Minimum Font 8 pt

Table content 7 pt

| FI | SE | DK/NO |
|---|---|--|
| SIIT srl Via Ariosto 50/60 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) ITALIA | SIIT srl Via Ariosto 50/60 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) ITALIEN | SIIT srl Via Ariosto 50/60 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) ITALIEN/ITALIA |
|  Orion Oyj PL 65 02101 Espoo Suomi Puh.: 010-4261 |  Orion Oyj PB 65 02101 Esbo Finland Tfn.: 010-4261 |  Orion Oyj PL 65 02101 Espoo Finland Tel.: 010-4261 |
| CE  | | |
| i  Lue käyttöohjeet. Läs bruksanvisningen. Se bruksanvisningen/bruksanvisningen | | |
| MD  Lääkinnällinen laite. Medicinteknisk produkt. Medicinsk udstyr/Medisinsk utstyr | | |
|  Säilytyslämpötilan yläraja. Övre temperaturgräns för förvaring. Maks. temperatur | | |
|  Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut. Ks. käyttöohje. Får inte användas om förpackningen är skadad, läs bruksanvisningen. Skal ikke brukes dersom pakningen er skadet. Se bruksanvisningen. | | |
|  Säilytettävä valoilla ja lämmöiltä suojaassa. Skyddas från ljus och värme. Beskyttes mod lys og varme. | | |
|  Säilytettävä kuivassa. Förvaras torrt. Opbevares tørt. | | |

S-0014803-1

ORION
PHARMA