

# FRONTE

EN

## Due to its protective action immediately relieves pain and promotes healing of mouth ulcers, reducing their duration. Contains no alcohol

Mouth ulcers (apthae) are an inflammatory condition involving the appearance of painful ulcerous lesions in the oral cavity. AFTAMED's special formulation provides strong, long-lasting protection over the lesion, which induces an immediate reduction in pain, as demonstrated by controlled clinical trials, and helps accelerate the natural healing processes, reducing the number of lesions and rehydrating the tissues.

### Indications

Mouth ulcers  
Apthous stomatitis  
Recurrent ulcerous lesions of the oral cavity (recurrent ulcers and lichen planus), and irritations of the oral cavity.

### Directions for use

GEL/JUNIOR GEL: apply 2 or 3 times a day, or more if required, after meals, for one week or until the symptoms disappear.

MOUTHWASH: in the case of recurrent ulcers, continuous use of the mouthwash can perform a preventive action on the entire oral cavity. Rinse with 10 ml of the product 2 or 3 times a day, or more if required, after meals, for one week or until the symptoms disappear. The product is ready for use. Do not dilute.

SPRAY: apply 2 or 3 times a day, or more if required, after meals, for one week or until the symptoms disappear. If the pain persists, the product can be safely applied several times a day. It is advisable not to eat or drink for at least 30 minutes after application. No problems have been reported after accidental swallowing of the product.

### Composition

Gel  
Main ingredient: high molecular weight hyaluronic acid (sodium salt)  
Other ingredients: Aqua, Xylitol, Cellulose gum, Propylene glycol, PEG 40 Hydrogenated castor oil, Sodium benzoate, Polyvinyl alcohol, Carbomer (Polycarbophil), Sodium hydroxide, Dichlorobenzyl alcohol, Aroma, CI 15985, Acid Blue 9 (CI 42090).  
It may contain: Lactic acid.

### Junior Gel

Main ingredient: high molecular weight hyaluronic acid (sodium salt)  
Other ingredients: Aqua, Xylitol, Cellulose gum, Propylene glycol, PEG 40 hydrogenated castor oil, Glyceril laureate, Polysorbate 20, Aroma, Carbomer (Polycarbophil), Sodium saccharin, Sodium lactate, Lactic acid, Disodium EDTA.  
It may contain: Sodium Hydroxide.

### Mouthwash

Main ingredient: high molecular weight hyaluronic acid (sodium salt)  
Other ingredients: Aqua, Xylitol, Propylene glycol, Polysorbate 20, PEG 40 Hydrogenated castor oil, Sodium benzoate, Carbomer (Polycarbophil), Dichlorobenzyl alcohol, Sodium lactate, Aroma, Lactic acid, Disodium EDTA, Sodium hydroxide, Sodium saccharin, CI 15985, Acid Blue 9 (CI 42090).

### Spray

Main ingredient: high molecular weight hyaluronic acid (sodium salt)  
Other ingredients: Aqua, Xylitol, Propylene glycol, PEG 40 Hydrogenated castor oil, Sodium benzoate, Aroma, Dichlorobenzyl alcohol, Sodium lactate, Sodium hydroxide, Lactic acid, Polyvinyl alcohol, Disodium EDTA, Sodium saccharin.

### Warnings

Do not use in the event of established individual hypersensitivity to the ingredients. Do not use product if visibly damaged. If the symptoms persist, consult your doctor. Do not use after expiry date. The shelf life refers to the intact product, correctly stored. After use, eliminate any product residues from container before closing. This product is for personal use. Keep out of children's reach.

### Packaging

- AFTAMED® GEL: 15 ml tube
- AFTAMED® JUNIOR GEL: 15 ml tube
- AFTAMED® MOUTHWASH: 150 ml bottle with measuring cup € 0373
- AFTAMED® SPRAY: 20 ml bottle with dispenser

 Navamedic

Navamedic AB, Sweden

DA

## Gennem sin forebyggende virkning bliver smerten straks lettet og fremmer helbredelse af mundsår og reducerer varigheden. Indeholder ikke alkohol.

Blister (afte) er en betændelsestilstand der gør, at der opstår smertefulde sår i mundhulen. Gennem sin forebyggende virkning bliver smerten straks lettet og fremmer helbredelse af mundsår og reducerer varigheden.

Indeholder ikke alkohol.  
Den specielle formel i AFTAMED mindsker smerten omgående, hvilket er bevist i flere kontrollerede kliniske studier. Også heelingen af sår fremmes og antallet af sår mindskes, da den inflammatoriske proces kontrolleres og der tilføres mere væske til vævet.

### Indikationer:

Mundsår  
Åftos stomatit  
Tilbagevendende sår i mundhulen (tilbagevendende sår og lichen planus)  
Ved gentagne sår kan daglig anvendelse af mundskyl være en forebyggende behandling for hele mundhulen.

### Anvendelse:

GEL/JUNIOR GEL: anvendes 2-3 gange dagligt eller mere ved behov. Kan med fordel anvendes efter hvert måltid i en uge eller til symptomerne forsvinder.

MUNDSKYL: ved tilbagevendende sår kan kontinuert brug af mundskyl være en forebyggende behandling til hele mundhulen. Skyl med 10 ml af væsken 2-3 gange dagligt eller efter behov efter hvert måltid i en uge eller indtil symptomerne forsvinder.

Produktet er klar til brug. Skal ikke fortyndes.

SPRAY: spray 2-3 gange dagligt eller efter behov i en uge eller til symptomerne forsvinder.

Ved vedvarende smerter kan produktet anvendes foreskrevet i doseringsforslaget. Det frarådes at spise eller drikke i mindst 30 minutter efter anvendelse.

Ufarligt at sluge.

### Indeholder:

Gel  
Hovedingrediens: Hyaluronsyre med høj molekylærvægt (natriumsalt)  
Andre ingredienser: Vand, Xylitol, Cellulose gummi, Propylenglykol, PEG-40 hydrogeneret ricinusolie, Natriumbenzoat, Polyvinylalkohol, Karbomer (Polycarbophil), Natriumhydroxid, Diklorbenzylalkohol, Aroma, CI 15985, Acid blue 9 (CI 42090).  
Kan indeholde: Mælkesyre.

### Junior Gel

Hovedingrediens: Hyaluronsyre med høj molekylærvægt (natriumsalt).  
Andre ingredienser: Vand, Xylitol, Cellulose gummi, Propylenglykol, PEG-40 hydrogeneret ricinusolie, Glyceryllaurat, Polysorbate 20, Aroma, Karbomer (Polycarbophil), Natriumsaccharin, Natriumlaktat, Mælkesyre, Dinatrium EDTA.  
Kan indeholde: Natriumhydroxid.

### Mundskyl

Hovedingrediens: Hyaluronsyre med høj molekylærvægt (natriumsalt).  
Andre ingredienser: Vand, Xylitol, Propylenglykol, Polysorbate 20, PEG-40 hydrogeneret ricinusolie, Natriumbenzoat, Karbomer (Polycarbophil), Diklorbenzylalkohol, natriumlaktat, Aroma, Mælkesyre, Dinatrium EDTA, Natriumhydroxid, Natriumsaccharin, CI 15985, Acid blue 9 (CI 42090).

### Spray

Hovedingrediens: Hyaluronsyre med høj molekylærvægt (natriumsalt)  
Andre ingredienser: Vand, Xylitol, Propylenglykol, PEG-40 hydrogeneret ricinusolie, Natriumbenzoat, Aroma, Diklorbenzylalkohol, Natriumlaktat, Natriumhydroxid, Mælkesyre, Polyvinylalkohol, Dinatrium EDTA, Natriumsaccharin.

### Advarsel:

Må ikke anvendes ved kendt overfølsomhed over for nogle af produktets indholdsstoffer. Brug ikke produktet hvis det er synligt skadet. Hvis symptomerne bliver ved, kontakt læge. Må ikke anvendes efter udløbsdato. Holdbarheden er afhængig af om produktet opbevares uåbnet og under rette forhold. Efter brug, fjern eventuelle restprodukter fra beholderen inden lukning. Dette produkt er beregnet til personligt brug. Opbevares utilgængeligt for børn.

### Pakning

- AFTAMED® GEL: 15 ml tube.
- AFTAMED® JUNIOR GEL: 15 ml tube.
- AFTAMED® MUNDSKYL: 150 ml flaske med doseringsbæger. € 0373
- AFTAMED® SPRAY: 20 ml flaske med dispenser.

 Navamedic

Navamedic AB, Sverige

NO

## Gjennom sin forebyggende effekt lindres smerten umiddelbart og fremmer tilheling av munnskold og reduserer varigheten. Inneholder ikke alkohol

Munnskold (afte) er en betennelsestilstand som gjør at det oppstår smertefulle sår i munnhulen. AFTAMED's spesielle sammensetning gir en sterk og langvarig beskyttelse av sårene, gjør at smertene minsker omgående, noe som er vist i kontrollerte kliniske studier, men også tilhelingen av sårene går raskere og antallet sår minsker ved at betennelsesprosessen kontrolleres og ved at vevet får mer væske.

### Indikasjoner (Bruksområder)

Munnskold  
Åftos stomatitt  
Tilbakevendende munnskold i munnhulen (tilbakevendende sår og lichen planus) samt irritasjon av munnhulen.

### Bruksanvisning

GEL/JUNIOR GEL: brukes 2-3 ganger daglig eller oftere ved behov. Kan med fordel brukes etter hvert måltid i en uke eller til symptomene forsvinner.

MUNNVANN: ved tilbakevendende sår kan kontinuert bruk av munnvannet være et forebyggende tiltak for hele munnhulen. Skyl med 10 ml av væsken 2 eller 3 ganger om dagen eller oftere ved behov, etter måltider i en uke eller til symptomene forsvinner. Produktet er klart for bruk. Skal ikke spes ut.

SPRAY: spray 2 eller 3 ganger daglig eller oftere ved behov, etter måltider i en uke eller til symptomene forsvinner. Hvis smertene vedvarer kan man trygt bruke produktet flere ganger per dag. Det er ikke anbefalt å spise eller drikke i minst 30 minutter etter bruk. Ufarlig ved utilsiktet svelging av produktet.

### Innhold

Gel  
Hovedingrediens: Hyaluronsyre med høy molekylvekt (natriumsalt)  
Øvrige innholdsstoffer: Vann, Xylitol, Cellulose gummi, Propylen glykol, PEG-40 hydrogenert ricinusolje, Natriumbenzoat, Polyvinylalkohol, Karbomer (Polycarbophil), Natriumhydroksid, Diklorbenzylalkohol, Aroma, CI 15985, CI 42090  
Kan inneholde melkesyre.

### Junior Gel

Hovedingrediens: Hyaluronsyre med høy molekylvekt (natriumsalt)  
Øvrige innholdsstoffer: Vann, Xylitol, Cellulose gummi, Propylen glykol, PEG-40 hydrogenert ricinusolje, Glyceril laurat, Polysorbate 20, Karbomer (polycarbophil), Natriumsakkarin, Natriumlaktat, Melkesyre, Dinatrium EDTA.  
Kan inneholde natriumhydroksid.

### Munnvann

Hovedingrediens: Hyaluronsyre med høy molekylvekt (natriumsalt)  
Øvrige innholdsstoffer: Vann, Xylitol, Cellulose gummi, Propylen glykol, PEG-40 hydrogenert ricinusolje, Natriumbenzoat, Karbomer (Polycarbophil), Diklorbenzylalkohol, Natriumlaktat, Aroma, Melkesyre, Dinatrium EDTA, Natriumhydroksid, Natriumsakkarin, CI 15985, CI 42090.

### Spray

Hovedingrediens: Hyaluronsyre med høy molekylvekt (natriumsalt)  
Øvrige innholdsstoffer: Vann, Xylitol, Propylen glykol, Cellulose gummi, PEG-40 hydrogenert ricinusolje, Natriumbenzoat, Aroma, Diklorbenzylalkohol, Natriumhydroksyd, Melkesyre, Polyvinylalkohol, Dinatrium EDTA, Natriumsakkarin

### Advarsel

Ikke bruk preparatet hvis det er fastslått en overfølsomhet mot innholdet. Ikke bruk preparatet hvis det er synlig skadet. Hvis symptomene fortsetter, kontakt lege. Ikke bruk produktet etter utløpt holdbarhet. Holdbarhetstiden er avhengig av at produktet oppbevares uåbnet og på riktig måte. Etter bruk, fjern eventuelle rester av preparatet på beholderen for beholderen stenges. Dette preparatet er for personlig bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn.

### Pakninger

- AFTAMED® GEL: 15 ml tube
- AFTAMED® JUNIOR GEL: 15 ml tube
- AFTAMED® MUNNVANN: 150 ml flaske med doseringsbeger € 0373
- AFTAMED® SPRAY: 20 ml flaske med dispenser

 Navamedic

Navamedic AB, Sverige

AF4001-03/A/A  
Release May 2022

mm 297

# RETRO

SV

## Genom sin förebyggande verkan lindras smärta omgående och främjar läkning av blåsor i munnen och minskar dess varaktighet. Innehåller inte alkohol

Munsår (afte) är ett inflammatoriskt tillstånd som gör att det uppkommer smärtsamma sår i munhålan. Den särskilda formulan i AFTAMED ger starkt och varaktigt skydd över blåsorna vilket gör att smärtan minskas omgående, vilket bevisats i kontrollerade kliniska studier, men också att läkningen av såren påskyndas, minskar antalet blåsor och att vävnaderna hydreras.

### Indikationer

Munsår  
Åftos stomatit  
Återkommande munsår i munhålan (återkommande sår och lichen planus) och irritation i munhålan

### Bruksanvisning

GEL/JUNIOR GEL: används 2-3 gånger dagligen, eller mer vid behov, efter måltid i en vecka eller till dess symptomen försvinner.

MUNNVATTEN: vid återkommande sår kan kontinuerlig användning av munvatten vara en förebyggande åtgärd för hela munhålan. Skölj med 10 ml av vätskan, 2 eller 3 gånger dagligen eller mer vid behov, efter måltid, under en vecka eller tills symtomen försvinner. Denna produkt är färdig att använda. Späd inte ut den.

SPRAY: spraya 2 eller 3 gånger dagligen eller mer vid behov, efter måltid, under en vecka eller tills symtomen försvinner.

Om smärtan kvarstår kan produkten användas flera gånger per dag.

Det är inte lämpligt att äta eller dricka under minst 30 minuter efter användandet.

Öfverhåll att svälja.

### Innehåll

Gel  
Huvudingrediens: Hyaluronsyra med hög molekylärvikt (natriumsalt)  
Övriga ingredienser: Vatten, Xylitol, Cellulosa gummi, Propylenglykol, PEG-40 hydrogenerad ricinolja, Natriumbensoat, Polyvinylalkohol, Karbomer (Polycarbophil), Natriumhydroxid, Diklorbenzylalkohol, Arom, CI 15985, Acid Blue 9 (CI 42090)  
Kan innehålla mjölksyra.

### Junior Gel

Huvudingrediens: Hyaluronsyra med hög molekylärvikt (natriumsalt)  
Övriga ingredienser: Vatten, Xylitol, Propylenglykol, Polysorbate 20, PEG-40 hydrogenerad ricinolja, Glycerilaurat, Polysorbate 20, Arom, Karbomer (Polycarbophil), Natriumsackarin, Natriumlaktat, Mjölksyra, Dinatrium EDTA.  
Kan innehålla natriumhydroxid.

### Munvatten

Huvudingrediens: Hyaluronsyra med hög molekylärvikt (natriumsalt)  
Övriga ingredienser: Vatten, Xylitol, Cellulosa gummi, Propylenglykol, PEG-40 hydrogenerad ricinolja, Natriumbensoat, Karbomer (Polycarbophil), Diklorbenzylalkohol, Natriumlaktat, Arom, Mjölksyra, Dinatrium EDTA, natriumhydroxid, CI 15985, Acid Blue 9 (CI 42090).

### Spray

Huvudingrediens: Hyaluronsyra med hög molekylärvikt (natriumsalt)  
Övriga ingredienser: Vatten, Xylitol, Cellulosa gummi, Propylenglykol, PEG-40 hydrogenerad ricinolja, Natriumbensoat, Arom, Diklorbenzylalkohol, Natriumlaktat, Natriumhydroxid, Mjölksyra, Polyvinylalkohol, Dinatrium EDTA, Natriumsackarin.

### Varning

Använd inte om det finns en fastställd individuell överkänslighet mot produkten. Använd inte om produkten är synligt skadad. Om symtomen kvarstår, kontakta läkare. Använd inte efter utgångsdatum. Hållbarhetstiden är beroende av om produkten förvarats öppnad och på rätt sätt. Efter applicering, ta bort eventuellt överblivna produktrester från produkten innan förslutning. Denna produkt är avsedd för personligt bruk. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

### Förpackning

- AFTAMED® GEL: 15 ml tub
- AFTAMED® JUNIOR GEL: 15 ml tub
- AFTAMED® MOUTHWASH: 150 ml flaske med doseringskopp € 0373
- AFTAMED® SPRAY: 20 ml flaske med dispenser

 Navamedic

Navamedic AB, Sverige

FI

## Lievittää kipua välittömästi, ja edistää sekä nopeuttaa suun aftojen parantamista proaktiivisen vaikutuksensa vuoksi. Ei sisällä alkoholia.

Suun haava (afta) on tulehdus, jossa suuhun syntyy aristava haavauma. AFTAMED-valmisteen erityinen koostumus antaa vahvan ja kestävä suojan vauriokohdalle, mikä vähentää välittömästi kipua, kuten kontrolloiduista kliinisistä tutkimuksista ilmenee. Aftamed nopeuttaa lisäksi haavojen paranemista, pienentää rakkuloiden määrää ja kosteuttaa kudoksia.

### Indikaatiot

Suun haavat  
Aftoottinen suun tulehdus  
Uusiutuvat suun haavat (haavaumat ja lichen planus) ja suun ärsytykset.

### Käyttöohjeet

GELI/JUNIOR GEELI: 2-3 kertaa päivässä tai tarpeen mukaan aterian jälkeen viikon ajan, tai kunnes oireet häviävät.  
SUUVESI: Toistuvissa haavoissa suuveden jatkuva käyttö voi toimia hyvin ennaltaehkäisevä toimenpiteenä. Huuhteile 10 ml:ää 2-3 kertaa päivässä tai tarpeen mukaan aterian jälkeen viikon ajan, tai kunnes oireet häviävät. Tuote on käyttövalmis. Älä laimenna.

SPRAY: Suihkuta 2-3 kertaa päivässä tai tarpeen mukaan aterian jälkeen viikon ajan, tai kunnes oireet häviävät.

Jos kipu ei häviä, voit käyttää tuotetta useampia kertoja päivässä.

Vältä syömistä ja juomista vähintään 30 minuutin ajan annostelun jälkeen.

Ongelmia ei ole raportoitu sen jälkeen, kun tuotetta on vahingossa nielty.

### Koostumus

Geeli  
Pääasiallinen ainesosa: Korkea molekulaarinen hyaluronihappo (natriumsuola)  
Muut ainesosat: Vesi, Ksylitoli, Karboksimeetyyliselluloosa, Propyleeniglykoli, PEG-40 hydrogenoitu risiniöljy, Natriumbensoatti, Polyvinylialkoholi, Karbomeeri (Polykarbofiili), Natriumfosfaatti, Diklooribentsyylialkoholi, Aromi, CI 15985, Acid Blue 9 (CI 42090)  
Saattaa sisältää: maitohappoa

### Junior Geeli

Pääasiallinen ainesosa: Korkea molekulaarinen hyaluronihappo (natriumsuola)  
Muut ainesosat: Vesi, Ksylitoli, Karboksimeetyyliselluloosa, Propyleeniglykoli, PEG-40 hydrogenoitu risiniöljy, Glyceriyllauratti, Polysorbatti 20, Aromi, Karbomeeri (Polykarbofiili), Natriumsakkarini, Natriumlaktaatti, maitohappo, Dinatrium EDTA  
Saattaa sisältää natriumhydroksidia

### Suuvesi

Pääasiallinen ainesosa: Korkea molekulaarinen hyaluronihappo (natriumsuola)  
Muut ainesosat: Vesi, Ksylitoli, Karboksimeetyyliselluloosa, Propyleeniglykoli, PEG-40 hydrogenerad ricinolja, Natriumbensoatti, Karbomeeri (Polykarbofiili), Diklooribentsyylialkoholi, Natriumlaktaatti, Aromi Maitohappo, Dinatrium EDTA, Natriumhydroksidi CI 15985, Acid Blue 9 (CI 42090)

### Spray

Pääasiallinen ainesosa: Korkea molekulaarinen hyaluronihappo (natriumsuola)  
Muut ainesosat: Vesi, Ksylitoli, Propyleeniglykoli, PEG-40 hydrogenoitu risiniöljy, Natriumbensoatti, Aromi, Diklooribentsyylialkoholi, Natriumlaktaatti, Natriumhydroksidi, Maitohappo, Polyvinylialkoholi, Dinatrium EDTA, Natriumsakkarini.

### Varoitus

Älä käytä tuotetta, jos tiedät olevasi sille yliherkkä. Älä käytä tuotetta jos se on näkyvästi vaurioitunut. Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireet eivät häviä. Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Säilyvyysaikaan vaikuttaa tuotteen oikea säilytys. Käytön jälkeen, pudista annostelija ennen pakkausten sulkemista. Tämä tuote on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

### Pakkkaus

- AFTAMED® GEELI: 15 ml tuubi
- AFTAMED® JUNIOR GEELI: 15 ml tuubi
- AFTAMED® SUUVESI: 150 ml pullo ja mittamuki € 0373
- AFTAMED® SPRAY: 20 ml pullo annostelijalla

 Navamedic

Navamedic AB, Ruotsi

IS

## Stuðlar að betri gróanda sára og blaðra í munni. Dregur hratt úr verkjum. Inniheldur ekki alkóhól.

Munnangur er bólgukvilli sem einkennist af sármyndun í slímhúð munnins. Munnholtsárin eru litil en sársaukafull yfirborðsár og geta komið fram hvar sem er í munni. Klínískar rannsóknir hafa sýnt að einstök efnaformúla AFTAMED dregur hratt úr verkjum, flýtir einnig fyrir sárgróanda og dregur úr fjölda sára í munni með því að ná stjóm á bólguferlu og veita skaddáða vefnum raka.

### Ábendingar

Sár í munni.  
Munnangur.  
Endurtekin sár í munnhölli, flatskæningur (e. lichen planus) og erting í munnhölli.

### Notkunarmöguleikar

Gel/Junior gel: Notist 2-3 sinnum á dag eða oftar eftir þörfum. Notist eftir máltíð í eina viku eða þar til einkenni hverfa.

Munnskól: Við endurteknum sárum getur dagleg notkun munnskols verið fyrirbyggjandi meðferð fyrir allt munnskól. Skólá munni með 10 ml af munnskolinu 2-3 sinnum á dag eða oftar eftir þörfum. Notist eftir máltíð í eina viku eða þar til einkenni hverfa. Munnskólá er tilbúin til notkunar. Ekki þynna lausina. Úðafaska: Úðá 2-3 sinnum á dag eða eftir þörfum. Notist eftir máltíð í eina viku eða þar til einkenni hverfa.

Við viðvarandi verkjum má nota vöruna oftar en ráðlagðir skammtar segja til um. Forðist neyslu matar og drykkjar minnst 30 mínútur eftir notkun vörunnar. Skáðlaust er að kynjga vörunni.

### Innihald

Gel  
Helstu innihaldsefni: Hýalúrónsýra með háum mólmassa (natriumsalt).  
Önnur innihaldsefni: Vatn, xýlitol, sellulósi, própýlen glykól, PEG 40 hert laxerólía, natrium bensóat, pólvínýl alkóhól, karbómer (polycarbophil), natrium hydroxíð, diklórbensýl alkóhól, bragðefni, CI 15985, Acid Blue 9 (CI 42090). Getur innihaldið mjólkursýru.

### Junior Gel

Helstu innihaldsefni: Hýalúrónsýra með háum mólmassa (natriumsalt).  
Önnur innihaldsefni: Vatn, xýlitol, sellulósi, própýlen glykól, PEG 40 hert laxerólía, glýserýl laurat, pólvórþat 20, bragðefni, karbómer (polycarbophil), natrium saccharin, natrium laktat, mjólkursýra, tvínatrium EDTA, natrium hydroxíð, natrium sakkarín, CI 15985, Acid Blue 9 (CI 42090).

### Spray

Helstu innihaldsefni: Hýalúrónsýra með háum mólmassa (natriumsalt).  
Önnur innihaldsefni: Vatn, xýlitol, própýlen glykól, PEG 40 hert laxerólía, natrium bensóat, bragðefni, diklórbensýl alkóhól, natrium laktat, natrium hydroxíð, mjólkursýra, pólvínýl alkóhól, tvínatrium EDTA, natrium sakkarín.

### Variúð

Notist ekki ef ofnæmi er fyrir einhverju innihaldsefnanna. Notist ekki ef varan er skemmd. Ef einkenni eru viðvarandi skaltu ráðfæra þig við lækn. Notist ekki eftir fýrmyngardag. Geymsluþol vörunnar er háð því að varan sé geymd lokuð og við réttar aðstæður. Fjarlægðu allar leyfar af vörunni og lokið látinu strax eftir notkun. Varan er til einkanta. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

### Pakkningar

- AFTAMED® GEL: 15 ml túpa
- AFTAMED® JUNIOR GEL: 15 ml túpa
- AFTAMED® MUNNSKOL: 150 ml flaska með mæliglasi € 0373
- AFTAMED® SPRAY: 20 ml flaska með skammtara

 Navamedic

Navamedic AB, Svíþjóð

AF4001-03/A/A  
Release May 2022

mm 297

formato mm 297 x 170 STAMPA 1 colore - fronte/retro - PANTONE Reflex Blue