

fronte

totale 15 lingue (con navamedic)



Due to its protective action quickly reduces pain and gum inflammation.

"Teething" is defined as the process of formation and development of the teeth in the mouth. The milk teeth (or deciduous teeth) begin to erupt at around the age of 6/7 months, and the process is usually complete by around 3 years of age. The permanent teeth begin to appear at about 6 years old. **Indications:** *Aftamed® Teething* forms a protective film indicated for the typical gum inflammations suffered by children, for example due to teething or trauma. Studies on *Aftamed® Teething* show a reduction in pain, swelling and inflammation.

Directions for use: Apply a small amount of the product 3-6 times a day, or as needed, and spread onto the gum with an applicator or a finger (after washing the hands). Massage gently and completely cover the affected area. Preferably apply after meals and at bedtime to provide longer-lasting relief for the child.

Aftamed® Teething does not contain alcohol, sugar, gluten, lactose, parabens, SLS or GMOs. No problems have been reported after accidental swallowing of the product. **Contraindications:** Do not use in the event of established individual hypersensitivity to the product.

Precautions and warnings: Do not use if tube is open or damaged. After use, eliminate any product residues from container before closing. This product is for personal use. Do not use after expiry date. Keep out of children's reach. If the product is to be used at the same time as other products, consult your doctor. **Packaging tube**



Grâce à son action protectrice, réduit rapidement la douleur et l'inflammation des gencives.

«Teething» est défini comme le processus de formation et de développement des dents dans la bouche. Les dents de lait commencent à faire leur éruption vers l'âge de 6/7 mois, et le processus est généralement finalisé vers 3 ans. Les dents définitives commencent à apparaître vers 6 ans.

Indications: *Aftamed® Teething* forme un film protecteur indiqué pour les inflammations typiques des gencives des enfants, par exemple lors de la poussée des dents ou d'un traumatisme. Des études sur *Aftamed® Teething* montrent une réduction de la douleur, de la tuméfaction et de l'inflammation. **Mode d'emploi:** Appliquer une petite quantité du produit 3 à 6 fois par jour, ou selon les besoins, et étaler sur la gencive à l'aide d'un applicateur ou d'un doigt propre. Masser doucement et couvrir complètement la zone touchée. Appliquer de préférence après les repas et au coucher afin de procurer un soulagement durable de la douleur pour l'enfant. *Aftamed® Teething* ne contient pas d'alcool, de sucre, de lactose, de parabens, de SLS ou d'OGM. Aucun problème n'a été signalé après ingestion accidentelle du produit. **Contra-indications:** Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité individuelle au produit. **Précautions d'emploi et mises en garde:** Ne pas utiliser si le tube est ouvert ou endommagé. Après utilisation, éliminer les résidus de produit du conteneur avant la fermeture. Ce produit est à usage personnel. Ne pas utiliser après la date d'expiration. Tenir hors de la portée des enfants. Si le produit doit être utilisé en même temps que d'autres produits, consulter votre médecin. **Emballage Tube**



Rasche Reduzierung von Schmerzen und Zahnfleischentzündung dank seiner speziellen Schutzwirkung.

Unter „Zähnen“ versteht man den Vorgang der Entstehung und Entwicklung der Zähne im Mund. Die Milchzähne beginnen im Alter von 6-7 Monaten durchzubrechen, die Verzahnung des Milchgebisses ist mit ca. 3 Jahren vollständig. Die zweiten Zähne erscheinen mit ungefähr 6 Jahren.

Hinweise: *Aftamed® Teething* bildet einen Schutzfilm im Fall der typischen Zahnfleischentzündungen bei Kindern, die z.B. beim Zahnen oder infolge von Wunden im Mund auftreten. Studien zu *Aftamed® Teething* belegen sowohl Schmerzreduzierung, Abschwellung und Entzündungshemmung.

Gebrauchsanweisung: Tragen Sie eine kleine Menge des Produktes 3-6 Mal täglich oder nach Bedarf auf das Zahnfleisch auf und verteilen Sie es mit einem Applikator oder mit dem Finger (nach gründlichem Händewaschen). Massieren Sie das Gel sanft ein und bedecken Sie die gesamte betroffene Stelle. Die Anwendung sollte vorzugsweise nach den Mahlzeiten und vor dem Schlafen erfolgen, um eine langwirkende Linderung des Schutzfilms beim Kind sicherzustellen. Bei versehentlichem Schlucken des Produkts sind keine Probleme bekannt.

Gegenindikation: Verwenden Sie das Gel nicht bei bekannter Überempfindlichkeit gegen das Produkt. **Vorsichtsmaßnahmen und Warnung:** Nicht benutzen, wenn die Tube geöffnet oder beschädigt ist. Nach Gebrauch Reste des Produkts von der Tube entfernen und dann schließen. Dieses Produkt ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Verfallsdatum beachten und einhalten. Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern. Bei gleichzeitiger Anwendung anderer Produkte lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten. **Verpackungsgröße Tube**



Reduce rápidamente el dolor y la inflamación de las encías por su acción

protectora.

La dentición se define como el proceso de formación y desarrollo de los dientes dentro la cavidad bucal. Los dientes de leche (o dentición primaria) empiezan a salir alrededor de los 6-7 meses; y el proceso suele completarse hacia los 3 años. Los dientes definitivos empiezan a aparecer a los 6 años.

Indicaciones Aftamed® Teething forma un film protector indicado para las inflamaciones de las encías que sufren los niños, por ejemplo, debido a la salida de los primeros dientes o traumas. Los estudios sobre *Aftamed® Teething* muestran una reducción del dolor, y de la inflamación.

Modo de empleo Aplicar 3-6 veces al día, o según necesidad, una pequeña cantidad de producto y extenderlo sobre las encías con el aplicador o el dedo (lavarse las manos antes y después). Masajear suavemente cubriendo completamente el área afectada. Aplicar preferiblemente después de las comidas y antes de acostarse para proporcionar un alivio más duradero al niño.

Aftamed® Teething no contiene alcohol, azúcar, colorantes, gluten, lactosa, parabenos, SLS ni OMG parabenos, SLS ni OMG. No se han reportado problemas después de la ingestión accidental del producto.

Contraindicaciones No utilizar en caso de hipersensibilidad individual conocida al producto. **Precauciones y advertencias** No usar si el envase está abierto o dañado. Después del uso, eliminar cualquier residuo del producto del envase antes de cerrarlo. Este producto es para uso personal. No usar después del período de validez. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte a su médico si está usando otros productos al mismo tiempo.

Presentación Tubo
(GR)

λόγω της προστατευτικής του δράσης μειώνει γρήγορα τον πόνο και τη φλεγμονή των σύλων.

«Οδοντοφυΐα» ορίζεται ως η διαδικασία σχηματισμού και ανάπτυξης των δόντων στο στόμα. Τα νεογέλα δόντια αρχίζουν να φύονται περίπου στην ηλικία των 6/7 μηνών και η διαδικασία συνήθως ολοκληρώνεται σε ηλικία περίπου 3 ετών. Τα μόνιμα δόντια αρχίζουν να εμφανίζονται σε ηλικία περίπου 6 ετών. **Ενδείξεις:** Το *Aftamed® Teething* gel σχηματίζει ένα προστατευτικό φύλο που ανακουφίζει τα βρεφικά σύλων από τη συμπτώματα της πρώτης οδοντοφυΐας ή τύχων τραυματισμού. Μελέτες για το *Aftamed® Teething* δείχνουν μείωση του πόνου, του προβρήφτη και των φλεγμονών των σύλων. Οδύνεις χρήσης: Εφαρμόζεται 3-6 φορές την ημέρα ή όσο απαιτείται, μέλανη μικρή ποσότητα και απλώνεται την πάνω στα σύλων με απλούστερη ή με δαχτυλίδια. Κάντε ελαφρύ τοπικό μασάζ και καλύψτε επερκάς την πάχαση περιοχής. Εφαρμόστε μετά τη γεύματα και πριν το βραδιό ώπου για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερο διάρκεια ανακουφίσης του μωρού σας, από τη δράση του προστατευτικού φύλου. Το *Aftamed® Teething* δεν περιέχει αλκοόλ, ζάχαρη, γλουτένη, λακτότητα, parabenos, SLS ή GMOs Δεν έχουν αναφέρετε προβλήματα μετά από κατά λάθος κατάσταση του προϊόντος.

Αντενδείξεις: Μην το χρησιμοποιείτε περιπλακή καθιερώμενής αποτικής υπερασπιστικής προϊόντος. **Προφυλάξεις και προειδοποίησης:** Μην το χρησιμοποιείτε επάνω σε περίπλακη καθιερώμενής αποτικής υπερασπιστικής προϊόντος από το σωλήνωμα πριν κλείσεται. Αυτό το προϊόν προστέφται από πρωτοπόρη χρήση. Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία Αργίας. Μακριά από παιδιά. Εάν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με άλλα προϊόντα, συμβουλεύετε το γιατρό σας. **Συσκευασία Σώληνάριο**

(PT)

Devido à sua ação protetora reduz rapidamente a dor e inflamação da gengiva.

"Teething" é definido como o processo de formação e desenvolvimento dos dentes na boca. Os dentes de leite começam a surgir por volta dos 6/7 meses de idade, e o processo geralmente é concluído por volta dos 3 anos de idade. Os dentes permanentes começam a aparecer por volta dos 6 anos.

Hinweise: *Aftamed® Teething* bildet einen Schutzfilm im Fall der typischen Zahnfleischentzündungen bei Kindern, die z.B. beim Zahnen oder infolge von Wunden im Mund auftreten. Studien zu *Aftamed® Teething* belegen sowohl Schmerzreduzierung, Abschwellung und Entzündungshemmung.

Gebrauchsanweisung: Tragen Sie eine kleine Menge des Produktes 3-6 Mal täglich oder nach Bedarf auf das Zahnfleisch auf und verteilen Sie es mit einem Applikator oder mit dem Finger (nach gründlichem Händewaschen). Massieren Sie das Gel sanft ein und bedecken Sie die gesamte betroffene Stelle. Die Anwendung sollte vorzugsweise nach den Mahlzeiten und vor dem Schlafen erfolgen, um eine langwirkende Linderung des Schutzfilms beim Kind sicherzustellen. Bei versehentlichem Schlucken des Produkts sind keine Probleme bekannt.

Gegenindikation: Verwenden Sie das Gel nicht bei bekannter Überempfindlichkeit gegen das Produkt.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnung: Nicht benutzen, wenn die Tube geöffnet oder beschädigt ist. Nach Gebrauch Reste des Produkts von der Tube entfernen und dann schließen. Dieses Produkt ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Verfallsdatum beachten und einhalten. Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern. Bei gleichzeitiger Anwendung anderer Produkte lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten. **Verpackungsgröße Tube**

(BG)

Благодарение на защитното си действие, AFTAMED teething бързо намалява болката и възпалението на венците.

Никогато не зъбите е процесът на формиране и развитието на първите

зъби на детето. Млечните зъби започват своя растеж от 6-7 месечна възраст, като процесът продължава до около тригодишна възраст.

Показания: Афтамед гел за зъбки образува защитен филм върху наранения венец и така намалява възпалението. Клинични данни показват, че при употреба на *Aftamed® Teething* се наблюдава бързо облекчение на болката, отока, и възпалението.

Начин на употреба:

Нанесете чрез апликатор или с чист пръст малко количество от гела върху венец 3 - 6 пъти дневно (или повече, ако е необходимо). Масажирайте нежно и покройте изязъла наранения участък. Препоръчително е приложението на гела да е след хранене или преди лягане, за да се осигури максимално дълъг обезболен период. Не съдържа алкохол, захар, глутен, лактоза, парabenи, сулфати и ГМО. Безопасен при погълдане.

Противопоказания: Да не се използва при свръхчувствителност към някоя от съставките.

Предупреждения: Да не се използва, ако тубата е отворена или с нарушена цялост. Тубата да се почиства и затвори пълно след употреба. Продуктът за лична употреба. Да не се използва след изтичане на годността. Да се пази на място недостъпно за деца. Консултирайте се с лекар, ако прилагате продукта в комбинация с други продукти. **Опаковка:** Туба

(HR)

Kod nicanja mlijeciñih zubi Svojim zaštitnim djelovanjem brzo ublažava bol i upalu desni.

Nicanje mlijeciñih zubi je proces formiranja i razvoja zubi u usno šupljini. Mlijeciñi zubi počinju izbijati u dobi od 6/7 mjeseca života djeteta (mlijeciñna denticija), a proces obično završava otprilike u 3 godini života. Trajni zubi se pojavljuju po 6. godine života.

Indikacije: *Aftamed® Teething* gel za upotrebu kod nicanja mlijeciñih zubi stvara zaštitni film indiciran kod tipičnih upala desni koje pogadaju djecu u toj dobi, npr. zog nicanja zubi ili nekih drugih vrsta trauma. Studije o proizvodu pokazuju da smanjuje bol, otetnost i upalu.

Upute za upotrebu: Nanijeti 3-6 puta dnevno ili po potrebi, na desni, malu količinu prvozivu s aplikatorom ili prstom (nakon pranja ruku). Nježno usmjeravajući prekrjite cijelo bolno područje. Za dugotrajniji učinak preporučuje se primjena nakon jela i prije spavanja. **Sastav:** Glavni sastojci: hijaluronska kiselina visoke molekularne težine (natrijeva sol), 500 mg / 100 g. Ostali sastojci: Aqua, PEG 400, Xylitol, Propilen alkohol, Cellulose gum, PEG 40 hydrogenated castor oil, PVP, PVH, MA copolymer, VP/Eicosene copolymer, Glyceryl laurate, Carbomer (Polycarbophil), Sodium saccharin, Sodium phosphate, Sodium lactate, Disodium EDTA. Može sadržavati laktičnu kiselinslu i Sodium hydroxide. *Aftamed® Teething* ne sadrži alkohol, šećer, gluten, laktozu, paraben, SLS ili GMO. Bezopasan ako se progruta.

Kontraindikacije: Ne koristiti u slučaju utvrđene individualne preosjetljivosti na proizvod. **Mjere opreza i upozorenja:** Ne koristite ako je tuba otvorena ili otetečena. Nakon konzerviranja uklonite ostatke proizvoda sa ambalaže i odmah zatvorite tubu. Proizvod je namijenjen za osobnu uporabu. Ne koristiti nakon isteka roka valjanosti. Čuvati izvan dohvata djece. Ako se proizvod koristi istovremeno sa drugim proizvodima, obratite se svom liječniku.

Pakiranje: Tuba

نتيجة لفعالية الوقائية يخفف الألم والتهاب اللثة بشكل سريع

يُعرف "التنين" بعلمه تكبير الأنسان وتغمره في الدم. تُعدّ الأنسان الليبية (أو بحسب المصطلح العلمي) هي التي تظهر في الشهر السادس / السابع تقريباً، وتكتمل عادة بين سن الثالثة وستة سنوات تقريباً.

يُعرف "التنين" بـ "طعنة حمامة لالتهابات اللثة الشائعة التي يعاني منها الأطفال، ونادراً ما يُصاب بالبالغين".
أظهرت الدراسات أن "Aftamed® Teething" يُخفف الألم والتهاب اللثة والتهابات اللثة.

ضع كمية صغيرة من المنتج في اليوم أو عند الحاجة وزورها على اللثة واستخدام آلة الفرشاة بدلاً من العصافير أو سوكول. **طريقة الاستخدام:**

ضع كمية صغيرة من المنتج (عد 6-3 ملليلتر) في اللثة واستخدم آلة الفرشاة بدلاً من العصافير أو سوكول. **Aftamed® Teething** على الكحول أو الماء سلفات لوريث الصوديوم أو الكالسيوم المعدنية وراثياً.

لا يحتوي "Aftamed® Teething" على الكحول أو الماء سلفات لوريث الصوديوم أو الكالسيوم المعدنية وراثياً.

لم يتم الإبلاغ عن أي مشكل بعد إدخاله إلى المرضى المنتج.

موانع الاستعمال: لا يستخدم في حالة وجود فروط حساسية فردية للمنتج.

احتياطات وتحذيرات: لا يستخدم إذا كان الأدوية متقدماً أو تالقاً.

تحذير بعد الاستخدام من أي بقای المنتج على العنة قبل إغلاقها. هذا المنتج للاستعمال الشخصي.

لا يستخدم بعد تاريخ انتهاء صلاحية. احفظه بعيداً عن متناول الأطفال.

في حالة استخدامه مع منتجات أخرى، قم باستشارة الطبيب.

التبغ

pharmacode

RETRO

TR

Koruyucu etkisi sayesinde ağrıyu ve dişeti iltihabını hızla azaltır
"Dış çıkmazı" dişlerin ağızda olumlu ve gelişim süreci olarak tanımılan.
 Süt dişleri (veya bebek dişleri), bebek 6/7 aylıkken patlamaya başlar ve bu süreç genellikle yaklaşık 3 yaşına kadar süren. Kalıcı dişler 6 yaş civarında belirmeye başlar. **Endikasyonlar:** **Aftamed®** Dış Çıkarma Jeli, dış çıkmazı veya travma nedeniyle çocukların gelişen tipik diş iltihaplarını endike etmek için bir koruyucu film oluşturur. **Aftamed®** Dış Çıkarma Jeli'ne ilişkin çalışmalar ağır, sisilik ve iltihabın azalmasına ortaya koymaktadır.

Kullanım talimatları: Ürünü günde 3-6 kere veya gerekligi kadar, az bir miktarında uygulayın ve bir uyguluk veya (eller ykanıldan sonra) parmak yardımıyla yayın. Hafifçe masaj yaparak etkilenen bölgeyi tamamen kaplayın. Çocuklara daha uzun süreli bir rahatlama sağlaması için, her tercih yemeklerden sonra ve uyumdan önce uygulayın.

Aftamed® Dış Çıkarma Jeli alkol, şeker, glüten, laktos, paraben, SLS veya GDO içermez. Yarınlıkla ürün yutulduktan sonra herhangi bir problem bildirilmemiştir. **Kontrendikasyonları** Ürün karşılanan bireysel aşırı duyarlılık durumunda kullanmayı. **Tedbir ve uyarılar:** Tüp açılmışsa veya hasar görmüşse kullanmayın. Kullanıldan sonra, kapaklı kapatmadan önce ürün artıklarını/tortusunu tüpten uzaklaştırın. Bu ürün kişisel kullanım içindir. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın. Ürünün diğer ürünlerle aynı anda kullanılması gerekiyorsa, doktorunuza danışın. **İmbalaj şekli** tüp

NO

Med sin beskyttende virkning reduseres smerte og betennelse i gommene raskt.

Tannfrembrudd er definert som prosessen der tennet dannes og bryter ut av gummene. Tennene bryter vanligvis ut ved 6-7 måneder alder og prosessen er vanligvis ferdig rundt 3 års alder. De permanente tennene begynner å dukke opp rundt 6 års alder.

Indikasjoner: Aftamed® Teething danner en beskyttende film som linder betennelsen i munhulen hos små barn, feks. forårsaket av tannfrembrudd eller traumer. Studier har vist at **Aftamed® Teething** reduserer smerten, hevelsen og betennelsen.

Slik brukes produktet: Påfør en liten mengde av gelen 3-6 ganger om dagen, etter behov og fordel det på gummen med en Q-tips eller en finger (etter å ha vasket hendene). Masser forsiktig og sorg for å dekke området rundt fullstendig. Påfør etter milderter og vend sengested til langvarig lindring for barnet.

Aftamed® Teething inneholder ikke alkohol, sukker, gluten, laktose, paraben, SLS (sulfat) eller GMO (genmodifisert mat). Ufarlig når den svelges. **Kontraindikasjoner** Produktet må ikke brukes ved overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsikrighetsregler og advarsler: Produktet skal ikke brukes dersom tuben er åpenet eller skadet før første gangs bruk. Etter påføring, ta bort eventuelle rester av produktet fra tuben og lukk tuben med en gang. Dette produktet er for personlig bruk. Brukes ikke etter utløpsdato. Oppbevares ut tilgjengelig for barn. Dersom produktet skal brukes sammen med andre produkter, ta kontakt med lege. **Innhold tube**

DA

kraft af produkternes beskyttende virkning reduceres smerten og tandkødsbetaendelse hurtigt.

"Teething" er defineret som dannelsen og udviklingen af tænderne i munden. Mælkætænderne begynder at vise sig omkring 6-7 månaders alder og lykcur tanntøju i krungum præggja åre aldr. Fullorolstænnur koma fram við 6-7 ára aldr. **Åbendingar:** **Aftamed® Teething** er gel sem ætslæd er til notkunur i munni sem samanstander af einkelfavissarini fuldöblundum sem festir sig við slímhúðina, tennur og tannhol. Pannig myndast ósýnileg, sveigjanleg og sterk hilfðarhimna sem veitir mikla vernd og árangur. **Aftamed® Teething** veitir vörn gegn algengustu sýkingum í tanntøju híj börnum sem geta fylgt t.d. tanntøku eða örðrum særendum í munni. Klinískar rannsóknir hafa sýnt að gelid dregr úr verkjum og bólgu.

Notkun: Berið litló magn á tanntøldi 3-6 sinnum á dag eða eftir þörfum með hreinum fingri eða bómum og dreifð vel. Nuddið holði varlega bar til viðkomandi sveði er alveg bakið. Notið eftir mað eða drykk og gjarnan fyrir svefn til að tryggja langvarandi verkastillingu hjá barninu.

Aftamed® Teething indeholder ikke alkohol, sukker, gluten, laktose, paraben, natriumlaurylsulfat eller GMO. Ufarligt til sluge.

Kontraindikationer: Aftamed Teething må ikke anvendes ved kendi overfølsomhed over for nogle af produktets innholdsstoffer.

Forsikrighedsregler og advarsler: Anvend ikke produktet hvis tuben har været opbevaret under eller er skadet ved åbning. Efter applicering, fjern overskydende gele fra tuben inden lukning. Dette produkt er beregnet til personlig bruk. Anvend ikke efter utløbsdatoen. Opbevares ut tilgjengelig for barn. Ved anvendelse sammen med andre produkter, bør læge kontaktes.

Pakning tube

SV

På grund av sin skyddande verkan ges snabb lindring av smärta och tandköttsinflammation.

"Tandsprickning" är processen då spädbarn börjar få sina första tänder. Mjölktänderna börjar växa vid 6-7 månader och fortsätter upp till 3 års ålder, de permanenta tänderna börjar sedan växa vid 6 års ålder.

Indikationer: **Aftamed® Teething** bildar en skyddande film för användning vid typiska tandköttsinflammationer hos småbarn, till exempel sådana som orsakas vid tandsprickning eller skada. Kliniska tester på **Aftamed® Teething** visar minskad smärta, svullnad samt inflammation. **Användning:** Stryk ut en liten mängd av gelen 3-6 gånger per dag, eller vid behov på tandkötet med hjälp av en applikator eller med ett finger (tvatta händerna noggrant först). Massera försiktigt mot tandkötet tills den inflammerade ytan är helt täckt. Aplicera helst efter milderter och före läggdags för att göra det lättare för hinnan att bildas och för att förlänga smärtlättningen för barnet. **Aftamed® Teething** innehåller varken alkohol, socker, gluten, laktos, parabener, SLS eller GMOs. Ofarlig att svälja.

Kontraindikationer Används inte vid kännedom om överkänslighet mot något av produkternas innehåll. **Försiktighetsåtgärder och varningar:** Använd inte produkten om tuben är öppnad eller skadad. Efter applicering, ta bort eventuell överbliven produkt från tuben innan förslutning. Denne produkt är avsedd för personlig bruk. Använd inte produkten efter utgångsdatum. Förvara utom räckhåll för barn. Om produkten ska användas samtidigt som andra produkter skall du rådfråga din läkare innan användning.

Förpackning tub

FI

Vähentää nopeasti kipua ja entulehdusta proaktiivisen vaikutuksen vuoksi.

"Lampaapaid tuloo" määritylläinä prossessissa, jossa hampaita muodostuvat ja kehittyvät suuhun. Maitohampaita alkavat puhjeta noin 6-7 kuukauden ikäisenä, ja hamppaidentuloprosessi on yleensä ohin 3 vuoden lässä. Pysyvä hampaita alkavat näkyä noin 6 vuoden ikäisenä.

Käytööihheet: **Aftamed® Teething** muodostaa ikienille suojaavan kalvon vauvoille tyypillisissä entulehduskissä, kuten hampaiden tulosta tai ulkoisista tekijöistä typillissä tulehdusissa.

Aftamed® Teething on tutkimukset osoittavat, että se vähentää kipua, turvottava ja tulehdusta.

Käytööihjeet:

Annoste pieni määrä tuotetta 3-6 kertaa päivässä, tai tarpeen mukaan, käytätkää asetinta tai sormea (huolellisen käsinlenepun jälkeen) ja hiero se kevyesti ikinen, kunes hoitettava alue on kokonaan peittynyt. Suosituella käytettäväksi aterioiden jälkeen ja ennen ruukkumaanmenoja, jotta kalvon tarjoama helpous lapsen valioihin olisi mahdollisimman pitkä.

Aftamed® Teething ei sisällä alkoholia, sokeria, glutеosia, laktosia, parabeeneja, natriumlaurylsulfatia tai geenimuunneltuja organismeja (GMO) Vaaratonta nieltynä. **Vasta-aiheet** Ei pidä käyttää, jos on yliherkä jollekin sen sisältämälle ainesosalle.

Varotoimet ja varoitus: Älä käytä tuotetta, jos tuubi on auki tai vahingoittunut. Käytön jälkeen, pudista annostelja ennen pakkausen sulkemisesta. Tämä tuote on tarkoitettu henkilökohtaiseen käytöön. Älä käytä viimeisen käytöppäivän jälkeen. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos tuotetta ollaan käytämissä samaan aikaan muiden tuotteiden kanssa, tarkista lääkäritähti tuotteiden yhteensopivuus. **Pakkauksoko** tuubi

IS

Dregur hratt úr verkjum og tannholdsþöglu. **Tanntaka er skilgreind sem myndun og vöxtur tanna í munni.**

Barnatennur koma fryst við 6-7 mánaða aldur og lýkur tanntøju í krungum præggja åre aldr. Fullorolstænnur koma fram við 6-7 ára aldr.

Åbendingar: **Aftamed® Teething** er gel sem ætslæd er til notkunur i munni sem samanstander af einkelfavissarini fuldöblundum sem festir sig við slímhúðina, tennur og tannhol. Pannig myndast ósýnileg, sveigjanleg og sterk hilfðarhimna sem veitir mikla vernd og árangur. **Aftamed® Teething** veitir vörn gegn algengustu sýkingum í tanntøju híj börnum sem geta fylgt t.d. tanntøku eða örðrum særendum í munni. Klinískar rannsóknir hafa sýnt að gelid dregr úr verkjum og bólgu.

Notkun: Berið litló magn á tanntøldi 3-6 sinnum á dag eða eftir þörfum með hreinum fingri eða bómum og dreifð vel. Nuddið holði varlega bar til viðkomandi sveði er alveg bakið. Notið eftir mað eða drykk og gjarnan fyrir svefn til að tryggja langvarandi verkastillingu hjá barninu.

Aftamed® Teething indeholder ikke alkohol, sukker, gluten, laktose, paraben, natriumlaurylsulfat eller GMO. Ufarligt til sluge.

Kontraindikationer: Aftamed Teething må ikke anvendes ved kendi overfølsomhed over for nogle af produktets innholdsstoffer.

Forsikrighedsregler og advarsler: Anvend ikke produktet hvis tuben har været opbevaret under eller er skadet ved åbning. Efter applicering, fjern overskydende gele fra tuben inden lukning. Dette produkt er beregnet til personlig bruk. Anvend ikke etter utløbsdatoen. Opbevares ut tilgjengelig for barn. Ved anvendelse sammen med andre produkter, bør læge kontaktes.

Pakning tube

SV

På grund av sin skyddande verkan ges snabb lindring av smärta och tandköttsinflammation.

"Tandsprickning" är processen då spädbarn börjar få sina första tänder. Mjölktänderna börjar växa vid 6-7 månader och fortsätter upp till 3 års ålder,

Composition: / Composition: / Zusammensetzung: / Composición: / Σύνθεση: / Composição: / Състав: / ساخت: / Bileşimi: / Innheld: / Innehåll: / Innhold: / Innheld: / Innhold: / Innhold: /

Main ingredients: / Principal constituent: / Hauptinhaltsstoff: / Ingrediente principal: / Ключевый компонент: / Ingredient principal: / اساسنات الرئيسي: / Etken madde: / Hovedingrediens: / Pääasiallinen ainesosa: / Åbal innhaldsefni:

■ high molecular weight hyaluronic acid (sodium salt)

Other ingredients: / Other components: / Weitere Inhaltsstoffe: / Otros componentes: / Άλλα συστακά: / Otros ingredientes: / Други съставки: / Ostali sastojci: / مكونات أخرى: / Andra ingredienser: / Andra innehållsämne: / Muut ainesosat: / Όμιντρα innehållsdel:

■ Aqua, PEG 400, Xylitol, Polyvinyl alcohol, Cellulose gum, PEG 40 hydrogenated castor oil, PVP, PVMA copolymer, VP/Eicosene copolymer, Glyceryl laurate, Carbomer (Polycarbophil), Sodium saccharin, Sodium phosphate, Aroma, Glycerophosphocholine, Trisodium phosphate, Sodium lactate, Disodium EDTA.

It may contain: / Il peut contenir: / Es kann enthalten: / Puede contener: / Μπορεί να περιέχει: / Peut contenir: / Może dać się: / ممكناً أن يتضمن: / Läktik asti ve / Kan innehölde: / Kan indeholde: / Kan innehålla: / Saattaa sisältää: / Getur innihaldlo:

■ Lactic acid, Sodium hydroxide



0051



Via G. Leopardi, 21
20123 Milano - Italy
www.bioplaxpharma.com

