

 VIATRI		PRODUCT NAME VORTEFRI PEN C 3 ML				
		PRODUCT TYPE LEAFLET		USE SALE	LANGUAGE NO-DK	COUNTRY NO-DK
PRODUCT CODE 16802		CODE	PACK SIZE 210x450 mm		TEXT FONT SIZE 8 PT	MIN. FONT SIZE 6,5 PT
COLORS: 3		BLACK	CYAN	PMS 485 C		
DATE OF PREPARATION: 31-05-2023						

Cod. LG01137/14

POOLPRINT 

0
1
2
3

Verifica Qui
le misure di
stampa

Check Here
the measures
of print

3 cm 3 cm

0 1 2 3

Bruksanvisning



Etsende

Les bruksanvisningen nøye før bruk.
Oppbevar bruksanvisningen, du kan få behov for å lese den igjen.
Kun til utvortes bruk.
Vær forsiktig når du tar av korken. Ikke tving eller trekk. Fjern korken
sakte og håndter forsiktig for å unngå utilsiktet søl.
Oppbevares utgjengelig for barn.

VorteFri®
Becur
PEN C

YTTERLIGERE INFORMASJON OG ANBEFALINGER UNDER BEHANDLING:

- Hold vorten myk** mellom behandlingene ved å smøre med vanlig hudolje eller olje. Da kan vortester lettere komme ut.
- Farge er kun ment å veilede deg under påføringen av Vortefri PEN C og for å sikre at oppløsningen påføres på vorten. Mellom påføringene kan fargeintensiteten på vorten endre seg. Som nevnt ovenfor skal du ikke endre påføringsprosedyren, dette gjelder også hyppigheten.
 - **PÅFØR IKKE FOR MYE** – påfør i opptil 3 sekunder og kun på vorten.
 - Hvis du merker en brennende følelse eller irritasjon i huden (rødhet, prikkende, sviende følelse), skal behandlingen stoppes. Ikke start behandlingen igjen før irritasjonen har gått over
 - Hvis produktet ikke virker på vorten etter flere behandlinger, skal du kontakte legen din.
 - Hvis vorten ikke responderer på behandlingen ved behandling én gang i uken, kan den behandles to ganger per uke eller hver andre dag, så lenge huden ikke er irritert.
 - I starten av behandlingene kan vorten også bli hvit og begynne å vokse ut før den tørker inn. Når vorten utvider seg, kan den omkringliggende huden bli øm. Pass på at det ikke er overliggende hud på vorten, se nedenfor.
 - Hvis vorten føles øm, eller hvis det dunker i den, kan det skyldes at du har påført for mye oppløsning, eller at vorten ikke kan komme ut gjennom den **hudoverflaten**.
- Hvis huden dekker vorten, må man lage en åpning i huden, med f.eks. en pinsett for å slippe vorten ut. Hvis du har en **gammel eller hard vorte**, kan du myke den opp ved å bløtlegge det berørte området i varmt vann til huden er myk. Pirk eller risp opp hudoverflaten på vorten, f. eks. med en pinsett. På tykk hud med innovervendte vorter (fotvorter), fjern forsiktig den harde huden. På neglebåndsvorter må du kanskje lage et lite hull i den ytre huden, slik at vortemidlet kan trenge inn i vorten. Bruk ikke fil på vortene uten anbefaling fra helsepersonell. Vortene kan bli ømme og det kan danne seg ny hard overflate på vorten.
- Etter noen behandlinger kommer det ofte svarte prikker i vorten. Det er små blodårer som forsyner vorten med blod. Det er et tegn på at vorten er i ferd med å forsvinne, og behandlingen skal fortsette til de små svarte prikkene og vorten er helt borte. Noen ganger kan de svarte prikkene bli litt når du skrapet på vorten. Vent noen få minutter før påføring av oppløsningen, til blødningen har stoppet, ellers kan det svi litt. Dersom det svir, tilfør straks kaldt vann for å lindre ubehaget.

BRUK PÅ BARN:

Barn skal alltid behandles nøye av en voksen, da oppløsningen er etsende. Små barn har myk, tynn hud. Bruk veldig lite VorteFri P/EN C-oppløsning på barnevorter. Vortene er som oftest borte etter 2-3 behandlinger.

Barn under 4 år kan behandles med VorteFri P/EN C, men forsikre deg alltid om at det faktisk er en vorte og ikke en annen type hudforandring. Rådfrø deg med din lege eller helsestasjon før behandlingen. For barn under 4 år er det spesielt viktig å redusere mengden av oppløsning. Behandle **sjeldnere**, for eksempel hver andre eller tredje uke.

- Press tuppen av pennen lett mot vorten **én** gang i tre sekunder og påfør oppløsningen på vortens overflate.
- Unngå kontakt med huden rundt vorten.
- Hvis barnet kan komme til å slikke på vorten, kan du vaske det behandlede område med vann. Oppløsningen har allerede trengt inn i vorten.
- Hvis det svir eller stikker under behandlingen, skal du skylle vorten med kaldt vann og ikke påføre mer vortemiddel. Det har allerede rukket å trenge inn i vorten.

Hvis barnet merker en brennende følelse eller en irritasjon (huden blir rød, prikkende eller stikkende) skal behandlingen stoppes. Ikke start behandlingen igjen før irritasjon har gått over.

BEHANDLING AV PERSONER MED DIABETES



Diabetikere skal kun bruke VorteFri PEN C på vorter på frisk hud (uskadet og upåvirket av diabetes sykdommen) og med ekstra stor forsiktighet. Ved komplikasjoner skal du alltid kontakte din lege/sykepleier eller fotpleier.

BRUK VED GRAVIDITET OG AMMING:



Det er ingen kjent risiko ved bruk av VorteFri PEN C hos gravide og/eller ammende kvinner.

BEHANDLINGSVARIGHET:

VorteFri PEN C er veldig effektiv - de fleste vorter forsvinner og kommer ikke tilbake. Noen ganger kan vorter, som allerede finnes i underhuden, dukke opp, når du starter behandlingen.

Vorter kan ses vedlig forskelligt ud og tiden det tar for å fjerne dem kan derfor variere; vanligvis 5 til 15 behandlinger. Det kan også ta kortere eller lengre tid. Faktorer, som kan påvirke hvor lenge du må behandle før vortene forsvinner kan være din alder, vortetype, ditt immunsystem, hvor vorten befinner seg og hvor lenge du har hatt den. Nedsett immunforsvar og medisiner, med f.eks. kortison, er faktorer som kan føre til at det tar lengre tid å bli kvitt vortene. Nye vorter er vanligvis enklere å bli kvitt enn gamle vorter. Barnevorter er som oftest lettere å fjerne enn vorter på voksne. For innovervendte fotvorter og neglebåndsvorter, som har vært der i flere år, kan det ta lang tid for man ser tydelig effekt av behandlingen, og det tar betydelig lengre tid før vorten blir helt borte.

Avslutt behandlingen med VorteFri PEN C når det ikke lenger er synlige svarte prikker, eller når vorten har ramlet av, skrumpet sammen eller det er en fordypning der vorten har vært. Etter en tid blir huden normal igjen. Fortsetter du behandlingen for lenge etter at vorten er borte, blir huden rosa og fuktig. Slutt da å bruke VorteFri PEN C umiddelbart. Etter noen uker, sjekk der vorten var; hvis du ser en liten prikk, kan det tyde på vorterester. Hvis dette er tilfelle, må du starte behandling med VorteFri PEN C på nytt.

Etter behandlingen lukker du pennen med hetten og kaster det tomme produktet i henhold til gjeldende forskrifter for avfallshåndtering.

MULIGE BIVIRKNINGER:

Midlertidige bivirkninger kan opstå på påføringststedet, for eksempel ømhet, stikkende, smerte, rødhet, brændende følelse eller blødning fra blodkappillærer. Ta en pause i behandlingen til huden er tilhelt. Påføring av for mye oppløsning, feil påføring eller søl kan føre til mer alvorlige bivirkninger som blemmer, sår, mørk pigmentering i huden, kjemiske brannår, betennelse, død hudvev (nekrose) eller arrdannelse. Det skadede område bør holdes rent for å unngå infeksjon. Stop behandlingen, og kontakt lege ved alvorlig hudskade.

Vorte-fri PEN C har en sterk lukt, som kan være irriterende for luftveiene og øyne. Lukt ikke på innholdet i pennen. Bivirkninger kan for eksempel være irritasjon i luftveiene og/eller halsen, rennende nese, rennende øyne eller pustevansker.

Det har blitt rapportert enkelte tilfeller av allergisk reaksjon som for eksempel rødhet, utslett og kløe.

I tilfeller av alvorlige hendelser, vennligst umiddelbart kontakt Meda Pharma S.p.A. og din nasjonale kompetente myndighet.

PAKNING:

Påføringspenn inneholder 3 ml oppløsning med en hette som har en to-trinns
åpningsfunksjon samt en bruksanvisning.

OPPBEVARING:

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares mellom 15-25 °C, stående loddrett med hetten ned.

HOLDBARHET:

Se utløpsdatoen på pennen og esken. Kan brukes opptil 6 måneder etter åpning.

SYMBOLER PÅ PAKNINGEN

- | | | | |
|---|------------------|---|----------------------|
|  | Produsent |  | Les bruksanvisningen |
|  | Holdbarhet |  | Distributør |
|  | Batchnummer |  | Medisinsk utstyr |
|  | Temperaturgrense | | |
|  | Advarsel | | |

