

SUPPOSITORIER PROCTOCUR®

TIL BEHANDLING AF HÆMORIDER OG ANALFISSURER

DK - Brugsanvisning

Proctocur® suppositorier er beregnet til behandling af hæmorider og andre rektale lidelser, såsom anale fissurer og hudrevner (rhagader). De giver øjeblikkelig lindring af ubehagelige symptomer såsom svie, kløe og smerter i endetarmsområdet.

Den unikke kombination af plantebaserede ingredienser, bioteknologiske peptider, hyaluronsyre og en smørende komponent har antimikrobielle, antiseptiske, sammentrækkende, antiinflammatoriske og lokalbedøvende egenskaber.

Takket være disse egenskaber kan brugen af suppositorierne lindre og eliminere de ubehagelige symptomer på hæmorider. Proctocur® suppositorier behandler, beroliger og lindrer inflammation, irritation, hævelse og kløe i analområdet.

Proctocur® suppositorier skaber et miljø, der forebygger og reducerer forekomsten af bakterielle infektioner, hjælper med at afspænde musklerne i den anale lukkemuskel og fremmer helingen af mindre sår i endetarmen (anale fissurer og hudrevner) både i akutte og kroniske tilstande.

Det anbefales at bruge suppositorierne både ved vedvarende gener og forebyggende for at bevare velvære. De bidrager til at eliminere eksisterende gener og lindre ubehag og irritation.

Indikationer

- Understøttende behandling af indre og ydre hæmorider
- Lindrer smerte, inflammation, irritation, hævelse og kløe i endetarmsområdet
- Fremskynder heling og regenerering af beskadiget hud og slimhinder i analområdet (fissurer og hudrevner - både akutte og kroniske tilstande)

Dosering og anvendelse

REKTAL ANVENDELSE

Det anbefales at anvende ét suppositorie dagligt, helst om aftenen efter personlig hygiejne. Behandlingsvarigheden afhænger af symptomerne; ved behov kan suppositorierne anvendes i længere tid.

Ved brug af suppositorier anbefales det at opretholde god hygiejne. Vask hænderne både før og efter brug. Analområdet vaskes kun for indføring som led i hygiejnen.

Suppositoriet frigøres ved at trække i de to vinger af blisterpakningen. Indfør ét suppositorie i endetarmen dagligt.

Advarsler

Brug ikke andre produkter på det behandlede område samtidig. Produktet anbefales ikke til personer med kronisk forstoppelse (som har behov for at stimulere afføringen) eller til personer med nedsat evne til at holde på afføringen. Behandlingen frarådes ved overfølsomhed eller intolerance over for nogen af ingredienserne. Gravide bør kun anvende produktet efter aftale med en læge. Må ikke sluges. Undgå kontakt med øjne. Produktet må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget. Eventuelle fine sedimenter skyldes planteekstrakter og påvirker ikke produktets kvalitet.

Bivirkninger

Hvis du er overfølsom over for en eller flere af ingredienserne, kan der forekomme midlertidig kløe. Langvarig brug af ethvert topikalt produkt kan forårsage overfølsomhed. I så fald skal behandlingen straks afbrydes, og læge kontaktes for korrekt behandling.

Ingredienser

PEG-32, polysorbat 20, PEG-20, dimeticon, acetyl hexapeptide-1, pentapeptide-18, laureth-9, egebarkekstrakt (Quercus robur bark), hestekastanjeekstrakt (Aesculus hippocastanum), morgenfrueekstrakt (Calendula officinalis), kamilleekstrakt (Matricaria recutita), natriumhyaluronat (hyaluronsyre).

Beskrivelse af aktive ingredienser

Ud over de beroligende og lindrende egenskaber har de aktive stoffer følgende virkninger:

Peptider (Acetyl Hexapeptide-1, Pentapeptide-18) – afspænder musklerne i den anale lukkemuskel og bidrager dermed væsentligt til forbedringen af kroniske tilstande og letter afføringen. Dette reducerer smerte og ubehag og fremskynder helingsprocessen.

Den smørende komponent – danner en tynd film på hudens overflade, som forebygger dannelsen af små revner og understøtter helingen af eksisterende revner.

Dimeticon – blødgør, fugter, beskytter og fjerner irritation.

Hyaluronsyre – har fugtgivende og regenererende egenskaber. Dens evne til at binde vand spiller en vigtig rolle i opretholdelsen af hudens og slimhindernes naturlige fugt og sundhed. Dens primære funktion er intens hydrering og regenerering af beskadigede epitelceller i væv samt at fremme sårheling.

Egebark (Quercus cortex) – er kendt for sin stærke sammentrækkende effekt og evnen til at fremme sårheling.

Hestekastanje (Aesculus hippocastanum) – er vigtig på grund af sin antiinflammatoriske effekt. Den hjælper med at styrke blodkar og har regenererende samt sammentrækkende effekt. **Aescin**, som er det primære aktive stof i hestekastanje, er kendetegnet ved stærk antiinflammatorisk og sammentrækkende effekt. På grund af disse egenskaber anvendes det effektivt til at reducere lokal blodkarudvidelse forårsaget af hæmorider.

Morgenfrue (Calendula officinalis) – en plante med bred virkning, hvis vigtigste bestanddele har antiinflammatoriske, helende og beroligende egenskaber for huden.

Kamille (Matricaria chamomilla) – beroliger, fugter, køler og modvirker inflammation.

Pakning

10 suppositorier

Opbevaring

Beskyttes mod varme. Opbevares tørt ved 5–25 °C og utilgængeligt for børn.

Udløbsdato

Se udløbsdato angivet på pakningen.

Producent

Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Vefké Ludince 404, Slovakiet under licens fra Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Schweiz

Distributør

Nordisk Pharma ApS, 2625 Vallengbæk, Danmark

Medicinsk udstyr klasse I

Denne brugsanvisning er sidst revideret: Oktober 2025

