

MoviGo® Duo

Drikkeklar opløsning i breve

MEDICINSK UDSTYR

Til effektiv og skånsom behandling og lindring af forstoppelse i forbindelse med luft i maven og oppustethed.

1. Hvad produktet er, og hvad det bruges til

MoviGo Duo er et medicinsk udstyr, der er udviklet til at lindre forstoppelse eller hård afføring, i forbindelse med luft i maven og oppustethed.

MoviGo indeholder macrogol 4000 til behandling af forstoppelse og simeticon til lindring af oppustethed.

Macrogol 4000, blødgør afføringen ved at trække vand ind i tarmen. Dette hjælper med at holde afføringen hydreret og lettere at komme af med. Det gør afføringen mere behagelig og regelmæssig, uden at give en pludselig eller akut trang til at skulle på toilettet. Macrogol 4000 optages ikke i kroppen. Det passerer gennem fordøjelsessystemet og udskilles sammen med afføringen.

Simeticon nedbryder gasbobler i tarmen og hjælper med at fjerne den tarmgas, der kan opstå ved forstoppelse.

1.1 Sammensætning

Hvert brev indeholder:

10 g macrogol 4000, 100 mg simeticon

Hjælpstoffer: Vand, sucralose, appelsinsmag, vegetabilsk glycerin, polysorbat 80, sucroseestere, kaliumsorbat.

2. Dosering og varighed af behandling

Den anbefalede dosis er:

- Børn fra 1 år op til 6 år: 1 brev dagligt.
- Voksne og børn fra 6 år: 2 breve dagligt.

Drik produktet direkte fra brevet, eller fortynd det om nødvendigt med vand. Det anbefales at tage produktet mellem måltiderne.

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Behandlingens varighed er normalt 2 uger. Dog kan gentagen eller længerevarende behandling være nødvendig i tilfælde af refraktær eller kronisk forstoppelse. Sådan forstoppelse kan skyldes lægemidler som f.eks. smertestillende midler (opioider) eller lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom (antikolinergika). Sygdomme som f.eks. multipel sklerose eller Parkinsons sygdom kan forårsage refraktær forstoppelse.

Brug ikke dette produkt i mere end 30 dage i træk uden at kontakte din læge.

3. Kontraindikationer

Må ikke tages ved intolerance over for produktet eller kendt overfølsomhed over for nogen af indholdstofferne eller polyethylenglycol.

Brug ikke dette produkt til børn under 1 år.

Indtag ikke dette produkt, hvis du lider af:

- Tarmstenose
- Tarmperforation
- Inflammatorisk tarmsygdom (såsom Crohns sygdom, colitis ulcerosa).

Må ikke tages i tilfælde af tarmobstruktion.

4. Graviditet og amning

Der findes ingen tilgængelige data om brugen af dette produkt under graviditet eller amning. Hvis du er gravid, forsøger at blive gravid eller ammer, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette produkt.

5. Mulige bivirkninger

Det anbefales, at du ikke overskrider den anbefalede dosis, da højere doser kan forårsage uventede bivirkninger.

Mave-tarm-gener, såsom borborygmi, mavesmerter, kvalme og mild diarré (især i begyndelsen) kan forekomme. Hvis bivirkningerne forværres eller ikke forsvinder inden for et par dage, eller hvis du oplever bivirkninger, som ikke er nævnt i denne brugsanvisning, skal du kontakte din læge.

I sjældne tilfælde kan der opstå overfølsomhedsreaktioner (såsom udslæt og nældefeber). Hvis du oplever disse bivirkninger, skal du stoppe med at tage produktet og straks kontakte din læge.

6. Interaktioner med kosttilskud og lægemidler

Dette produkt kan påvirke optagelsen af andre lægemidler, hvis de tages samtidig. Den osmotiske virkning af macrogol samt den hurtigere tarm-passage kan især reducere deres effekt.

Det anbefales derfor, at indtagelsen af produktet udskydes med mindst 2 timer efter indtag af lægemidler, der tages gennem munden, eller anden medicin eller kosttilskud. Kontakt din læge, før du tager dette produkt, hvis du tager anden medicin.

7. Opbevaring

Opbevar produktet tørt ved temperaturer mellem 15 °C og 25 °C, og beskyttet fra direkte varme eller lyskilder. Åbn først brevet på det tidspunkt, hvor produktet skal bruges. Må ikke anvendes, hvis brevene er beskadigede. Opbevares utilgængeligt for børn.

8. Advarsler og forsigtighedsregler

For at opretholde et godt helbred, herunder en sund tarm,

anbefales det, at du spiser sundt og drikker tilstrækkelige mængder væske (typisk 2,0 til 2,5 liter dagligt).

Det anbefales at tale med en læge, før brug af dette produkt til børn.

Simeticon kan påvirke effekten af visse reagenser, der anvendes i diagnostik, som f.eks. guaiacgummi.

9. Udløbsdato

Må ikke tages efter den udløbsdato, der er trykt på emballagen. Udløbsdatoen gælder for produktet i intakt emballage, når det opbevares korrekt.

10. Bortskaffelse

Udløbet produkt skal håndteres i henhold til reglerne for affaldshåndtering i dit land. Smid venligst ikke affald, og bortskaf dette produkts emballageaffald på korrekt vis.

Dette spørgeskema er en del af obligatorisk sikkerhedsovervågning.

Din deltagelse hjælper os med at sikre produktets kvalitet og sikkerhed.

Tag venligst et par minutter til at udfylde spørgeskemaet på følgende adresse:

<https://siit-pms.com/GC06>

eller ved at scanne denne QR-kode:



MoviGo Duo, Norgine og sejllogoet er varemærker, der tilhører Norgine-koncernen.




SIIT srl

Via Ariosto 50/60

20090 Trezzano sul Naviglio (MI) ITALIEN



Norgine Danmark A/S, Kirsten Walthers Vej 8A, 2500 Valby, Danmark



Seneste revision: 10/2025